

## مراجعة المستتر في الرياضيات

## مراجعة ليلة الامتحان جبر وهندسة

السؤال الأول : اختر الإجابة من بين القوسين

$$\{1\} \frac{\sqrt[5]{5} \times 5^2}{\sqrt[5]{5}} = \dots\dots\dots \left\{ \frac{1}{125} \text{ ؛ } \frac{1}{25} \text{ ؛ } 25 \text{ ؛ } 125 \right\}$$

$$\{2\} \text{ ص - ص } = \dots\dots\dots \{ \{0\} \text{ ؛ } \emptyset \text{ ؛ } \text{ط} \text{ ؛ } \text{ص} + \text{ط} \}$$

$$\{3\} \text{ حجم المكعب طول حرفه ٣ سم يساوي ٣ سم } \dots\dots\dots \{ 9 \text{ ؛ } 12 \text{ ؛ } 27 \text{ ؛ } 81 \}$$

$$\{4\} \text{ إذا كان المقدار الثلاثي : س}^2 + \text{ل س} + ٣٦ \text{ مربع كامل فإن : ل} = \dots\dots\dots \{ 6 \pm \text{ ؛ } 8 \pm \text{ ؛ } 12 \pm \text{ ؛ } 18 \pm \}$$

$$\{5\} \text{ عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة ملاحظة الوجه العلوي فإن احتمال ظهور عدد يقبل علي القسمة عي ٣ = } \dots\dots\dots$$

$$\left\{ \frac{1}{4} \text{ ؛ } \frac{1}{3} \text{ ؛ } \frac{3}{4} \text{ ؛ } \frac{1}{2} \right\}$$

$$\{6\} \text{ إذا كان : } \left( \frac{5}{3} \right)^{\text{س}} = \frac{27}{125} \text{ فإن : س} = \dots\dots\dots \{ -5 \text{ ؛ } -3 \text{ ؛ } 3 \text{ ؛ } 5 \}$$

$$\{7\} \text{ إذا كان س}^2 \text{ ص}^3 = 8 \text{ فإن : } \frac{\text{ص}}{\text{س}} = \dots\dots\dots \left\{ 8 \text{ ؛ } \frac{1}{8} \text{ ؛ } \frac{1}{2} \text{ ؛ } 2 \right\}$$

$$\{8\} \text{ المقدار : س}^2 + ٤ \text{ س} + \text{م} \text{ يكون مربعاً كاملاً إذا كانت م} = \dots\dots\dots \{ 3 \text{ ؛ } 4 \text{ ؛ } 8 \text{ ؛ } 16 \}$$

$$\{9\} \text{ مجموعة حل المعادلة : س}^2 - \text{س} = ٠ \text{ هي } \dots\dots\dots ( \text{س} \geq ٠ ) \{ \{0\} \text{ ؛ } \emptyset \text{ ؛ } \{0, 1\} \text{ ؛ } \{1\} \}$$

$$\{10\} \text{ في الشكل المقابل : الجزء المظلل يمثل } \dots\dots\dots \text{ الدائرة}$$



$$\{11\} \text{ إذا كان : } 3^{\text{س}} + 3^{\text{س}} + 3^{\text{س}} = ١ \text{ فإن : س} = \dots\dots\dots \{ -1 \text{ ؛ } ٠ \text{ ؛ } ١ \text{ ؛ } \frac{1}{3} \}$$

$$\{12\} \text{ إذا كان : } 6^{\text{س}} = ١١ \text{ فإن } 6^{\text{س}+1} = \dots\dots\dots \{ 12 \text{ ؛ } 22 \text{ ؛ } 66 \text{ ؛ } ٧٢ \}$$

$$\{13\} \text{ مجموعة حل المعادلة : س}^2 + ٢٥ = ٠ \text{ في ح هي } \dots\dots\dots \{ \{5, -5\} \text{ ؛ } \{5\} \text{ ؛ } \{-5\} \text{ ؛ } \emptyset \}$$

$$\{14\} \text{ إذا كان المقدار : س}^2 + \text{م س} + ٩ \text{ مربعاً كاملاً فإن : م} = \dots\dots\dots \{ 3 \text{ ؛ } 6 \text{ ؛ } ٩ \text{ ؛ } 18 \}$$

$$\{15\} \text{ إذا كان ( س - ١ ) أحد عاملي المقدار : س}^2 - ٤ \text{ س} + ٣ \text{ فإن العامل الآخر هو } \dots\dots\dots$$

$$\{ (3 + \text{س}) \text{ ؛ } (1 + \text{س}) \text{ ؛ } (3 - \text{س}) \text{ ؛ } (4 - \text{س}) \}$$

$$\{16\} \text{ إذا كان : } \left( \frac{5}{3} \right)^{\text{س}} = \left( \frac{3}{5} \right)^2 \text{ فإن : س} = \dots\dots\dots \{ -2 \text{ ؛ } 2 \text{ ؛ } \frac{1}{2} \text{ ؛ } \frac{1}{3} \}$$

$$\{17\} \text{ احتمال الحدث المؤكد = } \dots\dots\dots \{ \text{صفر} \text{ ؛ } \frac{1}{2} \text{ ؛ } 1 \text{ ؛ } 2 \}$$

$$\{18\} \text{ إذا كان : } 2^{\text{س}} = ٥ \text{ فإن : } 2^{\text{س}+1} = \dots\dots\dots \{ 7 \text{ ؛ } 10 \text{ ؛ } 12 \text{ ؛ } 3 \}$$

- {١٩} مجموعة حل المعادلة :  $س^2 + ١ = ٠$  في ح هي..... {  $\{١-، ١\}$  ؛ {  $\{١\}$  ؛ {  $\{١-\}$  ؛  $\emptyset$  }
- {٢٠} نصف العدد  $١٠٢ = \dots\dots\dots$  {  $\{٢^\circ ؛ ٤^\circ ؛ ٢^\circ ؛ ١٠\}$
- {٢١} إذا كانت نسبة نجاح طالب في الامتحان هي ٨٥ % فإن نسبة رسوبه هي..... {  $\{١٥ ؛ ٠,١٥ ؛ ١,٥ ؛ ٠,٠١٥\}$
- {٢٢} إذا كان :  $س - ص = ٣$  ،  $س^2 - ص^2 = ٢١$  فإن  $س + ص = \dots\dots\dots$  {  $\{٧ ؛ ٦٣ ؛ ١٨ ؛ ٢٤\}$
- {٢٣} إذا كان عمر فريدة الآن س سنة فإن عمرها بعد خمس سنوات ..... سنة {  $\{٥ س ؛ س - ٥ ؛ س ؛ س + ٥\}$
- {٢٤} إذا كانت :  $س^2 + ص^2 = ٧$  ،  $س ص = ٣$  فإن  $(س - ص)^2 = \dots\dots\dots$  {  $\{١ - ؛ ١ ؛ ١ \pm ؛ ١٠\}$
- {٢٥} إذا كان :  $س^2 + ٢٧ = (س + ٣) (س + ٩ + ل)$  فإن :  $ل = \dots\dots\dots$  {  $\{٦ س ؛ ٣ س ؛ ٣ س - ؛ ٦ س -\}$
- {٢٦} إذا كان :  $٣ = س^٣$  فإن :  $٥ = س^{٢٧} = \dots\dots\dots$  {  $\{٢ ؛ \frac{١}{١٢٥} ؛ \frac{١}{٨} ؛ ١٢٥\}$
- {٢٧}  $٣^٣ + ٣^٣ + ٣^٣ = \dots\dots\dots$  {  $\{٣ ؛ ١٣ ؛ ٩ ؛ ١٢٩\}$
- {٢٨} إذا كان احتمال نجاح طالب في الامتحان هو ٠,٨ فإن احتمال رسوبه هو .... {  $\{٨\% ؛ ٢٠\% ؛ ٢٠\% ؛ ٨٠\%\}$
- {٢٩}  $\{٥، ١\} \cap \{٥، ١\} = \dots\dots\dots$  {  $\{\emptyset ؛ \{٥، ١\} ؛ [٥، ١] ؛ [٥، ١]\}$
- {٣٠}  $\{٢٥ - ؛ ٢٥ ؛ \frac{١}{٢٥} ؛ -\frac{١}{٢٥}\} = \dots\dots\dots$
- {٣١} إذا كان المقدار :  $س^٤ + س^٣ + س + ٩$  مربعاً كاملاً فإن :  $م = \dots\dots\dots$  {  $\{٦ \pm ؛ ١٢ \pm ؛ ٣٦ \pm ؛ ٣ \pm\}$
- {٣٢} إذا كانت :  $(س - ٣) = ١$  فإن :  $س \supset \dots\dots\dots$  {  $\{٣ - ؛ ح ؛ \{٣\} - ح ؛ \{٣\}\}$
- {٣٣} إذا كانت ثلاثة أمثال عدد يساوي ٣٦ فإن :  $\frac{١}{٣}$  هذا العدد يساوي ..... {  $\{٤ ؛ ٦ ؛ ٨ ؛ ١٢\}$
- {٣٤} أي من الآتي يمكن أن يكون احتمال أحد الأحداث ؟ {  $\{٠,٥ - ؛ ١,٢ ؛ \frac{٤}{٣} ؛ ٣٧\%\}$
- {٣٥} خارج قسمة  $٦٠٤ \div ٠,٦٠٤ = \dots\dots\dots$  {  $\{١ ؛ ١٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠٠\}$
- {٣٦}  $(س + ١) (س - ١) = \dots\dots\dots$  {  $\{س^٢ - ١ ؛ س^٢ + ١ ؛ س - ١ ؛ س + ١\}$
- {٣٧} إذا كانت س العنصر المحايد الجمعي ، ص العنصر المحايد الضربي فإن  $٢ + س^٣ = \dots\dots\dots$  {  $\{٥ ؛ ٣ ؛ ٢ ؛ ٣\}$
- {٣٨} إذا كان  $س^٣ = ٤$  ،  $م^٣ = ٥$  فإن  $م^٣ + س^٣ = \dots\dots\dots$  {  $\{٩ ؛ ٢٠ ؛ \frac{٤}{٥} ؛ \frac{٥}{٤}\}$
- {٣٩} إذا كانت ل تمثل عدد سالب ، فأى مما يأتي يمثل عدد موجب ..... {  $\{ل^٢ ؛ ل^٣ ؛ ل ؛ ٣ ل\}$
- {٤٠}  $\frac{١}{٨} = \dots\dots\dots\%$  {  $\{٢٥\% ؛ ١,٢٥\% ؛ ١٢,٥\% ؛ ١,١٢٥\%\}$
- {٤١} سحبت بطاقة عشوائية من بطاقات مرقمة من ١ إلى ١٠ فإن احتمال ظهور بطاقة تحمل عدداً زوجياً أكبر من ٣ هو ..... {  $\{\frac{٣}{١٠} ؛ \frac{٤}{١٠} ؛ \frac{٥}{١٠} ؛ \frac{٧}{١٠}\}$

- { ٤٢ } إذا كانت  $3^{-س} = 7^{-س-١}$  فإن س = ..... { صفر ؛ ١ ؛ ٣ ؛ ٧ }
- { ٤٣ } يكون المقدار س<sup>٢</sup> - ٣س + م قابلاً للتحليل إذا كانت م = ..... { ٧ ؛ ٣ ؛ ٤ ؛ ٢ }
- { ٤٤ } ..... =  $٤^٣ + ٤^٣ + ٤^٣ + ٤^٣$  { ٢٤ ؛ ٢٤ ؛ ١٢٤ ؛ ١٥٤ }
- { ٤٥ } إذا كان : س - ص = ٢ فإن : س<sup>٢</sup> - ٢س + ص = ..... { ١٠٠ ؛ ٢٨ ؛ ١٠ ؛ ٤ }
- { ٤٦ } مجموعة حل المعادلة : س (س - ١) = صفر ح هي ..... { {٠} ؛ {١، ٠} ؛ {١، -١} ؛ {١، -١} } }
- { ٤٧ } إذا كان : س =  $\frac{\sqrt[٩]{٩}}{\sqrt[٣]{٤}}$  فإن س<sup>-١</sup> = ..... {  $\frac{\sqrt[٣]{٤}}{٣}$  ؛  $\frac{\sqrt[٣]{٤}}{٤}$  ؛ ٣ ؛ ٢ }
- { ٤٨ } إذا كانت ٢ حلاً للمعادلة س<sup>٢</sup> - ٥س + ٨ = صفر فإن قيمة ٨ = ..... { ٣ - ؛ ٦ - ؛ ٣ ؛ ٦ }
- { ٤٩ } إذا كان عمر زياد الآن (س + ١) فإن عمره بعد ثلاث سنوات هو .... { ٣س - ٣ ؛ س - ٣ ؛ س - ٤ ؛ س + ٤ }
- { ٥٠ } إذا كان ٥س = ٤ فإن ٥س<sup>-١</sup> = ..... { ١,٢٥ ؛ ٠,٨ ؛ ٠,١٢٥ ؛ ٠,٠٨ }
- { ٥١ } قيمة المقدار : ٢<sup>١٢</sup> + ٢<sup>١٢</sup> = ..... { ٢<sup>١٢</sup> × ٢ ؛ ٢<sup>١٢</sup> × ٣ ؛ ٢<sup>١٢</sup> × ٣ ؛ ٢<sup>١٢</sup> × ٣ }
- { ٥٢ } ..... × ١٠ = (٢٥)<sup>٢</sup> - (١٥)<sup>٢</sup> { ٢٥ ؛ ١٥ ؛ ٣٠ ؛ ٤٠ }
- { ٥٣ } إذا كان س<sup>٢</sup> - ٣س = ١ فإن س = ..... { ٣ ؛ ٣ - ؛ ٤ ؛ ٤ - }
- { ٥٤ } ..... =  $(\frac{١}{\sqrt[٣]{٨}} - \frac{١}{\sqrt[٣]{٨}})$  {  $\frac{١}{٨}$  ؛  $\frac{١}{٨} - \frac{١}{٣}$  ؛  $\frac{١}{٣}$  ؛  $\frac{١}{١٦}$  }
- { ٥٥ } إذا كان : ٢٨ - ٢ب = ١٦ ، ٢ب - ٢ = ..... { ٨ - ؛ ٨ ؛ ٢ ؛ ٢ }
- { ٥٦ } إذا كان :  $\sqrt{س+٥} = ٣$  فإن :  $\sqrt{س}$  = ..... { صفر ؛ ٢ ؛ ٤ ؛ ٩ }
- { ٥٧ } ستدس العدد ٢<sup>١٢</sup> × ٣<sup>١٢</sup> = ..... { ٢<sup>٦</sup> ؛ ٢<sup>١٢</sup> ؛ ٢<sup>٦</sup> ؛ ٢<sup>٣٦</sup> }
- { ٥٨ } إذا كان ٣س = ٥ فإن ٣س<sup>+</sup> = ..... { ٩ ؛ ٢٥ ؛ ١٥ ؛ ١٠ }
- { ٥٩ } إذا كان : س<sup>٢</sup> + ل - س - ٦ = (س + ٣) (س - ٢) فإن : ل = ..... { ١ - ؛ ١ ؛ ٢ ؛ ٣ }
- { ٦٠ } ثلث العدد ٣<sup>٩</sup> = ..... { ٣<sup>٣</sup> ؛ ٣<sup>١٠</sup> ؛ ٣<sup>٦</sup> ؛ ٣<sup>٨</sup> }
- { ٦١ } ..... = ٢<sup>٩</sup> + ٢<sup>٩</sup> { ٢<sup>١٠</sup> ؛ ٢<sup>١٨</sup> ؛ ٢<sup>١٨</sup> ؛ ٢<sup>١٤</sup> }
- { ٦٢ } ٧ أمتار = ..... سم { ٧٠ ؛ ٧٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ٧٠٠٠ }
- { ٦٣ } إذا كان : ٣س = ٥ فإن : ٩س = ..... { ٢٥ ؛ ٤٥ ؛ ١٥ ؛ ١٤٤ }
- { ٦٤ } ..... = ٠,٠٥ × ٠,٠٢ { ١٠<sup>-٥</sup> ؛ ١٠<sup>-٤</sup> ؛ ١٠<sup>-٥</sup> ؛ ١٠<sup>-٤</sup> }
- { ٦٥ } ..... =  $\sqrt{٩ \times ٢٥}$  { ١٦ ؛ ٧ ؛ ١٥ ؛ ٤ }



- {٦٦} عدنان فرديان متتاليان أحدهما س فإن الآخر هو ..... {س - ١ ؛ س + ١ ؛ س + ٢ ؛ س - ٢}
- {٦٧} ربع العدد  $4^4 = 4^{\dots}$  ..... {٥ ؛ ٢٠ ؛ ٣٩ ؛ ١٠}
- {٦٨} احتمال الحدث المستحيل = ..... {صفر ؛ ٢ ؛ ١ ؛ ٢}
- {٦٩} إذا كان :  $7^3 = 343$  فإن : س = ..... {٣ ؛ ٢ ؛ ٦ - ؛  $\frac{1}{7}$ }
- {٧٠} إذا كان : س - ٢ = ٢٦ ، س + ٢ = ص + ص = ١٣ فإن : س - ص = ..... {٢ ؛ ٤ ؛ ١٣ ؛ ٣٩}
- {٧١}  $\sqrt[2]{2} + \sqrt[2]{2} = \dots$  ..... {٢ ؛ ٢ ؛  $\sqrt[2]{2}$  ؛  $\sqrt[2]{2}(\sqrt[2]{2})$ }
- {٧٢} إذا كان : ٢ > س > ٥ فإن : ٣ - س - ١ ..... { [ ١٢ ، ٣ ] ؛ [ ١٤ ، ٦ ] ؛ [ ١٥ ، ٥ ] ؛ [ ١٤ ، ٥ ] }
- {٧٣}  $7 \times 2 + 5 = \dots$  ..... { ١٤ ؛ ١٩ ؛ ٤٩ ؛ ٧٠ }
- {٧٤}  $\sqrt[3]{-81} = \dots$  ..... {  $\frac{1}{81}$  ؛  $\frac{1}{9}$  ؛ ٩ - ؛ ٨١ }
- {٧٥} مجموعة حل المعادلة : ٥س (س + ٢) = صفر ح هي ... { {٥ ، ٢} ؛ {٢ ، ٠} ؛ {١ ، ٢-} ؛ {١ - ، ٠} }
- {٧٦} إذا كان : س - ٢ = ٢٥ فإن : س = ..... { ٥ ؛ ٥ ± ؛ ٥ - ؛ ١٠ }
- {٧٧}  $\frac{1}{4}$  العدد  $2^{\frac{1}{4}}$  هو ..... {  $2^{\frac{1}{4}}$  ؛  $2^{\frac{1}{2}}$  ؛  $2^{\frac{1}{4}}$  ؛  $2^{\frac{1}{2}}$  }
- {٧٨} ٢٥ % من ٣٠٠ ..... ١٥ % من ١٥٠ { < ؛ > ؛ = ؛ ≥ }
- {٧٩} مجموعة حل المعادلة : س - ٩ = صفر في ح هي ..... { {٣} ؛ {٣- ، ٣} ؛ {٩} ؛  $\emptyset$  }
- {٨٠} إذا كان : س - ٢ = ل + س + ٦ = (س - ٣)(س - ٢) فإن : ل = ..... { ٥ ؛ ٤ ؛ ٣ ؛ ٥ - }
- {٨١} إذا كان المقدار س + ٢ م + س + ٢ قابلاً للتحليل فإن م = ..... { ٤ ؛ ٢ ؛ ٣ ؛ ١ }
- {٨٢} إذا كان المقدار س + ٥ م + س + ٢ قابلاً للتحليل فإن م = ..... { ٤ ؛ ٢ ؛ ٣ ؛ ١ }
- {٨٣} عددين حاصل ضربهم ١٢ ومجموعهما ٨ هما ..... { -٣ ، ٤ ؛ -٢ ، ٦ ؛ -٢ ، ٦ ؛ -٣ ، ٤ }
- {٨٤} إذا كان (س - ٣) أحد عاملي المقدار : س + ٢ - س - ١٥ فإن العامل الآخر هو ..... { س + ٦ ؛ س + ٥ ؛ س - ٥ ؛ س - ٣ }
- {٨٥} إذا كان :  $2^2 + 2^2 = 2^2 + 2^2$  فإن : ٢٥ = ب + ب = ..... { ٥ ؛ ٥ - ؛ ٥ ± ؛ ١٢ ، ٥ }
- {٨٦} إذا كان :  $2^2 + 2^2 = 2^2 + 2^2$  ، ١١ = ب + ب ، ٥ = ب - ب فإن : ب - ب = ..... { ١ ؛ ١ - ؛ ١ ± ؛ ٤ ± }
- {٨٧} إذا كان : س + ل = س - ١٦ = (س - ٤)(س + ٤) فإن ل = ..... { صفر ؛ ٢ ؛ ٤ ؛ ٨ }
- {٨٨} س + ل = (س - ٢)(س + ٢) فإن ل = ..... { -٤ ؛ ٤ ؛ ٢ ؛ ٢ - }



$$\{ ٢٥ - \text{؛} ٢٥ \text{؛} ١٠ - \text{؛} ١٠ \} \dots\dots = ١ \text{ فإن } (٥ + س) (٥ - س) = ١ - س^٢ \{ ٨٩ \}$$

$$\{ ٦ - \text{؛} ٦ \text{؛} ٨ - \text{؛} ٨ \} \dots = \text{فإن لـ} ( ٤ + \text{س}^٢ + \text{س}^٢ ) ( ٢ - \text{س} ) = \text{لـ} + \text{س}^٢ \{ ٩٠ \}$$

{٩١} مجموعة حل المعادلة:  $s^2 - 1 = 0$  حيث  $s \in \mathbb{C}$  هي .....  $\{\emptyset, \{-3\}, \{-3, 3\}, \{3\}\}$

{ ٩٢ } إذا كان عُمر محمد الآن س سنة فإن عمره منذ أربع سنوات هو ..... سنة { -٤ س ؛ س+٤ ؛ س-٤ ؛ ٤ س }

{٩٣} مجموعة حل المعادلة :  $s^2 = s$  في  $\mathbb{C}$  هي ...  $\{\cdot\}$   $\{\cdot\}$   $\{1\}$   $\{1, 0\}$   $\{1, -1\}$

{ ٩٤ } إذا كانت ٤ حلاً للمعادلة :  $s^2 + m = \text{صفر فإن } m = \dots = \{ ٤ - ٤ \quad ٤ \quad ١٦ - ١٦ \}$

{ ٩٥ } إذا كان : ٢ = ٥ فإن ٨ = ..... { ٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ٢٥ }

{ ١ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ } ..... = ٣<sup>١</sup> ٣<sup>٢</sup> ٣<sup>٣</sup> فإن ٢ = ٣ : إذا كان :

$$\{1 - \epsilon, 1 + \epsilon, \sqrt{v}, -\sqrt{v}\} \dots = (\sqrt{v} - \sqrt{v})(\sqrt{v} + \sqrt{v}) \{v\}$$

{ ٩٨ } إذا كان : س + ص = ٨ ، پ + ب = ٢ فإن س + ص + پ + ب = ..... { ٦ - ؛ ؛ ١٠ ؛ ؛ ١٦ }

$$\{1+s+s^2; 1+s-s^2; 1-s^2; 1+s^2\}(\dots)(1+s)=1+s^2 \{99\}$$

{ ۱۰۰ } إذا كان : ۵ = ۱۱ ، ۱۱ = ۱۲۵ فإن س ص = ..... { ۵۵ ؛ ۱۱ ؛ ۱۲۵ ؛ ۳ }

{ ١٠١ } إذا كان المقدار :  $٩س^٢ + لس + ٢٥$  مربعاً كاملاً فإن :  $ل = \{ \pm ١٥ ; \pm ١٢ ; \pm ٣٠ ; \pm ١٦ \} ....$

$$\{ 1, 2 \} \{ 2, 5 \} \{ 3, 5 \} \{ 2, 3 \} \{ 1, 3 \} \{ 1, 5 \} \{ 2, 3, 5 \} \{ 1, 2, 3 \} \{ 1, 2, 5 \} \{ 1, 3, 5 \} \{ 2, 3, 5 \} \{ 1, 2, 3, 5 \}$$

{١٠٣} م. ح المتباينة :  $s \geq$  صفرفي طهي ..... {٠} ؛ {-١} ؛ {١} ؛ { } ; { }

{١٠٤} المعكوس الضربي للعدد  $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$  هو ..... {٢  $\sqrt[3]{3}$  ٦ ٤ ١}  $\frac{1}{4}$   $\frac{2}{3}$

{ ١٠٥ } عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد أولي فردي = ..... {  $\frac{1}{4}$  ؛  $\frac{1}{2}$  ؛  $\frac{3}{4}$  ؛  $\frac{1}{4}$  }

{ ١، ٦ } م. ح المعادلة : س<sup>٢</sup> - ٦ س = صفر في ح هي .... { ٦ ، ٠ } ؛ { ٦ ، - ٦ } ؛ { ٢ ، ٣ } ؛ { ∅ }

[illegible]

{ ١٠٨ } { المعكوس الضربي للعدد (  $\frac{3}{5}$  ) } = ..... {  $\frac{5}{3}$  } { ٣ - } { ٥ - } {  $\frac{3}{5}$  }

{ ١٠٩ } إذا كان : س + ص = ٣ فإن : ٧ س + ٧ ص = ..... { ٧ ٢١ ٧٢ ١٠ } { ١٠ ٧٢ ٢١ ٧ }

{ ١١٠ } فصل دراسي به ٢٥ ولداً ، ٢٠ بنتاً فإذا اختير أحدهم عشوائياً فإن احتمال أن يكون بنتاً ... { ٢٠ ، ٤٥ ، ٤ } ؛ ؛  $\frac{4}{9}$  ؛ ؛  $\frac{5}{9}$  }

{ ٤ - ٤٤ ٤ ٤٤ ٢ - ٤٤ ٢ } ..... = فان  $\frac{1}{\sqrt{2}} = 3^{-1}$  إذا كان : ١١١ }

{ ١١٢ } سدس العدد  $^{12}_6 = \{ \begin{matrix} 6 \\ 6 \end{matrix} \} = 1$

- { ١١٣ }  $\sqrt[3]{س} = \sqrt[3]{٢٥}$  فإن : س = ..... { ٥ :: ٢٥ :: ٧٥ :: ١٢٥ }
- { ١١٤ } إذا كان :  $(٥ - ٢٢) (٢ - ٢٣) = ٦ + ٢ + ١٠$  فإن ل = ..... { ١٥ :: ١٩ :: ١٩ - :: ٤ }
- { ١١٥ }  $(٢ + س)^٢ =$  ..... {  $س^٢ + ٤ :: س^٢ - ٤ :: س^٢ + ٢ + س + ٤ :: س^٢ + ٤ + س + ٤$  }
- { ١١٦ } إذا كان :  $س^٢ - ٦س - م$  مربعاً كاملاً فإن م = ..... {  $٩ - :: ٩ :: ٣ :: ٩$  }
- { ١١٧ } إذا كان :  $س^٢ + ٢٧ = (س + ل) (س^٢ - ٣س + م)$  فإن : ل  $\times$  م = ..... {  $٢٧ :: ٣ :: ٩ :: ٩ -$  }
- { ١١٨ } إذا كان عمر محمد الآن س سنة فإن عمره منذ خمس سنوات ..... سنة {  $٥س - ٥ :: ٥س :: ٥س + ٥$  }
- { ١١٩ } إذا كان  $س^٥ = ٣$  ،  $٥س = ٧$  فإن :  $٥س - ص =$  ..... {  $٢١ :: ٤ :: \frac{٧}{٣} :: \frac{٣}{٧}$  }
- { ١٢٠ }  $\sqrt[١٢]{.....} = \sqrt[٢]{٣} :: \sqrt[٢]{٣} :: \sqrt[٢]{٢} :: ٣$
- { ١٢١ } المعكوس الجمعي للعدد (٥) صفر = ..... {  $٥ :: ٥ - :: ١ :: ١ -$  }
- { ١٢٢ } إذا كان :  $٣س^١ + ٥س^١ = ١$  فإن س = ..... {  $١ - :: ١ :: ٣ :: ٥$  }
- { ١٢٣ } إذا كان (س + ص)  $^٢ = ٦٤$  ، س ص = ١٥ فإن س  $^٢ + ص^٢ =$  ..... {  $٨ :: ٣٤ :: ٣٤ - :: ٤٩$  }
- { ١٢٤ }  $\frac{٧٥ \times \frac{٢٠}{٧} - ٥ \times \frac{٢٠}{٧}}{.....} =$  {  $٥٠ :: ١٠٠ :: ٢٠٠ :: ٣٠٠$  }
- { ١٢٥ } ضعف مربع العدد س هو ..... {  $(٢س)^٢ :: ٤س^٢ :: ٢س^٢ :: ٢س$  }
- { ١٢٦ }  $٢٥$  صفر = ..... حيث  $٢ \neq$  صفر {  $٥ :: ١ :: ٢ :: ٢٥$  }
- { ١٢٧ }  $٢^٢ \times ٢^٥ =$  ..... {  $٢^٢ :: ٨^٢ :: ١٥^٢ :: ٥٣^٢$  }
- { ١٢٨ }  $س^٤ \times س^٣ = س^٣$  ..... {  $٨ :: ٨ - :: ٢ :: ٣$  }
- { ١٢٩ }  $٨^٢ + ٨^٢ + ٨^٢ + ٨^٢ =$  ..... {  $٢^٤٢ :: ١٠^٢ :: ٨^٤ :: ٢^٤٨$  }
- { ١٣٠ } إذا كان :  $(\frac{٢}{٣})^س = \frac{٨}{٢٧}$  فإن س = ..... {  $٢ :: ٣ :: ١ :: ٨$  }
- { ١٣١ }  $٥ - ١٢ \div ١٥ \times ٤ =$  ..... {  $صفر :: ٢ :: ٧ :: \frac{٦٠}{٧}$  }
- { ١٣٢ }  $(\sqrt[٢]{٤} \times \sqrt[٢]{٢})^٢ =$  ..... {  $٦٤ :: ٣٦ :: ٤ :: ٨$  }

## السؤال الثاني : أكمل

{١} إذا كانت  $٢ س + ٣ = ١$  فإن  $س =$  .....

{٢}  $س + ص = ٤$  ،  $س - ص = ٢$  فإن  $س =$  ..... :  $ص =$  .....

{٣} مجموعة حل المعادلة :  $س - ٢ = ٣$  ،  $٠ =$  في ..... :  $٠ =$  .....

{٤}  $٩ س - ٤ ب = ٢$  ،  $(٣ - س) = (٢ + .....)$  (ب)

{٥}  $٣ س - ..... = (س - ٢) (٢ + .....)$  (ب)

{٦}  $(٥ س - ٢ ص) = (١٠ س + ٢ ص + ٤ ص) =$  .....

{٧} إذا كان :  $\frac{س}{٥} = ٦$  فإن :  $س =$  .....

{٨} كيس به ٩ بطاقات مرقمة من ١ إلى ٩ ،

سُحبت منه بطاقة واحدة عشوائياً فإن احتمال أن

تكون هذه البطاقة تحمل عدداً أولياً فردياً = .....

{٩} دخل ٢٠ تلميذاً وكان احتمال أن يكون ناجحاً

٠,٨ فإن عدد الناجحين = .....

{١٠}  $س(ب + ٢) - ص(ب + ٢) =$  .....

$(ب + ٢) (..... - .....)$

{١١} إذا كان  $٣ س - ٢ = \frac{١}{٩}$  فإن :  $س =$  .....

{١٢} إذا كان  $(\frac{٢}{٣}) = \frac{١}{٣}$  فإن :  $س =$  ....

{١٣} ربع العدد  $٢٤ = ٢ \times$  .....

{١٤} مجموعة حل المعادلة :  $س(س + ١) =$  صفر

في ح هي .....

{١٥} إذا كان  $٧ س = ٩٤$  فإن :  $س =$  .....

{١٦} إذا كانت  $٥ س = ٣$  فإن :  $٥ س + ١ =$  .....

{١٧}  $(\frac{٢}{٣}) = ٤$  (ب)

{١٨} مربع محيطه ٨ سم فإن مساحته = ..... سم<sup>٢</sup>

{١٩}  $(ب + ٢) س + (ب + ٢) ص =$  .....

$(..... + ٢) (..... + ص) =$  .....

{٢٠}  $٥ س - ٢ = ٧ س - ٢$  فإن :  $س =$  .....

{٢١} اكمل بنفس النمط ١ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٨ ، ..... ، .....

{٢٢} إذا كان  $(س - ٣)$  أحد عاملي المقدار

$س٢ + ٢ س - ١٥$  فإن العامل الآخر .....

{٢٣} العدد  $(\sqrt{٢})$  في أبسط صورة = ....

{٢٤} إذا كان  $٣ س - ١ = ٢٧$  فإن  $س =$  .....

{٢٥} إذا اختير عشوائياً أحد أرقام العدد ٧٤٣٥

فإن احتمال أن يكون الرقم المختار زوجياً = .....

{٢٦} إذا كان عمر مجدي الآن  $س$  سنة فإن عمره

بعد ٣ سنوات من الآن هو .....

{٢٧} احتمال الحدث المؤكد = .....

{٢٨} إذا كان  $٦ س = ١١$  فإن  $٦ س + ٦ =$  .....

{٢٩} مجموعة حل المعادلة :  $س - ٢ = ١$  ،  $٨ =$  حيث

$س \in ص +$  هي .....

{٣٠}  $\sqrt{٥} + \sqrt{٥} =$  .....

{٣١} إذا كان :  $٣ س = ٢$  فإن :  $٣ س - ٣ =$  .....

{٣٢}  $٣٤ + ٣٤ + ٣٤ + ٣٤ =$  .....

{٣٣} إذا كان :  $٢ س = ٣$  ،  $٢ ص = ٥$  فإن :  $٢ س + ٢ ص =$  .....



{٣٤} إذا كان : ( ٢ س + ١ ) أحد عاملي المقدار :

٢ س + ٣ س + ١ فإن العامل الآخر .....

{٣٥} ٩ س - ٣ س = ٣ س ( ٣ س - ..... )

{٣٦} إذا كانت : ٢ س - ٢ ص = ٣٥ ، ٣ س - ٣ ص = ٥

فإن : س + ص = .....

{٣٧} مجموعة حل المعادلة : ١٦ + ٢ س = ٠ في ح هي .....

{٣٨} احتمال الحدث المستحيل = .....

{٣٩} ..... = ٣ - ٢

{٤٠} إذا كان : ٢ س - ٢ = (٤ + س) (٤ - س)

فإن : ٢ = .....

{٤١} إذا كان : ٦ س = ٧ فإن : ٦ س + ١ = .....

{٤٢} احتمال ظهور كتابة عند إلقاء قطعة نقود مرة

واحدة = .....

{٤٣} ٢ ص + ٢ = .....

( ص + ..... ) ( ص - ٢ ص + ..... )

{٤٤} إذا كان : ٣ س = ٥ فإن ٣ س + ١ = .....

{٤٥} إذا كان : ( ٣ / ٥ ) س = ٢٧ / ١٢٥ فإن : س = .....

{٤٦} ٣ = ٢ س فإن ٨ س - ٣ = .....

{٤٧} مدرسة بها ٣٠٠ تلميذاً فإذا كان احتمال أن

يكون التلميذ المثالي ولداً هو ٠,٦ فإن عدد البنات

هو .....

{٤٨} إذا كان : ٢ س + ٢ + ٢ = ٢٥

فإن : ٢ + ٢ = .....

{٤٩} ٢ س - ٢ ص = ( ..... - ..... ) ( ..... + ..... )

{٥٠} إذا كان احتمال نجاح طالب ٧,٠ فإن احتمال

رسوبه = .....

{٥١} إذا كان المقدار الثلاثي : ٢ س + ٢ ل + ٣ قابلاً

للتحليل فإن قيمة ل الموجبة = .....

{٥٢} ٢ س × ٢ س = .....

{٥٣} ٢ س + ٧ س + ١٠ = (٢ + س) (٢ + س)

{٥٤} ..... = ٢ ٣ + ٢ ٣ + ٢ ٣

{٥٥} ..... = ٣ س + ٣ س + ٣ س = ١ فإن س = .....

{٥٦} ٢ س - ٨ = ( ..... - ..... ) ( ..... + ..... )

{٥٧} المعكوس الجمعي للعدد ( ٢ - ١ ) هو .....

{٥٨} إذا كان : ٢ / ٣ = ٢ / ٣ فإن : ٢ / ٣ = .....

{٥٩} العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو .....

{٦٠} إذا كان : ٢ س - ٢ = ٥ ، ٢ س + ٢ = ٧

فإن : ٢ س - ٢ = .....

{٦١} ١ ، ٤ ، ٨ ، ١٣ ، ..... ، ..... ( بنفس النمط )

{٦٢} إذا كان : ٥ س + ٢ = ١ فإن : س = .....

{٦٣} إذا كان : ٢ س = ٥ فإن : ٢ س + ١ = .....

{٦٤} المعكوس الضربي للعدد ٢ - ٣ هو .....

{٦٥} إذا كان ( ٢ - ٢ ) أحد عاملي المقدار

٢ - ٢ فإن العامل الآخر .....

{٦٦} في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة

احتمال ظهور العدد ٥ = .....

{٦٧} إذا كان :  $٧ = ٣ - س$  فإن : س = .....

{٦٨} ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ..... ( بنفس النمط )

{٦٩} إذا كان :  $س^٢ - ص^٢ = ١٥$  ،  $س + ص = ٥$

فإن : س - ص = .....

{٧٠} إذا كان :  $(٢٥) - (١٥) = ١٠$  س فإن : س = ..

{٧١} إذا كان :  $س^٢ + ص^٢ = ٥$  ،  $س + ص = ٢$

فإن : ( س + ص ) = .....

{٧٢} عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن

احتمال ظهور عدد أولي أو زوجي أو فردي = ....

{٧٣} مجموعة حل المعادلة :  $\frac{س}{٢} = \frac{٨}{س}$  في ح هي .....

{٧٤} إذا كان :  $س = ٥$  ،  $س + ٥ = ٢$  فإن : س = .....

{٧٥} الحد الناقص ليكون المقدار  $٤س + ..... + ٢٥$  مربعاً كاملاً

{٧٦}  $(٩٩) - ١ = ١٠٠ \times \dots\dots\dots$

{٧٧} إذا كان :  $س^٢ - ص^٢ = ١٠$  ،  $س + ص = ٢$

فإن قيمة  $س^٣ - ٣ص$  = .....

{٧٨} مجموعة حل المعادلة :  $س^٢ - ٥س + ٦ = ٠$

في ح هي .....

{٧٩} إذا كان : س عدد فردي فإن العدد الفردي

التالي له هو .....

{٨٠}  $(\sqrt{٧} + \sqrt{٨})^١٠ (\sqrt{٧} - \sqrt{٨})^١٠ = \dots\dots\dots$

{٨١} مجموعة حل المعادلة :  $س^٣ = ١٦$  س

في ح هو .....

{٨٢}  $(\frac{١}{٤})^{-٢} = \dots\dots\dots$  ؛  $(س^٠)^٣ = \dots\dots\dots$

{٨٣}  $س^٣ - ص^٣ = ٨$  فإن  $\frac{ص}{س} = \dots\dots\dots$

{٨٤}  $س^٠ \times س^{-٤} \times س = \dots\dots\dots$

{٨٥} قيمة المقدار :  $٢^٢ (\sqrt{٢})^{١٢} + \dots\dots\dots$

{٨٦}  $٤ + \sqrt[٤]{٤} - ١ = \dots\dots\dots$

{٨٧} إذا كان أربعة أمثال عدد يساوي ٨ فإن ثلث هذا العدد .....

{٨٨} ثلث العدد ١٠٣ هو .....

{٨٩} نصف العدد ١٠٢ هو .....

{٩٠} ضعف العدد ١٠٢ هو .....

{٩١} مكعب طول حرفه ٤ فإن حجمه .....

{٩٢}  $٢^٧ \times ٣^٧ = \dots\dots\dots$

{٩٣}  $١^{-٣} + ١^{-٣} + ١^{-٣} = \dots\dots\dots$

{٩٤}  $٢٠٢ + ٢١٢ = \dots\dots\dots$

{٩٥}  $٢٢ + ٣٢ = \dots\dots\dots$

{٩٦} مجموعة حل المتباينة :  $س - ٠ >$  في ط هي .....

{٩٧}  $(\sqrt{٣})^٤ \times (\sqrt{٢})^٤ = \dots\dots\dots$

{٩٨} مكعب حجمه ٦٤ سم<sup>٣</sup> فإن طول حرفه .....

{٩٩} مربع محيطه ٥ ص سم فإن مساحته .....

{١٠٠} إذا ألقى نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور العدد ٧ = .....

{١٠١}  $(\sqrt{٧})^٣ \times (\sqrt{٧})^٠ = ٧$  .....

{١٠٢} أربعة أمثال العدد ٢<sup>٨</sup> هو .....

$$\{3\} \text{ س } 1 -$$

$$\{4\} \text{ س } 2 - 7 + 3 - 21$$

$$\{5\} \text{ س } 4 - 9$$

$$\{6\} \text{ س } 3 + 8$$

$$\{7\} \text{ س } 5 - 5$$

$$\{8\} \text{ س } 2 - 7 + 12$$

$$\{9\} \text{ س } 1 - 5$$

$$\{10\} \text{ س } 6 + 8$$

$$\{11\} \text{ س } 2 - 5 - 3$$

$$\{12\} \text{ س } 5 + 7 + 35$$

$$\{13\} \text{ س } 9 - 24 + 16$$

$$\{14\} \text{ س } 27 + 125$$

$$\{103\} (0, 1) - = \dots\dots\dots$$

$$\{104\} = \sqrt[3]{\dots\dots\dots} \div (\sqrt[3]{\dots\dots\dots}) - = \dots\dots\dots$$

$$\{105\} \text{ س } 2 - 5 + 6 = (\dots - 3)(\dots - 3)$$

$$\{106\} \{1, 3\} \cup \{1, 3\} = \dots\dots\dots$$

$$\{107\} \text{ إذا كان المنوال للقيم : } 7, 5, 6, 7, \text{ س } 2 + 6, 5, 7 \text{ هو } 7 \text{ فإن س } = \dots\dots\dots$$

$$\{108\} \text{ س } 2 - 5 + 3 = (3 - \text{س } 2)(3 - \dots)$$

$$\{109\} \text{ إذا كان : } (3 - \text{س } 2)(3 - \text{س } 2) = 9 + 3 + \text{س } 2 = \text{س } 2 - 9 \text{ فإن ك } = \dots\dots\dots$$

$$\{110\} \text{ مستطيل طوله س ، وعرضه ص ومحيطه } 24 \text{ سم فإن : س + ص } = \dots\dots\dots$$

$$\{111\} \text{ إذا كان : س } = \sqrt[5]{2 + \text{فإن س } 2} = \dots\dots\dots$$

$$\{112\} \dots\dots\dots \geq \text{احتمال وقوع أي حدث } \geq \dots\dots\dots$$

$$\{113\} \text{ إذا كان : س هو العنصر المحايد الجمعي و ص هو العنصر المحايد الضربي فإن قيمة } 2 + 3 + \dots\dots\dots$$

$$\{114\} \text{ مجموع احتمال جميع النواتج الممكنة لتجربة عشوائية ما } \dots\dots\dots$$

$$\{115\} \sqrt[3]{9 + 16} + 3 = \dots\dots\dots$$

$$\{116\} \text{ إذا كان : } 2 = 3 - 5 = \text{فإن : س } = \dots\dots\dots$$

السؤال الثالث : اجب عن ما يلي :

أولاً : حل كلاً من المقادير الآتية

$$\{1\} \text{ س } 2 + 8 + 15$$

$$\{2\} \text{ س } 2 + 7 + 3$$



$\{27\} 3ص + 7ص - 6$	$\{15\} ٢س - ٢ص$
$\{28\} ٨س + ٢٧ص - ٣$	$\{16\} ٢١٢٥ + ٢٢$
$\{29\} ٢س - ٢ص$	$\{17\} ٢س + ٥س + ٥ + ٥$
$\{30\} ٢٢ - ٢٢ + ٢٢ - ١$	$\{18\} ١٢ + ٨س + ٢س$
$\{31\} ٢س + ٩س - ٢$	$\{19\} ٢س - ٥٠س$
$\{32\} ٢٠ + ٥س + ٥ص + ٤س$	$\{20\} ١٥ - ٢٥ + ٢٣ - ٢٢$
$\{33\} ٤٥ - ٢س$	$\{21\} ١٦ + ٢س$
$\{34\} ٢٥ + ٢٠ + ٢س + ٢٥$	$\{22\} ١٢٥ - ٢س$
$\{35\} ١٦ + ٢٠ + ٢س + ١٦$	$\{23\} ٨س - ٤س$
$\{36\} ٤ + ٢س - ٤س$	$\{24\} ١٦ - ٨س$
$\{37\} ١٦ - ٢س \frac{1}{4}$	$\{25\} ٦ + ٥س - ٢س$
$\{38\} ١ + ٢س - ٢س$	$\{26\} ١٨ - ٣س + ٢س - ٦س$

$$\{39\} 50 + 10 + 1 + 22 = م$$

$$\{3\} 3 - 12 = س = \text{صفر}$$

$$\{40\} 3 - س$$

$$\{4\} 3 + 2 - 28 = \text{صفر}$$

$$\{41\} 2 - 18 = س$$

$$\{5\} 6 - 2 = س = \text{صفر}$$

$$\{42\} 3 - 75 = س$$

$$\{6\} 9 = س$$

$$\{43\} 2 - 25 = س$$

$$\{7\} 5 - 4 = س = \text{صفر}$$

$$\{44\} \text{ باستخدام التحليل أوجد ناتج } 1 + 99 \times 2 + 2(99)$$

$$\{8\} (س - 4) = 32$$

$$\{45\} \text{ باستخدام التحليل أوجد ناتج } 1 - 2(99)$$

$$\{9\} س (س + 3) = 28$$

$$\{46\} \text{ باستخدام التحليل أوجد ناتج } 2(25) - 2(75)$$

$$\{10\} 9 - س + 14 = \text{صفر}$$

$$\{47\} \text{ باستخدام التحليل أوجد ناتج } 29 \times 31$$

$$\{11\} 4 + س = 21$$

ثانيا : اوجد مجموعة حل المعادلات الآتية

$$\{1\} 8 - س + 12 = \text{صفر}$$

$$\{12\} (س - 3) (س + 1) = 5$$

$$\{2\} 6 - س = \text{صفر}$$

$$\{13\} س (س - 5) + 6 = \text{صفر}$$

{١٤} س<sup>٢</sup> - ٢ س - ١٥ = صفر

{٥} عدد حقيقي إذا أضيف إليه مربعه كان الناتج ١٢ فما هو العدد

{١٥} س<sup>٢</sup> - ٧ س + ١٠ = صفر{٦} مستطيل طوله ثلاثة أمثاله عرضه فإذا كانت مساحته ١٢ سم<sup>٢</sup> فأوجد بعدي المستطيل{١٦} س<sup>٢</sup> + ٥ س + ٦ = صفر

{٧} أوجد العدد الحقيقي الموجب الذي إذا أضيف مربعه إلى ثلاثة أمثاله كان الناتج مساوياً ٢٨

{١٧} س<sup>٢</sup> - س = ١٢

{٨} أوجد العدد الحقيقي الذي ضعفه يزيد عن معكوسه الضربي بمقدار الواحد الصحيح

ثالثاً : المسائل اللفظية

{١} عددان فرديان متتاليان حاصل ضربهما ٩٩ أوجد العددين .

{٩} عددان حقيقان أحدهما ضعف الآخر فإذا كان حاصل ضربهما ١٨ فما العددان .

{٢} مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار ٥ سم فإذا كانت مساحته ١٤ سم<sup>٢</sup> أوجد كلاً من الطول والعرض .

{١٠} عدد صحيح موجب يزيد مربعه عن ضعفه بمقدار ٣٥ فما العدد .

{٣} عدد نسبي موجب يزيد مربعه عن ثلاثة أمثاله بمقدار ٢٨ أوجد العدد .

رابعاً : اختصر لأبسط صورة

$$\frac{\sqrt[3]{6} \times \sqrt[4]{6}}{\sqrt[3]{3} \times \sqrt[4]{2}} \quad \{١\}$$

{٤} عدد حقيقي موجب مربعه يساوي أربعة أمثاله . أوجد هذا العدد

$$\frac{\sqrt[2]{3} \times \sqrt[3]{2}}{(\sqrt[2]{2}) \times 3} \quad \{٢\}$$



$$\{10\} \frac{\text{س } 4 \times \text{س } 9}{\text{س } 12} \text{ ثم أوجد قيمة الناتج عندما س} = -1$$

$$\{3\} \frac{\text{س } 2 \times \text{س } 3}{\text{س } 6}$$

$$\{11\} \frac{\text{س } 8 \times \text{س } 9}{\text{س } (18)} = 64$$

$$\{4\} \frac{4 - (\sqrt[3]{2}) \times 3 - (\sqrt[3]{3})}{0 - (\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{3})}$$

$$\{12\} \frac{\text{س } 3 \times \text{س } 5}{\text{س } (15)}$$

$$\{5\} \frac{4 - (\sqrt[3]{2}) \times 3 - (\sqrt[3]{3})}{0 - (\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{3})}$$

$$\{13\} \text{ إذا كان س} = \sqrt[3]{2} \text{ ، ص} = 3 \text{ فأوجد قيمة المقدار (س}^2 \text{ - ص}^2 \text{)}^3$$

$$\{6\} \frac{\text{س } 8 \times \text{س } 5}{\text{س } (20)}$$

$$\{14\} \text{ إذا كان م} = \sqrt[3]{3} \text{ ، ب} = \sqrt[3]{2} \text{ فأوجد قيمة المقدار م}^4 \text{ - ب}^4$$

$$\{7\} \frac{\text{س } 2 \times \text{س } 9}{\text{س } (18)}$$

$$\{15\} \frac{\text{س } 4 \times \text{س } 6}{\text{س } 3 \times \text{س } 2}$$

$$\{8\} \frac{\text{س } 4 \times \text{س } 9}{\text{س } 6} = 2 \text{ ص} = 1 \text{ أوجد قيمة ص}$$

$$\{16\} \frac{2(\sqrt[3]{3}) \times 0(\sqrt[3]{3})}{4(\sqrt[3]{3})}$$

$$\{9\} \frac{\text{س } 3 \times \text{س } 2}{\text{س } 6}$$

## خامساً : أوجد قيمة س

{١} إذا كان :  $٢٧ = ٣^س$  ،  $٤ = ١^س + ٣^س$  فأوجد قيمة س ، ص

{٨} إذا كان :  $٨١ = ٣^{٢-س}$

$$\{٢\} \frac{١}{٢} = \frac{٣^س \times ٢^س}{٣(١٢)}$$

$$\{٩\} \text{ إذا كان : } \left(\frac{٢}{٣}\right)^{٥+س} = \left(٣ \frac{٣}{٨}\right)^{٢-}$$

$$\{٣\} \text{ إذا كان : } \left(\frac{٢}{٣}\right)^{٢-س} = \frac{٨}{٢٧} \text{ فأوجد س + ٣}$$

$$\{١٠\} \text{ إذا كان : } ٣^{٢-س} = \frac{١}{٩}$$

$$\{٤\} \text{ إذا كان : } ٢٧ = ٣^{٢-س}$$

$$\{١١\} \text{ إذا كان : } ٣٢ = ٢^{١-س}$$

$$\{٥\} \text{ إذا كان : } ٤ = ٣ + ٣^س = \frac{١}{١٦}$$

$$\{١٢\} \text{ إذا كان : } ١ = ٣^{٤-س}$$

$$\{٦\} \text{ إذا كان : } ٩^{س+٤} = \frac{١}{٨١}$$

$$\{١٣\} \text{ إذا كان : } ٥\sqrt{٢} = ٣\sqrt{٢} = \text{ص} ، \sqrt{٢} = \text{ص}$$

فأوجد قيمة س<sup>٢</sup> - ص<sup>٤</sup>

$$\{٧\} \text{ إذا كان : } \left(\frac{٣}{٥}\right)^{١-س} = \frac{٢٧}{١٢٥}$$

$$\{١٤\} \text{ إذا كان : } \left(\sqrt[٣]{٣}\right)^{١+س} = ٩ \text{ فأوجد قيمة س}$$

## سادساً : الإحصاء

{١} صندوق يحتوي علي ٤ كرات بيضاء و ٥ كرات حمراء و ٦ كرات سوداء متماثلة ، فإذا سحب كرة واحدة عشوائياً ٠ ما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة

{١} حمراء

{٢} ليست سوداء

{٣} بيضاء أو سوداء

{٤} ليست سوداء ولا حمراء

{٥} صفراء

{٢} ألقى حجر نرد منتظم مرة واحدة ولو حظ العدد الظاهر علي الوجه العلوي ما احتمال الحصول علي :

{١} عدد زوجي

{٢} عدد فردي

{٣} عدد أولي

{٤} عدد أولي زوجي

{٥} عدد فردي أقل من ٤

{٦} ظهور عدد أكبر من ٤

{٧} ظهور العدد ٥

{٨} لا يقبل القسمة علي ٥

{٩} أكبر من ٦ أو يساوي ٦

{٣} كيس يحتوي علي عدد من الكرات المتماثلة منها ٥ كرات بيضاء والباقي من اللون الأحمر ، فإذا كان احتمال سحب كرة حمراء يساوي  $\frac{2}{3}$  فأوجد العدد الكلي للكرات

{٤} كيس به عدد من الكرات المتماثلة منها ٢ باللون الأخضر ، ٤ باللون الأزرق والباقي باللون الأحمر ، فإذا كان احتمال سحب كرة باللون الأخضر هو  $\frac{1}{4}$  فأوجد عدد الكرات الحمراء

{٥} سلة بها كرات متماثلة مرقمة من ١ إلي ١٥ ، سُحبت كرة عشوائية فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة

{١} تحمل عدداً زوجياً

{٢} تحمل عدداً يقبل القسمة علي ٣

{٣} تحمل عدداً أولياً

{٤} تحمل العدد ٢٠

{٥} عدداً مربعاً كاملاً

{٦} سلة بها كرات متماثلة مرقمة من ١ إلي ٢٤ ، سُحبت كرة عشوائية فما احتمال أن تكون الكرة

{١} عدد مضاعف للعدد ٦

{٢} عدد مربع كامل

{٣} عدد أولي فردي

{٧} يلعب نادي ٣٠ مباراة في الدوري العام فإذا كان احتمال تعادله في إحدى المباريات هو ٠,٣ واحتمال فوزه ٠,٦

أوجد {١} عدد المباريات المتوقع أن يتعادلها

{٢} عدد المباريات المتوقع أن يخسرها



## مراجعة ليلة الامتحان

## أولاً : تحليل المقادير الجبرية :

س١ حل كلاً مما يأتي تحليلًا كاملاً :

<p>① س<sup>٢</sup> + ٧س + ١٠</p> <p>(الحل) = (س + ٢)(س + ٥)</p>	<p>② س<sup>٢</sup> - ٧س + ١٢</p> <p>(الحل) = (س - ٣)(س - ٤)</p>
<p>③ س<sup>٢</sup> + ٤س - ١٢</p> <p>(الحل) = (س - ٢)(س + ٦)</p>	<p>④ س<sup>٢</sup> - ٥س - ٢٤</p> <p>(الحل) = (س + ٣)(س - ٨)</p>
<p>⑤ ٩س<sup>٢</sup> + ٣٠س + ٢٥</p> <p>(الحل) = ٣(س + ٥)<sup>٢</sup></p>	<p>⑥ ٦س<sup>٢</sup> - ١٩س - ٧</p> <p>(الحل) = (س - ٢)(س + ٣)</p>
<p>⑦ س<sup>٢</sup> - ٢٥</p> <p>(الحل) = (س - ٥)(س + ٥)</p>	<p>⑧ ٤س<sup>٢</sup> - ٩</p> <p>(الحل) = (س - ٣)(س + ٣)</p>
<p>⑨ ٣س<sup>٣</sup> - ١٢س</p> <p>(الحل) = ٣س(س<sup>٢</sup> - ٤)</p> <p>٣س(س - ٢)(س + ٢) =</p>	<p>⑩ س<sup>٤</sup> - ٤س<sup>٤</sup></p> <p>(الحل) = (س<sup>٢</sup> - ٢س + ٢ص)(س<sup>٢</sup> + ٢س + ٢ص)</p> <p>(س - ٢ص)(س + ٢ص) =</p>
<p>⑪ س<sup>٣</sup> - ١٢٥</p> <p>(الحل) = (س - ٥)(س<sup>٢</sup> + ٥س + ٢٥)</p>	<p>⑫ ٢٧س<sup>٣</sup> + ٦٤</p> <p>(الحل) = (٤س + ٣)(٩س<sup>٢</sup> - ١٢س + ٦٤)</p>
<p>⑬ س<sup>٤</sup> - س</p> <p>(الحل) = س(س<sup>٣</sup> - ١)</p> <p>س(س - ١)(س<sup>٢</sup> + س + ١) =</p>	<p>⑭ ٤س<sup>٣</sup> + ٤</p> <p>(الحل) = ٤(س<sup>٣</sup> + ١)</p> <p>٤(س + ٢)(س<sup>٢</sup> - ٢س + ٤) =</p>
<p>⑮ ٢١س - ٣س + ٧س</p> <p>(الحل) = (٢١ - ٣س) + (٧س - ٣س)</p> <p>٣(٧ - س) + ٣(٧ - س) =</p> <p>٣(٧ - س)(٣ + ١) =</p>	<p>⑯ ١ + ٢س + ٣س</p> <p>(الحل) = (١ + ٢س) + (٣س - ٢س)</p> <p>(١ + ٢س) + (١ + ٢س) =</p> <p>(١ + ٢س)(١ + ٢س) =</p>
<p>⑰ س<sup>٢</sup> - ٢س + ٢ص - ٤ع</p> <p>(الحل) = (س<sup>٢</sup> - ٢س + ٢ص) - (٤ع - ٢ص)</p> <p>(س - ٢ص) - (٤ع - ٢ص) =</p> <p>(س - ٢ص - ٤ع + ٢ص) =</p>	<p>⑱ س<sup>٢</sup> - ٢ص + ٢س + ٢ص</p> <p>(الحل) = (س<sup>٢</sup> - ٢ص) + (٢س + ٢ص)</p> <p>(س + ٢ص)(س - ٢ص) + (٢س + ٢ص) =</p> <p>(س + ٢ص)(س - ٢ص + ٢س + ٢ص) =</p>

## ٢س استخدام التحليل أوجد قيمة كل من :

$\textcircled{1} \quad {}^2(20, 7) - {}^2(0, 7) + 20, 7 \times 1, 4 - {}^2(99) - 1$ $\text{(الحل)} \quad {}^2(0, 7 - 20, 7) =$ $400 = {}^2(20) =$	$\textcircled{2} \quad {}^2(99) - 1$ $\text{(الحل)} \quad (1 - 99)(1 + 99) =$ $9900 = 99 \times 100 =$
---	--

## ٣س أكمل ما يأتي :

$\textcircled{1} \quad \text{إذا كان: (س + ٤) أحد عوامل المقدار: س}^2 - \text{س}^3 - 28 \text{ فإن : العامل الآخر هو } \dots\dots\dots$ $\text{(الحل)} \quad \therefore \text{س}^2 - \text{س}^3 - 28 = (\text{س} + 4)(\text{س} - 7) \therefore \text{العامل الآخر هو (س - 7)}$	$\textcircled{2} \quad \text{إذا كان المقدار : س}^2 + \text{ل س} - 11 \text{ قابلاً للتحليل فإن : م} = \pm 10 \dots\dots\dots$
$\textcircled{3} \quad \text{إذا كان: س + ص = 6 ، س - ص = 2 فإن : س}^2 - \text{ص}^2 = \dots\dots\dots$ $\text{(الحل)} \quad \text{س}^2 - \text{ص}^2 = 2 \times 6 = 12$	$\textcircled{4} \quad \text{إذا كان: س}^2 - \text{ص}^2 = 20 ، س + ص = 5 فإن : ص - س = \dots\dots\dots$ $\text{(الحل)} \quad \text{ص - س} = 20 \div (5 -) = -4$
$\textcircled{5} \quad \text{إذا كان: س}^3 + \text{ص}^3 = 28 ، \text{س}^2 - \text{ص ص} + \text{ص}^2 = 14 فإن : س - ص = \dots\dots\dots$ $\text{(الحل)} \quad \text{س - ص} = 28 \div 14 = 2$	$\textcircled{6} \quad \text{إذا كان: س + ص = 3 ، م - 2 - (س + ص) = 2 - (س + ص) = \dots\dots\dots$ $\text{(الحل)} \quad (س + ص) = (م - 2 - 2) \div 3 = 7 \div 3 = 21$
$\textcircled{7} \quad \text{إذا كان المقدار : س}^2 + \text{ل س ص} + 36 \text{ ص}^2 \text{ مربعاً كاملاً فإن : ل} = \dots\dots\dots$ $\text{(الحل)} \quad \text{ل} = \pm 2 \times 1 \times 6 = \pm 12$	$\textcircled{8} \quad \text{إذا كان المقدار : س}^2 + 10 \text{ س} + م \text{ مربعاً كاملاً فإن : م} = \dots\dots\dots$ $\text{(الحل)} \quad م = \frac{10 \times 10}{4} = 25$
$\textcircled{9} \quad \text{إذا كان : س}^2 + 2 \text{ س ص} + \text{ص}^2 = 9 \text{ فإن : س + ص} = \pm 3 \dots\dots\dots$	$\textcircled{10} \quad \text{إذا كان : م}^2 + 2 \text{ م} = 11 ، م - 5 = 5 \text{ فإن : م - 5} = \dots\dots\dots$ $\text{(الحل)} \quad (م - 5)^2 = 2 \times 11 - 5 = 1$ $\therefore م - 5 = \pm 1$

## ثانياً : حل المعادلة من الدرجة الثانية والتطبيقات عليها :

**س٤** أوجد مجموعة الحل في ح لكل من المعادلات الآتية :

<p>٢) <math>٢س^٢ - ٩س + ٤ = ٠</math>  <b>(الحل)</b> <math>(٢س - ١)(س - ٤) = ٠</math>  <math>س = \frac{١}{٢}</math> ، <math>س = ٤</math>  <math>\therefore</math> مجموعة الحل = <math>\{ ٤, \frac{١}{٢} \}</math></p>	<p>١) <math>س^٢ - س - ٦ = ٠</math>  <b>(الحل)</b> <math>(س + ٢)(س - ٣) = ٠</math>  <math>س = -٢</math> ، <math>س = ٣</math>  <math>\therefore</math> مجموعة الحل = <math>\{ ٣, -٢ \}</math></p>
<p>٤) <math>س^٢ + ٩ = ٠</math>  <b>(الحل)</b> <math>\emptyset</math> = مجموعة الحل</p>	<p>٣) <math>س^٢ - ٩ = ٠</math>  <b>(الحل)</b> <math>(س - ٣)(س + ٣) = ٠</math>  <math>س = ٣</math> ، <math>س = -٣</math>  <math>\therefore</math> مجموعة الحل = <math>\{ ٣, -٣ \}</math></p>
<p>٦) <math>س^٢ = ٤س</math>  <b>(الحل)</b> <math>س^٢ - ٤س = ٠</math>  <math>س(س - ٤) = ٠</math>  <math>س = ٤</math> ، <math>س = ٠</math>  <math>\therefore</math> مجموعة الحل = <math>\{ ٤, ٠ \}</math></p>	<p>٥) <math>س^٢ + س = ٠</math>  <b>(الحل)</b> <math>س(س + ١) = ٠</math>  <math>س = ٠</math> ، <math>س = -١</math>  <math>\therefore</math> مجموعة الحل = <math>\{ ٠, -١ \}</math></p>

**س٥** مسائل تتحول إلى معادلات لفظية :

<p>٢) عدد حقيقي موجب إذا أضيف إلي مربعه كان الناتج ١٢ فما هو هذا العدد ؟  <b>(الحل)</b> نفرض أن : العدد هو س  <math>س^٢ + س = ١٢</math>  <math>س^٢ + س - ١٢ = ٠</math>  <math>(س - ٣)(س + ٤) = ٠</math>  <math>س = ٣</math> ، <math>س = -٤</math>  <math>\therefore</math> العدد هو ٣</p>	<p>١) أوجد العدد الموجب الذي مربعه يساوي ضعفه .  <b>(الحل)</b> نفرض أن : العدد هو س  <math>س^٢ = ٢س</math>  <math>س^٢ - ٢س = ٠</math>  <math>س(س - ٢) = ٠</math>  <math>س = ٢</math> ، <math>س = ٠</math>  <math>\therefore</math> العدد هو ٢</p>
<p>٤) مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار ٤سم ومساحته ٢١سم<sup>٢</sup> أوجد بعديه  <b>(الحل)</b> نفرض أن: بعديه المستطيل س ، س + ٤  <math>س(س + ٤) = ٢١</math>  <math>س^٢ + ٤س - ٢١ = ٠</math>  <math>(س - ٣)(س + ٧) = ٠</math>  <math>س = ٣</math> ، <math>س = -٧</math>  <math>\therefore</math> بعديه المستطيل هما ٣سم ، ٧سم</p>	<p>٣) أوجد العدد النسبي الموجب الذي يزيد مربعه عن ثلاثة أمثاله بمقدار ٢٨  <b>(الحل)</b> نفرض أن : العدد هو س  <math>س^٢ - ٣س = ٢٨</math>  <math>س^٢ - ٣س - ٢٨ = ٠</math>  <math>(س - ٧)(س + ٤) = ٠</math>  <math>س = ٧</math> ، <math>س = -٤</math>  <math>\therefore</math> العدد هو ٧</p>



**تدريب :** عددان موجبان أحدهما ينقص عن الآخر بمقدار ٤ ، فإذا كان حاصل ضرب العددين يساوي ٤٥.

فما العددان ؟

### ثالثًا : حل المعادلة الأسية :

**س٦** أوجد قيمة س في كل مما يأتي :

<p>① <math>٢س + ٣ = ١</math></p> <p>(الحل) <math>٠ = ٣ + س</math></p> <p><math>\therefore س = -٣</math></p>	<p>② <math>٥س - ٢ = ٧س - ٢</math></p> <p>(الحل) <math>٠ = ٢ - س</math></p> <p><math>\therefore س = ٢</math></p>
<p>③ <math>٢س + ١ = ٨</math></p> <p>(الحل) <math>٢س = ١ + ٨</math></p> <p><math>٢س = ٩</math></p> <p><math>س = ٤.٥</math></p>	<p>④ <math>(\frac{٣}{٥})^{٢س - ٤} = \frac{٩}{٢٥}</math></p> <p>(الحل) <math>(\frac{٣}{٥})^{٢س - ٤} = (\frac{٣}{٥})^٢</math></p> <p><math>٢س - ٤ = ٢</math></p> <p><math>٢س = ٦</math></p> <p><math>\therefore س = ٣</math></p>
<p>⑤ <math>(\frac{٢}{٣})^{١ + س} = \frac{٣}{٨}</math></p> <p>(الحل) <math>(\frac{٢}{٣})^{١ + س} = (\frac{٢}{٣})^{-٣}</math></p> <p><math>١ + س = -٣</math></p> <p><math>س = -٤</math></p>	<p>⑥ <math>(\sqrt[٣]{٣})^{٢ - س} = ٩</math></p> <p>(الحل) <math>(\sqrt[٣]{٣})^{٢ - س} = (\sqrt[٣]{٣})^٤</math></p> <p><math>٢ - س = ٤</math></p> <p><math>-س = ٢</math></p> <p><math>س = -٢</math></p>
<p>⑦ إذا كان : <math>٢٧ = ٣س</math> ، <math>٤س + ١ = ١</math> أوجد قيمة : س ، ص</p> <p>(الحل) <math>٢٧ = ٣س \therefore ٣ = س</math></p> <p><math>٤س + ١ = ١ \therefore ٤س = ٠ \therefore س = ٠</math></p> <p><math>٣ - = ص</math></p>	

## رابعًا : مسائل اختصر لأبسط صورة :

٧س : اختصر لأبسط صورة كل مما يأتي :

$\frac{2^{-}(3) \times 0^{-}(\sqrt{2})}{(\sqrt{2}) \times 3^{-}(3)} \quad \textcircled{2}$ <p>(الحل) <math>3+2-(3) \times 9-0^{-}(\sqrt{2}) =</math></p> $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4} = (3) \times 4^{-}(\sqrt{2}) =$	$\frac{9^{-}(\sqrt{3}) \times 4^{-}(\sqrt{3})}{3^{-}(\sqrt{3})} \quad \textcircled{1}$ <p>(الحل) <math>3-9+4-(\sqrt{3}) =</math></p> $3 = 2^{-}(\sqrt{3}) =$
$\frac{1-23 \times 29}{227} \quad \textcircled{4}$ <p>(الحل) <math>\frac{1-23 \times 29}{23 \times 29} =</math></p> $2-1-23 =$ $\frac{1}{3} = 1-3 =$	$\frac{1+25 \times 1+23}{215} \quad \textcircled{3}$ <p>(الحل) <math>\frac{1+25 \times 1+23}{25 \times 23} =</math></p> $2-1+25 \times 2-1+23 =$ $15 = 5 \times 3 =$
$\frac{29 \times 1+24}{226} \quad \textcircled{6}$ <p>(الحل) <math>\frac{223 \times 2+222}{223 \times 222} =</math></p> $22-2+222 =$ $4 = 22 =$	$\frac{226 \times 24}{223 \times 242} \quad \textcircled{5}$ <p>(الحل) <math>\frac{223 \times 22 \times 222}{223 \times 242} =</math></p> $24-22+222 =$ $2 \text{ صفر } = 1 =$

## ٨س : تمارين متنوعة :

$\textcircled{2} \text{ إذا كان : } \frac{227 \times 24}{212} = 81$ <p>أوجد قيمة م ثم أوجد قيمة ٢</p> <p>(الحل) <math>81 = \frac{233 \times 24}{223 \times 24}</math></p> $43 = 23$ $4 = م$ <p>عندما <math>4 = م \leftarrow 2 = 16</math></p>	$\textcircled{1} \text{ اختصر لأبسط صورة : } \frac{2-29 \times 1+24}{226}$ <p>ثم احسب قيمة الناتج عندما م = 1</p> <p>(الحل) <math>\frac{22-43 \times 2+222}{223 \times 222} =</math></p> $22-22-43 \times 22-2+222 =$ $24-43 \times 4 =$ <p>عندما <math>1 = م \leftarrow 4 = 1 = 4-43</math></p>
---	--

## س٩ تمارين التعويض :

<p>① إذا كان: س = ٢ ، ص = ٣</p> <p>فأوجد قيمة : <math>(س^٢ - ص^٢)</math></p> <p>(الحل)</p> $[٢(٣) - ٢(٢)] = ٢(٣ - ٢)$ $٢(٩ - ٨) =$ $١ - = ٢(١ -) =$	<p>② إذا كان: س = ٢ ، ص = ٣</p> <p>فأوجد قيمة : <math>(س + ص)^٢</math> ، <math>(\frac{ص}{س})^٢</math></p> <p>(الحل)</p> $٢ - (٢ - ٢) = ٢ - (٢ - ٢)$ $\frac{١}{٣} = ٢ - (٢) =$ $\frac{١}{٨} - = ٢(\frac{٢}{٣}) = ٢(\frac{ص}{س}) ،$
---	---

## س١٠ أكمل ما يأتي :

<p>① <math>\frac{٢}{٣} = ٢ - (\frac{٢}{٣})</math> (الحل) <math>\frac{٢}{٣}</math></p>	<p>② <math>١ = ٩(٢ - ٣)(٢ + ٣)</math></p>
<p>③ <math>١ = ٢(\frac{١}{٢}) - ١ - ٢ +</math> صفر</p>	<p>④ <math>(٣ - س) = ١</math> فإن: س <math>\in</math> ح - {٣}</p>
<p>⑤ س <math>\times</math> س <math>\times</math> س <math>\times</math> س = ٢</p>	<p>⑥ <math>٢ = ٥ - (٢) \div ١٥(٢)</math></p>
<p>⑦ اختر: <math>٣٥ \times ٢٢ =</math> .....</p>	<p>⑧ اختر: <math>(٢٥، ١٥، ٢٠، ٥) = ٥ \div (١ + س - ٢ + س) =</math> .....</p>
<p>⑨ ربع العدد ١٦٤ = .....</p> <p>(الحل) <math>١٥٤ = \frac{١٦٤}{١٤} =</math></p>	<p>⑩ <math>٥٤ + ٥٤ + ٥٤ + ٥٤ =</math> .....</p> <p>(الحل) <math>٦٤ = ١٤ \times ٥٤ =</math></p>
<p>⑪ ضعف العدد ٨٢ = .....</p> <p>(الحل) <math>٩٢ = ٨٢ \times ١٢ =</math></p>	<p>⑫ إذا كان: ٢ = ٢٢ : فإن ٥ = ٢٨ : .....</p> <p>(الحل) <math>١٢٥ = ٣٥ = ٣(٢٢) =</math></p>
<p>⑬ إذا كان: ٣ = ٣ ، ٧ = ٣ ص</p> <p>فإن: ٣ + ص = .....</p> <p>(الحل) <math>٣٥ = ٥ \times ٧ = ٣ \times ٣ =</math></p>	<p>⑭ إذا كان: ٣ = ٣ ، ٧ = ٣ ص</p> <p>فإن: ٣ - ص = .....</p> <p>(الحل) <math>\frac{٣}{٧} = ١ - ٧ \times ٣ = ٣ - ٢ \times ٣ =</math></p>
<p>⑮ إذا كان: ١١ = ٢٦ : فإن: ١ + ٢٦ = .....</p> <p>(الحل) <math>٦٦ = ١١ \times ٦ = ٥ \times ٥ =</math></p>	<p>⑯ إذا كان: ٢ = ٢٣ : فإن: ٢ + ٢٣ = .....</p> <p>(الحل) <math>١٨ = ٩ \times ٢ = ٣ \times ٣ =</math></p>



<p>١٧ إذا كان : <math>٥ = ٢٦</math>  فإن : <math>١ - ٢٦ = \dots\dots\dots</math>  (الحل) <math>٥ = ١ - ٢٦ \times ٦ = \frac{١}{٦} \times ٥ = \frac{٥}{٦}</math></p>	<p>١٨ إذا كان : <math>٦ = ١ + ٢٢</math>  فإن : <math>٢٢ = \dots\dots\dots</math>  (الحل) <math>٦ = ٢ \times ٢ = ٣ = ٢٢</math></p>
<p>١٩ إذا كان : <math>\left(\frac{٥}{٣}\right)^س = \frac{٢٧}{١٢٥}</math>  فإن : <math>س = \dots\dots\dots</math>  (الحل) <math>٣ - =</math></p>	<p>٢٠ إذا كان : <math>٨ = ٣ - ٣</math>  فإن : <math>\frac{ص}{س} = \dots\dots\dots</math>  (الحل) <math>\frac{١}{٢} =</math></p>

### خامساً : الإحصاء :

#### س ١١ أكمل ما يأتي :

<p>٢ احتمال الحدث المؤكد = واحد</p>	<p>١ احتمال الحدث المستحيل = صفر</p>
<p>٤ مجموع الاحتمالات لكل النواتج الممكنة  لتجربة عشوائية = واحد</p>	<p>٣ أي احتمال لا يقل عن صفر  ولا يزيد عن واحد</p>
<p>٦ عند إلقاء عملة معدنية مرة واحدة  فإن : احتمال ظهور صورة <math>= \frac{١}{٢}</math></p>	<p>٥ اختر : أي مما يأتي يمكن أن يكون احتمالاً لحدث  ما ؟ [ ٠,٣٥ ، ٠,٨٧ ، ١,٠٥ ، ١٣٠ % ]</p>
<p>٨ إذا كان احتمال فوز فريق ما ٠,٧ ، واحتمال  تعادله ٠,١ فإن : احتمال خسارته <math>= \dots\dots\dots</math></p>	<p>٧ إذا كان احتمال نجاح طالب ٠,٧  فإن احتمال رسوبه <math>= \dots\dots\dots</math></p>
<p>١٠ مدرسة مشتركة بها ٩٠٠ تلميذ ، اختيرت  ٧٠ بنتاً من بين عينة عشوائية قدرها ١٥٠ تلميذ  فإن : عدد البنات المتوقع في المدرسة = .....  (الحل) <math>٤٢٠ = \frac{٧٠}{١٥٠} \times ٩٠٠ =</math> بنت</p>	<p>٩ إذا كان عدد تلاميذ فصل ٣٦ تلميذا منهم  ٢٠ ولداً ، فإذا اختير تلميذ عشوائياً  فإن احتمال أن يكون هذا التلميذ بنتاً = .....  (الحل) <math>\frac{٤}{٩} = ٣٦ \div ١٦ =</math></p>

#### س ١٢ مسائل علي الاحتمال :

<p>٢ ألقى حجر نرد منتظم مرة واحدة ولوحظ العدد  الظاهر على الوجه العلوي .  أوجد احتمال الحصول على :</p> <p>( أ ) فردي <math>\frac{١}{٢} = \frac{٣}{٦} =</math></p> <p>( ب ) أولي زوجي <math>\frac{١}{٢} =</math></p> <p>( ج ) عدد أولى أقل من أو يساوي ٤ <math>\frac{٢}{٣} = \frac{٤}{٦} =</math></p> <p>( د ) ظهور عدد أقل من ٦ <math>\frac{٥}{٦} =</math></p>	<p>١ صندوق به ٧ كرات حمراء ، ٥ كرات زرقاء ،  ٣ كرات خضراء سحبت كرة واحدة عشوائياً .  احسب احتمال أن تكون الكرة المسحوبة :</p> <p>( أ ) حمراء <math>\frac{٧}{١٥} =</math></p> <p>( ب ) زرقاء أو خضراء <math>\frac{٨}{١٥} =</math></p> <p>( ج ) ليست زرقاء <math>\frac{٢}{٣} = \frac{٨}{١٥} =</math></p> <p>( د ) صفراء = صفر</p>
--	---

## ٣ سحب بطاقة واحدة عشوائياً من بطاقات

متماثلة مرقمة من ١ إلى ١٥

أوجد احتمال أن تحمل البطاقة عدداً :

(أ) أولي  $\frac{2}{5} = \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$

(ب) يقبل القسمة على ٣  $\frac{1}{3} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$

(ج) عدد أكبر من أو يساوي ٦  $\frac{2}{3} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

(د) مربع كامل  $\frac{1}{5} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$

## ٤ إذا كان احتمال فوز أحد النوادي في مباريات

الدوري العام ٦, ٠, واحتمال تعادله ٣, ٠

فإذا كان عدد المباريات التي سيلعبها ٣٠ مباراة :

(أ) كم عدد المباريات التي تتوقع أن يفوز بها ؟

(الحل)  $\frac{1}{10} \times 30 = 3$  ١٨ مباراة

(ب) كم عدد مرات هزيمته المتوقعة ؟

(الحل)  $\frac{1}{10} \times 30 = 3$  ٣ مباريات

## ٥ كيس يحتوي على عدد من الكرات المتماثلة منها ٥

كرات بيضاء والباقي من اللون الأحمر، فإذا كان

احتمال سحب كرة حمراء يساوي  $\frac{2}{3}$ 

فأوجد العدد الكلي للكرات .

(الحل) احتمال الكرة البيضاء  $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

∴ عدد الكلي للكرات  $3 \times 5 = 15$  كرة

## ٦ كيس به عدد من الكرات المتماثلة منها ٢ باللون

الأخضر، ٤ باللون الأزرق والباقي باللون الأحمر، فإذا

كان احتمال سحب كرة باللون الأخضر هو  $\frac{1}{6}$ 

فأوجد عدد الكرات الحمراء.

(الحل) العدد الكلي للكرات  $2 \times 6 = 12$  كرة

∴ عدد الكرات الحمراء  $12 - (4 + 2) = 6$  كرات

## ٧ تعطي مستويات تقدير أداء التعلم لفصل به ٥٠ تلميذاً بالجدول الآتي :

التقدير	ممتاز	جيد جداً	جيد	مقبول	دون المستوى
العدد	٦	٩	١١	١٦	٨

فإذا اختير أحد التلاميذ عشوائياً، فاحسب احتمال أن يكون تقديره :

(أ) ممتازاً

(ب) جيد

(ج) أقل من جيد

(د) ما العدد المتوقع للتلاميذ الحاصلين على تقدير ممتاز إذا أجري هذا الاختبار على ١٢٥ تلميذاً ؟

(الحل) ل (أ)  $\frac{6}{50} = \frac{3}{25}$  ، ل (ب)  $\frac{11}{50}$  ، ل (ج)  $\frac{24}{50} = \frac{12}{25}$

(د) العدد المتوقع للتلاميذ  $125 \times \frac{6}{50} = 15$  تلميذاً





## ملخص نظري وقوانين في الجبر والإحصاء

## ١ ملخص التحليل

## ملخص التحليل

إخراج العامل المشترك والترتيب

ثم تحديد نوع التحليل

٣	٢	١
<p>أكثر من ثلاثي</p> <p>[ التقسيم ]</p> <p>دمج + تحليل + تحليل</p> <p>١ مربع كامل</p> <p>دمج + تحليل + تحليل</p> <p>مثال:</p> <p><math>س^٢ - ١٠س ص + ٢٥ص^٢ - ٤٩</math></p> <p>٢ كل حدين معاً</p> <p>دمج + تحليل + تحليل</p> <p>مثال:</p> <p><math>س^٢ + ٢س + ١ + ٢س + ١ + ٢س + ١</math></p>	<p>مقدار ثلاثي</p> <p>١ المربع الكامل</p> <p>مثال: <math>س^٢ - ٦س + ٩</math></p> <p><math>= (س - ٣)^٢</math></p> <p>٢ بسيط آخره (+)</p> <p>مثال: <math>س^٢ - ٥س + ٦</math></p> <p><math>= (س - ٢)(س - ٣)</math></p> <p>٣ بسيط آخره (-)</p> <p>مثال: <math>س^٢ + ٦س - ٦</math></p> <p><math>= (س + ٣)(س - ٢)</math></p> <p>٤ غير بسيط آخره (+)</p> <p>مثال: <math>س^٢ + ٨س + ٣</math></p> <p><math>= (س + ١)(س + ٣)</math></p> <p>٥ غير بسيط آخره (-)</p> <p>مثال: <math>س^٢ + ٢س - ٣</math></p> <p><math>= (س + ٣)(س - ١)</math></p> <p>٦ إكمال المربع</p> <p>مثال: <math>س^٢ + ٢س + ١</math></p> <p><math>= (س + ١)^٢</math></p>	<p>مقدار ثنائي</p> <p>١ فرق المربعين:</p> <p>مثال: <math>س^٢ - ٩</math></p> <p><math>= (س + ٣)(س - ٣)</math></p> <p>٢ فرق بين مكعبين:</p> <p>مثال: <math>س^٣ - ٨</math></p> <p><math>= (س - ٢)(س^٢ + ٢س + ٤)</math></p> <p>٣ مجموع مكعبين:</p> <p>مثال: <math>س^٣ + ٢٧</math></p> <p><math>= (س + ٣)(س^٢ - ٣س + ٩)</math></p> <p>٤ إكمال مربع:</p> <p>مثال: <math>س^٤ + ٤س^٢ + ٤</math></p> <p><math>= (س^٢ + ٢)^٢</math></p> <p><math>= (س^٢ + ٢ + ٢)(س^٢ + ٢ - ٢)</math></p> <p><math>= (س^٢ + ٢ + ٢)(س^٢ - ٢ + ٢)</math></p> <p><math>= (س^٢ + ٢ + ٢)(س^٢ + ٢ - ٢)</math></p>





## ٢ حل معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد

\* حل المعادلة يعني إيجاد قيمة المتغير التي تحقق المعادلة

\* تسمى قيمة المتغير التي تحقق المعادلة جذري المعادلة

\* عدد حلول معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد تساوي درجة المعادلة

## نوع جذور المعادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد

٣ غير حقيقيين

٢ حقيقيان متساويان

١ حقيقيان مختلفان

## \* دليل الحل

٢ نحل المقدار

١ وضع المعادلة على الصورة العامة:  $اس^٢ + س + ح = صفر$ 

٥ كتابة مجموعة الحل

٤ إيجاد جذري المعادلة

٣ خاصية الضرب في صفر

١. معادلة:  $س(س - ٣) = صفر$  هي٢. معادلة:  $س^٢ - ٥س + ٦ = صفر$  هي٣. معادلة:  $س^٢ - ١٠س + ٢٥ = صفر$  هي٤. معادلة:  $س^٢ - ٤٩ = صفر$  هي٥. معادلة:  $س(س - ٥)^٢ + ٢(س - ٥)^٢ = صفر$  هي

٦. عدد موجب إذا أضيف ثلاثة أمثاله إلى مربعه أصبح الناتج ٤

العدد س ، مربعه  $س^٢$  ،  $س^٢ + ٣س - ٤ = ٠$  العدد هو ١

أمثلة وحلول

## ٣ العمليات على الأسس

١ جمع الأسس:  $س^٢ \times س^٣ = س^٥$  حيث  $س \neq ٠$ في ضرب الأساسات المتشابهة  $\Leftarrow$  نثبت الأساس ونجمع الأسسمثل:  $٨١ = ٣(٣) = ٨(٣) = ٥+٣(٣) = ٥(٣) \times ٣(٣)$ ٢ طرح الأسس:  $س^٣ \div س^٢ = س^١$  حيث  $س \neq ٠$ في قسمة الأساسات المتشابهة  $\Leftarrow$  نثبت الأساس ونطرح الأسسمثل:  $٤ = ٢(٢) = ٤(٢) = ٣-٧(٢) = ٣(٢) \div ٧(٢)$





٣ ضرب الأسس :  $(س^٢)^٥ = س^{٢ \times ٥}$  حيث  $س \neq ٠$

في الأساس المرفوع لأسين  $\Leftarrow$  نثبت الأساس ونضرب الأسس

مثل :  $٨ = ٢^٣ = (٢^٢)^٢ = ٢^{٢ \times ٢} = ٢^٤$

٤  $س^{-٢} = \frac{١}{س^٢}$  حيث  $س \neq ٠$  مثل :  $\frac{١}{٩} = \frac{١}{٣^٢} = ٣^{-٢}$

٥  $\frac{١}{س^{-٢}} = س^٢$  حيث  $س \neq ٠$  مثل :  $\frac{١}{٣^{-٢}} = ٣^٢ = ٩$

٦  $(\frac{س}{ص})^{-٢} = \frac{ص^٢}{س^٢}$  حيث  $س, ص \neq ٠$  مثل :  $(\frac{٥}{٢})^{-٢} = \frac{٢^٢}{٥^٢} = \frac{٤}{٢٥}$

٧ إذا كان :  $س^٣ = ص^٣$  فإن :  $س = ص$  مثل : إذا كان :  $٣^٢ = ٤^٢$  فإن :  $٣ = ٤$

٨ إذا كان :  $س^٥ = ص^٥$  فإن :  $س = ص$  حيث الأس فردي ٥ مثل : إذا كان :  $٣^٥ = ٤^٥$  فإن :  $٣ = ٤$

٩ إذا كان :  $س^٣ = ص^٣$  فإن :  $س = ص$  حيث  $س, ص \neq ٠$  ٦ مثل : إذا كان :  $٣^٦ = ٤^٦$  فإن :  $٣ = ٤$

٩ إذا كان :  $س^٣ = ص^٣$  فإن :  $س = ص$  حيث  $س, ص \neq ٠$  ٦ مثل : إذا كان :  $٣^٦ = ٤^٦$  فإن :  $٣ = ٤$

مثل : إذا كان :  $٣^٦ = ٤^٦$  فإن :  $٣ = ٤$  ومنها  $٣ - = س$

## ٤ الاحتمالات

\* فضاء العينة (ف) : هو مجموعة كل النواتج الممكنة للتجربة العشوائية .

\* الحدث : هو مجموعة جزئية من فضاء العينة (ف) .

\* احتمال وقوع الحدث =  $\frac{\text{عدد عناصر الحدث}}{\text{عدد عناصر فضاء العينة}}$  أي :  $\frac{ن(أ)}{ن(ف)} = ن(أ)$

\* العدد المتوقع لحدوث نواتج معينة = احتمال حدوثها  $\times$  العدد الكلي

\* الحدث المستحيل =  $\emptyset$  احتمال الحدث المستحيل = صفر

\* الحدث المؤكد = ف

احتمال الحدث المؤكد = ١

لا يوجد احتمال بالسالب

\* أي احتمال  $\in [٠, ١]$

\* مجموع الاحتمالات لكل النواتج الممكنة = ١



## مراجعة على التحليل بإخراج العامل المشترك

## العامل المشترك ع.م.أ بين الرموز

ع.م.أ بين حروف متشابهة هو الحرف اللى عليه أصغر أس

فمثلاً: ♦ ع.م.أ بين س<sup>٢</sup>، س<sup>٣</sup> هو س<sup>٢</sup>♦ ع.م.أ بين ص<sup>٣</sup>، ص<sup>٢</sup> هو ص<sup>٢</sup>♦ ع.م.أ بين م<sup>٢</sup>، م<sup>٣</sup> هو م<sup>٢</sup>

## العامل المشترك ع.م.أ بين الأعداد

ع.م.أ بين عددين هو عدد يقبل العددين القسمة عليه

فمثلاً: ♦ ع.م.أ بين ٢، ٤ هو ٢

♦ ع.م.أ بين ٦، ٩ هو ٣

♦ ع.م.أ بين ٨، ١٢ هو ٤

## تحليل المقدار بإخراج ع.م.أ

(١) اكتب العامل المشترك ثم افتح بعده قوس

(٢) اقسم كل حد من المقدار على العامل المشترك

(٣) اكتب ناتج القسمة داخل القوس

الخطوات

## تدريبات

حل كل مما يأتي بإخراج العامل المشترك الأعلى:

(١) ٨س<sup>٢</sup> - ٥٠ = .....

(٢) ٨ص<sup>٣</sup> - ٥٠ص = .....

(٣) ٥س<sup>٢</sup> - ١٠س + ١٥ = .....

(٤) ٨ص<sup>٣</sup> - ٤س<sup>٢</sup> = .....

(٥) ج (س - ص) + د (س - ص) = .....

(٦) ١٢ص<sup>٣</sup> + ٩ص<sup>٢</sup> + ٣ص = .....

## أمثلة

حل كل مما يأتي بإخراج العامل المشترك الأعلى:

(١) ٢س<sup>٢</sup> + ٢٥٠ = ٢ (س<sup>٢</sup> + ١٢٥)

(٢) ٢س<sup>٣</sup> - ١٨س = ٢س (س<sup>٢</sup> - ٩)

(٣) ١٣٥أ + ١٠أ<sup>٣</sup> = ٥أ (٢٧ + ٢أ<sup>٢</sup>)

(٤) ١٦ص<sup>٣</sup> - ٤ص = ٤ص (٤ص<sup>٢</sup> - ١)

(٥) س (أ + ب) - ص (أ + ب) = (أ + ب) (س - ص)

(٦) ٤س<sup>٣</sup> + ٦س<sup>٢</sup> + ٢س = ٢س (٢س<sup>٢</sup> + ٣س + ١)



## تحليل المقدار الثلاثي البسيط

1 الدرس الأول

المقدار الثلاثي البسيط يكون على الصورة :  $س^2 + ب س + ج$  حيث معامل  $س^2 = ١$ 

## خطوات التحليل

- ❖ نفتح قوسين ونحلل الحد الأول والأخير إلى عاملين نضعهما في القوسين
- ❖ نضع الإشارات بالقواعد التالية:

إذا كانت إشارة الأخير موجب تكون إشارة الأقواس مثل إشارة الأوسط  
إذا كانت إشارة الأخير سالب تكون الإشارتان مختلفتان والأكبر يأخذ إشارة الأوسط

قبل تحليل أي مقدار من أي نوع تأكد من أمرين:

- 1 إخراج العامل المشترك الأعلى
- 2 ترتيب الحدود تنازليا

## ملحوظة

مثال: حل كل من المقادير الآتية:

③  $س^2 + ٣ س - ١٠$

الحل

الحد الأول  $س^2$  : نحللها إلى  $س \times س$ الحد الأخير ١٠ : نبحث عن عددين ضربهما ١٠ وطرحهما ٣الإشارة : إشارة الأخير - ∴ إشارة القوسين مختلفتان

والرقم الأكبر ٥ يأخذ إشارة الأوسط التي هي +

∴ المقدار =  $(س + ٥)(س - ٢)$

①  $س^2 + ٤ س + ٣$

الحل

الحد الأول  $س^2$  : نحللها إلى  $س \times س$ الحد الأخير ٣ : نبحث عن عددين ضربهما ٣ ومجموعهما ٤الإشارة : إشارة الأخير + ∴ إشارة القوسين + (زى الأوسط)

∴ المقدار =  $(س + ١)(س + ٣)$

②  $س^2 - ٧ س + ١٢$

الحل

الحد الأول  $س^2$  : نحللها إلى  $س \times س$ الحد الأخير ١٢ : نبحث عن عددين ضربهما ١٢ ومجموعهما ٧الإشارة : إشارة الأخير - ∴ إشارة القوسين - (زى الأوسط)

∴ المقدار =  $(س - ٣)(س - ٤)$

④  $س^2 - ٤ ص - ٢١$

الحل

الحد الأول  $س^2$  : نحللها إلى  $ص \times ص$ الحد الأخير ٢١ : نبحث عن عددين ضربهما ٢١ وطرحهما ٤الإشارة : إشارة الأخير - ∴ إشارة القوسين مختلفتان

والرقم الأكبر ٧ يأخذ إشارة الأوسط التي هي -

∴ المقدار =  $(ص - ٧)(ص + ٣)$



## تدريبات

حل كل من المقادير الآتية:

①  $س^2 + ٧س + ١٠$

الحل

المقدار = .....

②  $س^2 - ١١س + ١٠$

الحل

المقدار = .....

③  $س^2 + ٧س - ١٨$

الحل

المقدار = .....

④  $ص^2 - ٢٩ص - ٣٠$

الحل

المقدار = .....

⑤  $س^2 - ٥س + ٦$

الحل

المقدار = .....

⑥  $س^2 + ١٨س + ٤٠$

الحل

المقدار = .....

## أمثلة

حل كل من المقادير الآتية:

①  $س^2 + ٦س + ٨$

الحل

المقدار =  $(س + ٤)(س + ٢)$ 

②  $س^2 + ٢س - ١٥$

الحل

المقدار =  $(س + ٥)(س - ٣)$ 

③  $س^2 + س - ٦$

الحل

المقدار =  $(س + ٣)(س - ٢)$ 

④  $س^2 + ٥س - ٦$

الحل

المقدار =  $(س + ٦)(س - ١)$ 

⑤  $س^2 - س - ٢٠$

الحل

المقدار =  $(س - ٥)(س + ٤)$ 

⑥  $س^2 - ٨س + ٦$

الحل

نخرج العامل المشترك : المقدار =  $٢(س^2 + ٤س + ٣)$ 

$$٢ = (س + ٣)(س + ١)$$



## أفكار متنوعة على الثلاثي البسيط

① حلل المقدار:  $٦ + ٢س + ٥س$ 

الحل

نرتب المقدار:  $٦ + ٢س + ٥س$   
 المقدار =  $(٢ + س) (٣ + س)$

⑥ حلل المقدار:  $٦ + ٢س + ٥س$ 

الحل

⑦ حلل المقدار:  $٣س - ١٥س + ١٢$ 

الحل

② حلل المقدار  $٧س^٣ - ١٤س^٢ - ٢١س$ 

الحل

نخرج العامل المشترك: المقدار =  $٧س (٣س^٢ - ٢س - ٣)$   
 $= ٧س (س - ٣) (س + ١)$

③ حلل المقدار:  $١٨ص^٢ - ٧سص + ٧س$ 

الحل

المقدار =  $(س + ٩ص) (س - ٢ص)$

⑧ إذا كان  $(س + ٤)$  أحد عاملي المقدار  $٢٠ + ٩س + ٢س$ 

فأوجد العامل الآخر؟

الحل

④ إذا كان  $(س - ٥)$  أحد عاملي المقدار  $١٠ + ٧س - ٢س$ 

فأوجد العامل الآخر؟

الحل

المقدار =  $(س - ٥) (س - ٢)$

∴ العامل الآخر هو  $س - ٢$

⑨ أوجد قيمة ب التي تجعل المقدار الآتي قابلاً للتحليل:

 $٦ + س - ٢س$ 

الحل

⑤ أوجد قيمة ب التي تجعل المقدار الآتي قابلاً للتحليل:

 $٨ - س + ٢س$ 

الحل

ب = الفرق بين عددين ضربهما ٨

$٨ = ٤ \times ٢$  طرحهما = ٢

$٨ = ٨ \times ١$  طرحهما = ٧

∴ ب يمكن أن تساوي  $٢ \pm$  أو  $٧ \pm$



## تمارين

## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ① إذا كان المقدار  $s^2 + s + 2$  قابلاً للتحويل فإن  $k = \dots\dots\dots$  ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ )
- ② إذا كان أحد عوامل المقدار  $s^2 + 5s - 6$  هو  $(s - 1)$  فإن العامل الآخر هو  $\dots\dots\dots$  (  $s - 6$  ،  $s + 6$  ،  $s - 5$  ،  $s - 3$  )
- ③ إذا كان  $(s - 1)$  أحد عوامل المقدار  $s^2 - s$  فإن العامل الآخر هو  $\dots\dots\dots$  (  $s - 1$  ،  $s + 1$  ،  $s$  ،  $s^2 - s$  )
- ④ العدد الذي يمكن إضافته للمقدار الثلاثي  $s^2 - 8s + 5$  ليكون قابلاً للتحويل هو  $\dots\dots\dots$  ( ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ )

## أكمل ما يأتي:

- ①  $s^2 + 15s + 50 = (s + \dots\dots\dots)(s + \dots\dots\dots)$
- ②  $s^2 + 7s + 12 = (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)(\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$
- ③  $s^2 - 8s - 9 = (\dots\dots\dots - \dots\dots\dots)(\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$
- ④  $s^2 - \dots\dots\dots + 6 = (s - 2)(s - 3)$
- ⑤ إذا كان  $(s - 2)$  هو أحد عوامل المقدار  $s^2 - 7s + 10$  فإن العامل الآخر هو  $\dots\dots\dots$

## حل كل من المقادير الآتية تحليلًا تامًا:

- ①  $s^2 - 7s + 12$
- ②  $s^2 + s - 12$
- ③  $s^2 - s - 12$
- ④  $s^2 - 20s + 51$
- ⑤  $s^2 - 3s - 10$
- ⑥  $s^2 - 50s - 51$

## أجب عن الأسئلة التالية:

- ① حلل المقدار:  $s^2 + 10s + 12$
- ② حلل المقدار:  $s^3 - 9s^2 + 14s$
- ③ حلل المقدار:  $s^2 - 13s + 30$
- ④ أوجد قيمة  $b$  التي تجعل المقدار الآتي قابلاً للتحويل:  
 $s^2 + bs + 6$
- ⑤ إذا كان  $(s + 5)$  أحد عاملي المقدار  
 $s^2 + 2s + 15$  فأوجد العامل الآخر؟



## تحليل المقدار الثلاثي الغير بسيط

2 الدرس الأول

- المقدار الثلاثي الغير بسيط يكون على الصورة :  $أس^٢ + ب س + ج$  حيث  $أ \neq ١$
- يحلل الثلاثي الغير بسيط باستخدام فكرة المقص
- عند تحليل ج يجب أن يكون مجموع الطرفين + الوسطين = الحد الأوسط ب س

## مثال توضيحي لطريقة المقص

حل  $٥س^٢ - ٤س - ١٢$ 

الحل

طبعا مفيش عامل مشترك والمقدار مرتب

∴ معامل  $س^٢ \neq ١$  ∴ المقدار ثلاثي غير بسيط

$$\begin{array}{rcl} ٥س & - & ٤ \\ \times & & \\ ٣س & + & ٢ \end{array}$$

هنحل  $٥س^٢$  إلى  $٥س \times ٣س$ وهنحل  $١٢$  إلى  $٣ \times ٤$ وهنحل الإشارة  $- \times +$ 

هنضرب الطرفين ونضرب الوسطين ونجمعهم ونشوف

التأكد:  $١٥س - ٤س = ١١س \neq$  الأوسط

$$\begin{array}{rcl} ٥س & + & ٦ \\ \times & & \\ ٢س & - & ٤ \end{array}$$

نجرّب  $٦ \times ٢$  مكان  $٤ \times ٣$ التأكد:  $- ١٠س + ٦س = - ٤س =$  الأوسط∴ المقدار =  $(٥س + ٦)(٢س - ٤)$



## تدريبات

حل كل من المقادير الآتية:

①  $٣ + س + ٢س$

الحل



②  $٢ + س - ٣ص$

الحل

③  $٢ - س - ٥س$

الحل

④  $٥ - م - ٢م$

الحل

⑤  $٦ + س + ١٣س$

الحل

## أمثلة

حل كل من المقادير الآتية:

①  $١٥ + س + ١٣س + ٢س$

الحل

$$\begin{array}{r} ٢س + ١٣س + ١٥ + س \\ \hline ١٥س + ١٤س + ١٥ + س \end{array}$$

التأكد:  $١٥س + ١٣س + ١٥ + س = ١٥س + ١٣س + ١٥ + س$ ∴ المقدار =  $(١٥س + ١٣س + ١٥ + س)$ 

②  $٣ + س - ١٩س$

الحل

$$\begin{array}{r} ٣ + س - ١٩س \\ \hline ٣ + س - ١٩س \end{array}$$

التأكد:  $٣ + س - ١٩س = ٣ + س - ١٩س$  خطأنحرب  $٣ \times س$ التأكد:  $٣ + س - ١٩س = ٣ + س - ١٩س$  تمام∴ المقدار =  $(٣ + س - ١٩س)$ 

③  $٥ - م - ٢م$

الحل

$$\begin{array}{r} ٥ - م - ٢م \\ \hline ٥ - م - ٢م \end{array}$$

التأكد:  $٥ - م - ٢م = ٥ - م - ٢م$  تمام∴ المقدار =  $(٥ - م - ٢م)$ 

④  $١٢ - س - ٤س$

الحل

$$\begin{array}{r} ١٢ - س - ٤س \\ \hline ١٢ - س - ٤س \end{array}$$

التأكد:  $١٢ - س - ٤س = ١٢ - س - ٤س$  خطأنحرب  $٢ \times ٤$  مكان  $٣ \times ٤$ التأكد:  $١٢ - س - ٤س = ١٢ - س - ٤س$  تمام∴ المقدار =  $(١٢ - س - ٤س)$



## طريقة أخرى للحل بدل المقصر

مثال توضيحي: حل  $٢س + ٥س + ٣$ 

الحل

خذ الـ ٢ واضربها  $\times$  الحد الأخير ٣

حل ثلاثي بسيط

اقسم العددين على الـ ٢

خذ المقام وخليه معامل للـ س

$$٢س + ٥س + ٣ =$$

$$(٢س + ٣) (٥س + ٣) =$$

$$(٢س + ٣) (٥س + ٣) =$$

$$(٢س + ٣) (٥س + ٣) =$$

## تدريبات

حل كل من المقادير الآتية:

①  $٢س + ٣س + ١ =$

③  $٨س + ١٧س - ١٥ =$

②  $٦س - س - ١٢ =$

④  $٢س + ١٣س + ١٥ =$



## تمارين

## أكمل ما يأتي:

$$① \quad ( \dots + 5 ) ( \dots + 3s ) = 5 + 16s + 3s^2$$

$$② \quad ( \dots + s ) ( \dots - 5s ) = 7 - 2s - 5s^2$$

$$③ \quad ( \dots + \dots ) ( \dots - \dots ) = 6 - s + 2s^2$$

$$④ \quad ( \dots + \dots ) ( \dots + \dots ) = 8 + 10s + 3s^2$$

$$⑤ \quad \dots + \dots + 2s^2 = (s^2 + 3s)(s^2 + 2s)$$

$$⑥ \quad (1 + s)(3 + \dots) = 3 + 5s + 2s^2$$

$$⑦ \quad ( \dots ) (1 - 3s) = 2 + 7s - 3s^2$$

$$⑧ \quad ( \dots ) (4 - s) = 20 - 3s - 2s^2$$

$$⑨ \quad ( \dots ) (1 - 2s) = 4 + 11s - 6s^2$$

## حل كل من المقادير الآتية تحليلًا تامًا:

$$① \quad 3 + 7s + 2s^2$$

$$② \quad 6 - 7s + 3s^2$$

$$③ \quad 16 + 18s + 5s^2$$

$$④ \quad 10 + 31s + 5s^2$$

$$⑤ \quad 15 - 17s + 4s^2$$

$$⑥ \quad 5 - 19s + 2s^2$$



## تحليل المقدار الثلاثي المربع الكامل

الدرس  
الثالث 3

## شروط المقدار المربع الكامل

① الحد الأول والأخير لهما جذور تربيعية وموجبان

② الحد الأوسط  $\pm 2 \times \sqrt{\text{الأول}} \times \sqrt{\text{الأخير}}$ 

حدد أي من المقادير الآتية مربع كامل:

④  $s^2 - 12s + 36$

.....

.....

.....

⑤  $s^2 - 8s - 16$

.....

.....

.....

⑥  $4s^2 - 6s + 9$

.....

.....

.....

①  $s^2 - 6s + 9$

الحد الأول له جذر تربيعي وهو  $s$ الحد الأخير له جذر تربيعي وهو  $3$ الحد الأوسط  $= 2 \times s \times 3 = 6s$ 

∴ المقدار مربع كامل

②  $s^2 - 6s - 9$

الحد الأخير سالب ∴ المقدار ليس مربع كامل

③  $9s^2 + 15s + 25$

الحد الأول والأخير لهما جذور تربيعية وموجبان

الحد الأوسط  $= 2 \times 3s \times 5 = 30s$ يبقى الـ  $15s$  متنفّش (هو بيوقعك ومضربش  $2 \times$ )

∴ المقدار ليس مربع كامل



## إيجاد الحد الناقص في المربع الكامل

$$\diamond \text{ الحد الأول} = \frac{(\text{الحد الأوسط})^2}{\text{الحد الثالث} \times 4}$$

$$\diamond \text{ الحد الثالث} = \frac{(\text{الحد الأوسط})^2}{\text{الحد الأول} \times 4}$$

$$\diamond \text{ الحد الأوسط} = \pm \sqrt{\text{الحد الأول} \times \text{الحد الأخير}}$$

في كل مما يأتي أوجد الحد الناقص ليصبح المقدر مربع كامل

$$\textcircled{5} \quad ٤س^٢ + \dots + ١$$

.....  
.....  
.....

$$\textcircled{6} \quad ١٠ب + ٢٥ - \dots$$

.....  
.....  
.....

$$\textcircled{7} \quad ٦سص + \dots - ٢س٦$$

.....  
.....  
.....

$$\textcircled{1} \quad ٩س^٢ + \dots + ٤$$

$$\text{الحد الأوسط} = \pm \sqrt{\text{الحد الأول} \times \text{الحد الأخير}} \\ ١٢س \pm ٢ = ٢ \times ٣س \times ٢ = \pm ١٢س$$

$$\textcircled{2} \quad ١ + \dots + ٨س + ١$$

$$\text{الحد الأول} = \frac{(\text{الحد الأوسط})^2}{\text{الحد الثالث} \times 4} = \frac{٤س^٢}{١ \times 4} = ١س^٢$$

$$\textcircled{3} \quad ٩س^٢ - ٣٠س + \dots$$

$$\text{الحد الثالث} = \frac{(\text{الحد الأوسط})^2}{\text{الحد الأول} \times 4} = \frac{٩٠٠س^٢}{٩س^٢ \times 4} = ٢٥$$

$$\textcircled{4} \quad ٩س^٢ + \dots + ع$$

$$\text{الحد الأوسط} = \pm \sqrt{\text{الحد الأول} \times \text{الحد الأخير}} \\ ١٤ع \pm ٧ = ٧ \times ٢ع \pm ١٤ع$$



في كل مما يأتي أوجد قيمة ك التي تجعل المقدار مربعاً كاملاً:

$$\textcircled{3} \quad ٤س^٢ + كس + ٢٥$$

.....  
.....  
.....

$$\textcircled{4} \quad كس^٢ + ٢٤س + ٩$$

.....  
.....  
.....

$$\textcircled{1} \quad س^٢ + كس + ٩$$

ك موجودة في الحد الأوسط  
الحد الأوسط =  $٢ \pm ٣ \times س = ٦ \pm س$   
 $\therefore ك = ٦ \pm$

$$\textcircled{2} \quad س^٢ + ١٠س + ك$$

ك موجودة في الحد الثالث  
الحد الثالث =  $\frac{(الحد الأوسط)^٢}{٤ \times الحد الأول} = \frac{١٠٠س^٢}{٤ \times س} = ٢٥$   
 $\therefore ك = ٢٥$

## تحليل المقدار الثلاثي المربع الكامل

عند تحليل المقدار المربع الكامل نفتح قوس واحد ونحط عليه تربيع

$$\text{الثلاثي المربع الكامل} = (\sqrt{\text{الأول}} \pm \sqrt{\text{الأخير}})^٢$$

حسب إشارة الأوسط

مثال: حل كل مما يأتي:

$$\textcircled{2} \quad ص^٢ - ١٠ص + ٢٥$$

الحل

الأول لازم نتأكد انه مربع كامل

$$\text{المقدار} = (ص - ٥)^٢$$

متناسخ إشارة الأوسط - يبقى إشارة القوس -

$$\textcircled{1} \quad س^٢ + ٦س + ٩$$

الحل

الأول لازم نتأكد انه مربع كامل

$$\text{المقدار} = (س + ٣)^٢$$

متناسخ إشارة الأوسط + يبقى إشارة القوس +



## تدريبات

① س<sup>٢</sup> - ٢س + ١

.....

.....

② ١٦س<sup>٢</sup> - ٤٠س + ٢٥

.....

.....

③ ٥٠س<sup>٢</sup> - ٢٠س + ٢

.....

.....

④ ٣٦ - ٦٠س + ٢٥س<sup>٢</sup>

.....

.....

⑤ ٤س<sup>٩</sup> + ١٢س + ٤

.....

.....

⑥ ٤س<sup>٢</sup> - ٤س ص + ص<sup>٢</sup>

.....

.....

## أمثلة

① س<sup>٢</sup> - ٨س + ١٦

الحل

المقدار = (س - ٤)<sup>٢</sup>

② ٢٥ب<sup>٢</sup> - ١٠ب + ١

الحل

المقدار = (٥ب - ١)<sup>٢</sup>

③ م<sup>٢</sup> + ٢م + ١

الحل

المقدار = (م + ١)<sup>٢</sup>

④ ٨س<sup>٢</sup> - ٢٤س + ١٨

الحل

المقدار = ٢(٤س<sup>٢</sup> - ١٢س + ٩) عامل مشترك

= (٣س<sup>٢</sup> - ٣س + ٣)<sup>٢</sup>

⑤ ٢٤س<sup>٢</sup> + ٢٤س<sup>٢</sup> + ٦س<sup>٣</sup>

الحل

المقدار = ٦س<sup>٢</sup> + ٢٤س<sup>٢</sup> + ٢٤س<sup>٢</sup> ترتيب

= ٦س(٤س<sup>٢</sup> + ٤س + ٤) عامل مشترك

= ٦س(٢س + ٢)<sup>٢</sup>

⑥ ٤أ<sup>٢</sup> - ٣٦أ + ٨١

الحل

المقدار = (٩ - أ)<sup>٢</sup>

⑦ ص<sup>٢</sup> - ٢٠ص + ١٠٠

الحل

المقدار = (ص - ١٠)<sup>٢</sup>



## تمارين

## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ① إذا كان المقدار  $س^2 + ١٤س + ب$  مربعاً كاملاً فإن  $ب =$  ..... ( ٢ ، ٧ ، ١٤ ، ٤٩ )
- ② إذا كان المقدار  $س^2 + كس + ٢٥$  مربعاً كاملاً فإن  $ك =$  ..... ( ٥ ، ١٠ ، ١٠± ، ٥± )
- ③ إذا كان المقدار  $س^2 + كس + ٩$  مربعاً كاملاً فإن  $ك =$  ..... ( ٦ ، ٣٦± ، ١٢ ، ١٢± )
- ④ إذا كان المقدار  $٢٠أ + ب + ك$  مربعاً كاملاً فإن  $ك =$  ..... ( ٢٥ ، ٥ ، ٤ ، ١٢± )
- ⑤ الحد الأوسط ليكون المقدار  $س^2 + ٢٥$  ثلاثياً مربعاً كاملاً هو ..... ( ٥س ، ١٠س ، ٢٥س ، ٢س )
- ⑥ العدد الذي يمكن إضافته للمقدار الثلاثي  $س^2 + ٢٤س + ١٤$  ليكون مربعاً كاملاً هو ..... ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ )
- ⑦ إذا كان  $٢ + أب + ب^2 = ٢٥$  فإن  $أ + ب =$  ..... ( ٥ ، ٥- ، ٥± ، ٢٥ )
- ⑧ إذا كان  $٢ + ب + ب^2 = ١٥$  ،  $٢ + أب = ١٠$  فإن  $أ + ب =$  ..... ( ٥ ، ٥- ، ٥± ، ٢٥ )

## أكمل ما يأتي:

- ① المقدار  $س^2 + ٢س + م$  يكون مربعاً كاملاً عندما  $م =$  .....
- ② المقدار  $س^2 + م + ٢٥$  مربعاً كاملاً إذا كان  $م =$  .....
- ③ إذا كان  $٢ + ب + ب^2 = ١٥$  ،  $أب = ٣$  فإن  $(أ - ب)^2 =$  .....
- ④ المقدار  $س^2 - ٣٢س + ك$  يكون مربعاً كاملاً إذا كانت  $ك =$  .....
- ⑤ إذا كان  $(أ + ب)^2 = ١٦$  ،  $٢ + ب + ب^2 = ٨$  فإن  $أب =$  .....
- ⑥ إذا كان  $(س - ٥)$  أحد عوامل المقدار  $س^2 - ١٠س + ٢٥$  فإن العامل الآخر هو .....

## حلل كل من المقادير الآتية تحليلًا تاماً:

٥  $٢٠س^2 + ١٠٠س + ١٢٥$

٦  $٤س^2 - ٤س + ص + ص^2$

٧  $٢٥ب^2 - ١٠ب + ١$

٨  $٣٦ - ٦٠ك + ٢٥ك^2$

١  $س^2 + ٦س + ٩$

٢  $٩ص^2 + ٣٠ص + ٢٥$

٣  $٣٦س^2 + ٦٠س + ٢٥$

٤  $١٨ص^2 - ١٢ص + ٢$




# 4

## الدرس الرابع

### تحليل الفرق بين مربعين

#### شرط أن يكون المقدار فرق بين مربعين

أن يكون مكون من حدين لهما جذور تربيعية وبينهما إشارة -



أمثلة للمقدار الثنائي الفرق بين مربعين:

س<sup>٢</sup> - ٢٥ ، ص<sup>٢</sup> - ٤ ، ب<sup>٢</sup> - ١ ، س<sup>٢</sup> - ٩ ، أ<sup>٢</sup> - ١٠٠

أما س<sup>٢</sup> + ٢٥ ده مجموع مربعين وليس له تحليل

#### تحليل الفرق بين مربعين

الفرق بين مربعين =  $(\sqrt{\text{الأول}} + \sqrt{\text{الثاني}}) (\sqrt{\text{الأول}} - \sqrt{\text{الثاني}})$

#### تدريبات

حل كل مما يأتي:

#### أمثلة

① س<sup>٢</sup> - ٢٥ = (س - ٥) (س + ٥)

② ص<sup>٢</sup> - ٤ = (ص - ٢) (ص + ٢)

③ ٩ - س<sup>٢</sup> = (٣ - س) (٣ + س)

④ ٨١ - س<sup>٢</sup> = (٩ - س) (٩ + س)

⑤ ب<sup>٢</sup> - ١ = (ب - ١) (ب + ١)

① س<sup>٢</sup> - ١ = ..... ①

② ص<sup>٢</sup> - ٣٦ = ..... ②

③ ٩ - س<sup>٢</sup> = ..... ③

④ ب<sup>٢</sup> - ١٦ = ..... ④

⑤ س<sup>٢</sup> - ١٠٠ = ..... ⑤



## تدريبات

١ حل كل مما يأتي تحليلًا كاملاً:

① ..... = ١٨ - ٢س٨

.....

② ..... = ١٦ - ٤ص

.....

③ ..... = ١٠٠ - ٢س

.....

④ ..... = ٢٥ - ٢ص

.....

⑤ ..... = ٢٥ - ٢س٩

.....

٢ إذا كانت (أ - ب) = ٧ ، (أ + ب) = ٨

فإن أ - ب = ٢

.....

.....

.....

٣ إذا كان ١٢ = ٢ص - ٢س ، ٣ = ص + س

فإن س - ص =

.....

.....

.....

## أمثلة

١ حل كل مما يأتي تحليلًا كاملاً:

① ٤س٣ - ٩س = س (٤س٢ - ٩) عامل مشترك

= س (٣ - ٢س) (٣ + ٢س)

② ٨١ - ٤س = (٩ - ٢س) (٩ + ٢س) احدى

= (٩ + ٢س) (٣ - س) (٣ + س)

③ ٨س٢ - ٥٠ = ٢ (٤س٢ - ٢٥)

= ٢ (٥ - ٢س) (٥ + ٢س)

④ ٢س - ٢ص = (س - ص) (س + ص)

⑤ ٩س٢ - ٢٥ = ٢٥ + ٩س٢

= (٥ - ٣س) (٥ + ٣س)

٢ إذا كانت (س - ص) = ٥ ، (س + ص) = ١٠

فإن س - ٢ص =

الحل

س - ٢ص = (س - ص) (س + ص)

٥٠ = ١٠ × ٥ =

٣ إذا كان ١٠ = ٢ص - ٢س ، ٥ = س - ص

فإن س + ص =

الحل

س - ٢ص = (س - ص) (س + ص)

١٠ = ٥ (س + ص)

٢ = ٥ ÷ ١٠ = س + ص



## تمارين

## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ① إذا كان  $s + s = 3$  ،  $s - s = 2$  فإن  $s^2 - s^2 =$  ..... ( ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ )
- ② إذا كان  $a^2 - b^2 = 27$  ،  $a - b = 3$  فإن  $a + b =$  ..... ( ٩ ، ٤ ، ٩ - ، ٤ - )
- ③ إذا كان  $s^2 - s^2 = 10$  ،  $s + s = 5$  فإن  $s - s =$  ..... ( ٥٠ ، ١٠ ، ٥ ، ٢ )
- ④ إذا كان  $s + s = 10$  ،  $s - s = 5$  فإن  $s^2 - s^2 =$  ..... ( ٥٠ ، ١٠ ، ٥ ، ٢ )
- ⑤ إذا كان  $s^2 + s^2 = 4$  ،  $(s - s) = 2$  فإن  $s^2 =$  ..... ( ٨ ، ٤ ، ٢ ، صفر )
- ⑥  $(25)^2 - (15)^2 = 10 \times$  ..... ( ٤٠ ، ٣٠ ، ١٥ ، ٢٥ )
- ⑦ إذا كان  $s^2 - s^2 = (s - s)(s + s)$  فإن  $s^2 =$  ..... ( ١٢٥ ، ٢٥ ، ١٥ ، ٥ )

## أكمل ما يأتي:

- ① مستطيل مساحته  $(s^2 - s^2)$  سم<sup>٢</sup> وطوله  $(s + s)$  فإن عرضه = .....
- ② إذا كان  $s + s = 9$  ،  $s - s = 10$  فإن  $s^2 - s^2 =$  .....
- ③ إذا كان  $s^2 - s^2 = 20$  ،  $s + s = 10$  فإن  $s - s =$  .....
- ④ إذا كان  $s^3 (s - s) = 75$  فإن  $s^2 - s^2 =$  .....
- ⑤ إذا كان  $s^2 - s^2 = 100$  ،  $s - s = 4$  فإن  $s + s =$  .....
- ⑥ إذا كان  $s^2 - s^2 = 48$  ،  $s^2 + s^2 = 8$  فإن  $s - s =$  .....
- ⑦  $(\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3}) =$  .....

## حل كل من المقادير الآتية تحليلًا تامًا:

- ٧  $1 - (3 - s^2)$
- ٨  $s^3 - 48s^2$
- ٩  $(s + 1) - (s - 1)$
- ١٠  $9 - s^2$
- ١١  $9s^2 + 64$
- ١٢  $\frac{1}{2} - s^2$

- ١  $s^2 - 9$
- ٢  $s^2 - 144$
- ٣  $s^2 - 98$
- ٤  $s^2 - 20s^2$
- ٥  $s^4 - 16s^4$
- ٦  $s^2 - 100$




## مجموع مكعبين والفرق بينهما

5 الدرس  
الخامس

## شرط أن يكون المقدار مجموع أو فرق بين مكعبين

أن يكون مكون من حدين لهما جذور تكعيبية وبينهما + أو -



أمثلة للمقدار الثنائي مجموع مكعبين و الفرق بين مكعبين:

س<sup>٣</sup> - ١٢٥ ، ص<sup>٣</sup> - ٨ ، ب<sup>٣</sup> + ١ ، ٨س<sup>٣</sup> - ٢٧ ، س<sup>٦</sup> + ٣٤٣

## تحليل مجموع والفرق بين مكعبين

المقدار =  $(\sqrt[3]{\text{الأول}} \pm \sqrt[3]{\text{الثاني}})$  (ربّع  $\pm$  اضرب اللي في القوس الصغير + ربّع)  
 نفس إشارة المقدار      عكس إشارة المقدار      دائما موجب

مجموع المكعبين:  $(س + ص)(س^2 - سص + ص^2) = (س^3 + ص^3)$ الفرق بين مكعبين:  $(س - ص)(س^2 + سص + ص^2) = (س^3 - ص^3)$ 

## تدريبات

## أمثلة

حل كل مما يأتي:

① س<sup>٣</sup> + ١٢٥ = .....

② ب<sup>٣</sup> - ٦٤ = .....

③ ٢٧س<sup>٣</sup> - ١ = .....

① س<sup>٣</sup> - ٨ = (س - ٢)(س<sup>٢</sup> + ٢س + ٤)

② ص<sup>٣</sup> + ٢٧ = (ص + ٣)(ص<sup>٢</sup> - ٣ص + ٩)

③ ٨ب<sup>٣</sup> - ١ = (١ - ٢ب)(١ + ٢ب + ٤ب<sup>٢</sup>)



## تدريبات

١ حل كل مما يأتي تحليلًا كاملاً:

$$① \quad ٢٧س^٢ - ١٢٥ =$$

$$② \quad ٣٤٣س^٢ - =$$

$$③ \quad ٤٠س^٢ + =$$

$$④ \quad ١س^٢ - =$$

$$⑤ \quad ٦٤ب^٦ - أ^٦ =$$

٢ إذا كانت أ = ب = ٣ ، س + ص + ص = ٧

$$\text{فإن } ٣س^٢ - ص^٣ =$$

٣ إذا كان ١٢ = ٣س + ٣ص ، س - ص + ص = ٣

$$\text{فإن } س + ص =$$

## أمثلة

١ حل كل مما يأتي تحليلًا كاملاً:

$$① \quad ٨ص^٢ + ٢٧س^٢ =$$

$$= (٢ص + ٢س) (٢س - ٢ص + ٢ص + ٢ص)$$

$$② \quad ٢٥٠س^٢ - (٢٥س - ٢٥س)^٢ =$$

$$= (٢٥س + ٢٥س) (٢٥س - ٢٥س)$$

$$③ \quad ٨١س^٤ + ٢٤س^٢ = ٣س (٨س^٢ + ٢٧س^٢)$$

$$= ٣س (٢س + ٢س) (٢س - ٢س + ٢س + ٢س)$$

$$④ \quad ٦٤س^٦ - ٦ص^٦ \quad \text{نحلل فرق بين مربعين أولاً}$$

$$= (٨س^٣ - ٨ص^٣) (٨س^٣ + ٨ص^٣)$$

$$= (٢س - ٢ص) (٢س + ٢ص) (٢س + ٢ص) (٢س + ٢ص)$$

$$(٢س - ٢ص) (٢س + ٢ص) (٢س + ٢ص) (٢س + ٢ص)$$

٢ إذا كانت س - ص = ٤ ، س + ص + ص = ٦

$$\text{فإن } ٣س^٢ - ص^٣ =$$

الحل

$$٣س^٢ - ص^٣ = (س - ص) (س + ص + ص)$$

$$٢٤ = ٦ \times ٤ =$$

٣ إذا كان ٣٠ = ٣ص - ٣س ، س - ص = ٥

$$\text{فإن } ٢س^٢ + س + ص =$$

الحل

$$٣س^٢ - ص^٣ = (س - ص) (س + ص + ص)$$

$$٣٠ = ٥ (٢س^٢ + س + ص)$$

$$٦ = ٥ \div ٣٠ = ٢س^٢ + س + ص$$



## تمارين

## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ① إذا كان  $(س - م) = (س - ٢) (س^٢ + ٤س + ٤)$  فإن  $م =$  ..... ( ٢ ، ٤ ، ٨ ، - ٨ )
- ② إذا كان  $س - ص = ٥$  ،  $س^٢ + س + ص = ٣$  فإن  $س^٢ - ص =$  ..... ( ٣٥ ، ١٢ ، ٧ ، ٢ )
- ③ إذا كان  $(س - ٣)$  أحد عاملي المقدار  $س^٣ - ٢٧$  فإن العامل الآخر هو .....  
(  $س^٢ - ٩$  ،  $س^٢ - ٩س + ٩$  ،  $س^٢ - ٣$  ،  $س^٢ + ٣س + ٩$  )
- ④ إذا كان  $(س + ١) (س^٢ - س + ١) =$  .....  
(  $س^٣ - ١$  ،  $(س + ١)^٣$  ،  $(س + ١)^٢$  ،  $س^٣ + ١$  )
- ⑤ إذا كان  $(س^٣ - ١٢٥) = (س + أ) (س^٢ + ٥س + ٢٥)$  فإن  $أ =$  ..... ( ١٢٠ ، ٢٥ ، ٥ ، - ٥ )

## أكمل ما يأتي:

- ① إذا كان  $(س - ١)$  أحد عاملي المقدار  $س^٣ - ١$  فإن العامل الآخر هو .....
- ②  $س^٣ - ٢٧ = (س - ..... ) ( ..... + ..... + ١ )$
- ③ إذا كان  $س^٣ - ب = ١٥$  ،  $١ + أ + ب + ب^٢ = ٣$  فإن  $أ - ب =$  .....
- ④ إذا كان  $س^٣ - م = (س - م) (س^٢ + ٥س + م^٢)$  فإن  $م =$  .....
- ⑤ إذا كان  $س^٣ + ج = (س + ٣) (س^٢ - ٣س + ٩)$  فإن  $ج =$  .....
- ⑥ إذا كان  $س^٣ + ٨ = (س + ٢) (س^٢ + كس + ٤)$  فإن  $ك =$  .....
- ⑦  $س^٣ - ..... = (س - ١) (س^٢ + س + ١)$

## حلل كل من المقادير الآتية تحليلًا تامًا:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ١ | $س^٣ + ١٢٥$             |
| ٢ | $٢س^٢ - ١٦س$            |
| ٣ | $٦٤ - ص^٣$              |
| ٤ | $٣٤٣ + ٢٧س^٣$           |
| ٥ | $٨ - ١٠٠٠س^٣$           |
| ٦ | $٤٠ - ٥س^٣$             |
| ٧ | $\frac{١}{٨}س^٢ - ٨ص^٣$ |
| ٨ | $١٢٥ - (س + ٥)^٣$       |



## التحليل بالتقسيم

الدرس  
السادس 6

❖ لتحليل مقدار مكون من أربعة حدود نستخدم طريقة التقسيم

❖ نقسم المقدار إلى مقدارين كل منهما مكون من حدين بحيث يكون بينهما عامل مشترك

وإذا لم يكن بين المقدارين عامل مشترك فإننا نعيد تقسيم المقدار الأصلي.

❖ إذا لم يصلح التقسيم مثنى مثنى نقسم: ٣ حدود مع بعض (يكونوا مربع كامل) - حد لوحده

## أمثلة

حل كل مما يأتي:

①  $٥س + ٥ص + س + ع + ص + ع$

الحل

هناخذ الأول مع الثاني + الثالث مع الرابع

$$\text{المقدار} = (٥س + ٥ص) + (س + ع + ص + ع)$$

هنطلع العامل المشترك من كل قوس لوحده

$$= ٥(س + ص) + ع(س + ص)$$

هناخذ القوس المكرر عامل مشترك ونكتب الباقي في قوس

$$= (س + ص)(٥ + ع)$$

③  $أس + ب ص - ب س - أ ص$

الحل

$$\text{المقدار} = (أس - ب س) + (ب ص - أ ص)$$

$$= س(أ - ب) + ص(ب - أ)$$

طبعا القوسين مش متشابهين بس هنخليهم متشابهين

$$\text{هنخلي } (ب - أ) = -(أ - ب)$$

$$= س(أ - ب) - ص(أ - ب)$$

$$= (أ - ب)(س - ص)$$

②  $أس + ب ص + ب س + أ ص$

الحل

هناخذ الأول مع الرابع + الثاني مع الثالث

$$\text{المقدار} = (أس + أ ص) + (ب ص + ب س)$$

هنطلع العامل المشترك من كل قوس لوحده

$$= أ(س + ص) + ب(ص + س)$$

خد بالك القوسين متشابهين هناخذ أي واحد منهم

$$= (س + ص)(أ + ب)$$

④  $٤س٢ - ٢٥ + ٤س ص + ص٢$

الحل

هنا هنقسمهم ٣ مربع كامل وواحد لوحده

$$\text{المقدار} = (٤س٢ + ٤س ص + ص٢) - ٢٥$$

هنحل الـ ٣ حدود كتلاتي مربع كامل

$$= (٢س + ص)٢ - ٢٥$$

هنحل المقدار فرق بين مربعين

$$= (٢س + ص)(٢س + ص) - (٥ + ٥)$$



## تدريبات

حل كل مما يأتي تحليلًا كاملاً:

$$① \quad ٣س + أ ص + ٣ص + أ س$$

.....

.....

.....

.....

$$② \quad ٢٥ - ٢أ + ٢ب + ٢٥$$

.....

.....

.....

.....

$$③ \quad ٦ + أ س + ٣ + أ ٢ + ٢س + ٦$$

.....

.....

.....

.....

$$④ \quad ٤س٣ص٢ - ٤س٣ + ٤ص٢ - ٤$$

.....

.....

.....

.....

## أمثلة

حل كل مما يأتي تحليلًا كاملاً:

$$① \quad ٣٥ + ٧س + ٥ص + ٥س$$

الحل

$$\text{المقدار} = (٣٥ + ٧س) + (٥ص + ٥س)$$

$$= ٧(٥ + س) + ٥(ص + س)$$

$$= (٧ + ص)(٥ + س)$$

$$② \quad ٢س٢ - ٢س ص + ٢ص٢ - ٢أ$$

الحل

لاحظ أن أول ٣ حدود ثلاثي مربع كامل

$$\text{المقدار} = (٢س٢ - ٢س ص + ٢ص٢) - ٢أ$$

$$= ٢(س - ص)(س - ص) - ٢أ$$

$$= (س - ص - أ)(س - ص + أ)$$

$$③ \quad ٩ص٣ - ٩ص٢ + ٩$$

الحل

$$\text{المقدار} = (٩ص٣ - ٩ص٢) + ٩$$

$$= ٩ص٢(ص - ١) + ٩(١ - ص)$$

$$= (٩ - ٩ص٢)(١ - ص) \quad \text{حل الفرق بين مربعين}$$

$$= (٣ + ص)(٣ - ص)(١ - ص)$$

$$④ \quad ٤س٢ص٣ - ٤س٢ - ٤ص٣ + ٤$$

الحل

$$\text{المقدار} = (٤س٢ص٣ - ٤س٢) + (٤ - ٤ص٣)$$

$$= ٤س٢(ص٣ - ١) - ٤(٣ - ص٣)$$

$$= ٤(ص٣ - ١)(٣ - ص٣)$$

$$= (١ + ص + ص٢)(١ - ص)(٥ + س٢)(٥ - س٢) =$$



**اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:**

- ① إذا كان  $أ + ص + ب + س = ٣٥$  ،  $أ + ب = ٥$  فإن  $س + ص =$  ..... ( ٧ - ، ٥ ، ٧ ، ٣٠ )
- ② إذا كان  $أ + ب = ٥$  ،  $ج + د = ٤$  فإن  $أ + ج + د + ب =$  ..... ( ٣٠ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ١٥ )
- ③ إذا كان  $س + ص = ٣$  ،  $أ + ب = ٤$  فإن  $س (أ + ب) + ص (أ + ب) =$  ..... ( ١ - ، ٧ ، ١٢ ، ١ )

**أكمل ما يأتي:**

- ① إذا كان  $ع - ص = ٦$  وكانت  $س (ع - ص) + ل (ع - ص) = ٢٤$  فإن  $س + ل =$  .....
- ②  $أ - م + ن = (أ + ..... ) (ن - ..... )$
- ③ إذا كان  $أ + ب = ٧$  ،  $س - ص = ٣$  فإن  $أ - س + ب - س =$  .....
- ④ المقدار  $أ (ب + ٥) + ج (ب + ٥) = (ب + ٥) (..... )$
- ⑤ إذا كان  $أ + ب = ٩$  ،  $ج + د = ٧$  فإن  $أ + ج + د + ب =$  .....

**حل كل من المقادير الآتية تحليلًا تامًا:**

- |    |  |
|----|--|
| ١  | س <sup>٣</sup> - س <sup>٣</sup> س <sup>٢</sup> + س <sup>٦</sup> - ١٨ |
| ٢  | هـ - ١٠م - أ - ٢م  |
| ٣  | س <sup>٢</sup> - ب <sup>٢</sup> + س <sup>٢</sup> + ٢ب                |
| ٤  | س <sup>٢</sup> + س + ع + س + ص + ع + ص                               |
| ٥  | س <sup>٢</sup> + س <sup>٤</sup> + ٤ - ص <sup>٢</sup>                 |
| ٦  | أ <sup>٢</sup> + ٢أب + ب <sup>٢</sup> - ج <sup>٢</sup>               |
| ٧  | ٥س - ٣٠ + أس - ٦أ  |
| ٨  | س <sup>٣</sup> - س <sup>٢</sup> س <sup>٢</sup> + س <sup>٢</sup> - ٢  |
| ٩  | ٩س <sup>٢</sup> - ٤أ <sup>٢</sup> + ص <sup>٢</sup> + ٦س + ص          |
| ١٠ | أ <sup>٣</sup> - ٩أ - ٩ - ٩  |
| ١١ | س <sup>٢</sup> - ٥س + ٣س + ع - ١٥ص + ع                               |
| ١٢ | س <sup>٢</sup> - ص <sup>٢</sup> - ٢س + ٢ص                            |



## التحليل بإكمال المربع

الدرس  
السابع

7

## الفكرة الأولى

أن يكون المقدار ثلاثي  
يكون مربع كامل ولكن الحد الأوسط لا يحقق  
المربع الكامل

مثال

حلل  $x^2 + 9x + 81$ 

خطوات الحل:

١) نوجد الحد الأوسط =  $2 \times \sqrt{\text{الأول}} \times \sqrt{\text{الآخر}}$ 

$$\text{الأوسط} = 2 \times 3 \times 3 = 18 \text{ س}$$

٢) نضيفه ونطرحه:

$$= (x^2 + 18x + 81) - (x^2 + 9x + 81) \\ = (x^2 + 18x + 81) - (x^2 + 9x + 81)$$

٣) نحلل أول ٣ حدود ثلاثي مربع كامل :

$$= (x^2 + 9x + 81) - (x^2 + 9x + 81)$$

٤) نحلل فرق بين مربعين :

$$= (x^2 + 9x + 81) - (x^2 + 9x + 81)$$

## الفكرة الأولى

أن يكون المقدار ثنائي مجموع مربعين

مثال

حلل  $x^2 + 4x + 4$ 

خطوات الحل:

١) نوجد الحد الأوسط =  $2 \times \sqrt{\text{الأول}} \times \sqrt{\text{الآخر}}$ 

$$\text{الأوسط} = 2 \times 2 \times 1 = 4 \text{ ص}$$

٢) نضيفه في الوسط ونطرحه في الآخر:

$$\text{المقدار} = (x^2 + 4x + 4) - (x^2 + 4x + 4)$$

٣) نحلل أول ٣ حدود ثلاثي مربع كامل :

$$= (x^2 + 4x + 4) - (x^2 + 4x + 4)$$

٤) نحلل فرق بين مربعين :

$$= (x^2 + 4x + 4) - (x^2 + 4x + 4)$$



## تدريبات

حل كل مما يأتي تحليلًا كاملاً:

$$1 \quad ٦٤ + ٤س$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$2 \quad ٨١س + ٤ص$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$3 \quad ١٦ + ٢س٥ - ٩س$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## أمثلة

حل كل مما يأتي تحليلًا كاملاً:

$$1 \quad ٤ + ٤أ$$

الحل

$$\text{الحد الأوسط} = ٢ \times ٢أ \times ٢ = ١٢٤$$

$$\text{المقدار} = (٤ + ٢أ + ١٢٤) - ١٢٤$$

$$= (٢ + ٢أ) - ٢$$

$$= (٢أ - ٢ + ١٢) (٢أ - ٢ + ١٢) =$$

$$2 \quad ١٦س - ٢٨ص٢س + ٩ص٢$$

الحل

$$\text{الأوسط} = ٢ \times ٤س \times ٣ص = ٢٤ص٢س$$

$$\text{المقدار} = ١٦س - ٢٤ص٢س + ٢٨ص٢س - ٩ص٢ =$$

$$= ١٦س - ٢٤ص٢س + ٢٨ص٢س - ٩ص٢ =$$

$$= (٤س - ٣ص) (٤س - ٣ص) =$$

$$= (٤س - ٣ص) (٤س - ٣ص) =$$

$$3 \quad ٤س + ٨١ع$$

الحل

$$\text{الحد الأوسط} = ٢ \times ٢س \times ٩ع = ٣٦ع٢س$$

$$\text{المقدار} = ٤س + ٣٦ع٢س + ٨١ع - ٣٦ع٢س =$$

$$= (٢س + ٩ع) - ٢س =$$

$$= (٢س + ٩ع - ٢س) (٢س + ٩ع - ٢س) =$$



**أكمل ما يأتي:**

- ①  $س' + ٤ = (س' + ٢) - \dots\dots\dots$
- ②  $س' + ٦٤$  يمكن تحليله بإكمال المربع بإضافة ..... ومعكوسه الجمعي
- ③ إذا كان المقدار  $س' - جس + ٢$  قابلاً للتحليل فإن القيمة الموجبة للرمز ج هي .....
- ④ إذا كان  $أ + ب = ٧$  فإن  $أ' + ٢ أب + ب' = \dots\dots\dots$
- ⑤  $(س' + ٤ ص' = (س' - \dots\dots\dots + ٢ ص' ) (س' + ٢ ص' + \dots\dots\dots)$
- ⑥  $٤س' - ٢٠س + ٢٥ = ( \dots\dots\dots )$

**حل كل من المقادير الآتية تحليلًا تامًا:**

١  $س' + ٤ ص'$

٢  $٤س' + ٢٥ ص' - ٢٩ س' ٢ ص'$

٣  $س' + س' ٢ ص' + ٢٥ ص'$

٤  $س' - ١٩ س' ٢ ص' + ٢٥ ص'$

٥  $٦٢٥ س' + ٤ ص'$

٦  $١٢ س' + ٣ ص'$

٧  $٨س' ص' + ١٦٢ ع' ص'$

٨  $م' - ١١ م' ٢ ن' + ن'$



## حل معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد

الدرس  
الثامن  
8

المعادلة أس<sup>٢</sup> + ب س + ج = ٠ هي معادلة من الدرجة الثانية بشرط أ ≠ صفر

**قاعدة :** إذا كان أ ، ب عدنان حقيقيان وكان أ × ب = صفر فإن: إما أ = صفر أو ب = صفر

## خطوات حل المعادلة:

- ١ اجعل الحدود كلها في طرف واحد
- ٢ حل المقدار تحليلًا كاملاً
- ٣ ساوى العوامل الناتجة بالصفر
- ٤ أوجد قيم المجهول

## أمثلة

أوجد مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية في ح:

④ س<sup>٣</sup> = ٤ س

الحل

س<sup>٢</sup> - ٤ س = صفر

س (س - ٤) = صفر

إما س = صفر

أو س - ٤ = صفر ∴ س = ٤

∴ م. ح = { ٤ ، ٠ }

① س<sup>٢</sup> - ٥ س + ٦ = ٠

الحل

(س - ٣) (س - ٢) = صفر

إما س - ٣ = صفر ∴ س = ٣

أو س - ٢ = صفر ∴ س = ٢

∴ م. ح = { ٢ ، ٣ }

② س<sup>٢</sup> - ٢ س - ١٥ = ٠

الحل

(س - ٥) (س + ٣) = صفر

إما س - ٥ = صفر ∴ س = ٥

أو س + ٣ = صفر ∴ س = -٣

∴ م. ح = { ٥ ، -٣ }

③ س<sup>٢</sup> - ٩ = ٠

الحل

(س - ٣) (س + ٣) = ٠

إما س - ٣ = ٠ ∴ س = ٣

أو س + ٣ = ٠ ∴ س = -٣

∴ م. ح = { ٣ ، -٣ }

⑤ س<sup>٣</sup> = ٩ س

الحل

س<sup>٢</sup> - ٩ س = صفر

س (س - ٩) = صفر

س (س - ٣) (س + ٣) = صفر

إما س = صفر

أو س - ٣ = صفر ∴ س = ٣

أو س + ٣ = صفر ∴ س = -٣

∴ م. ح = { ٣ ، -٣ ، ٠ }



## أمثلة

أوجد مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية في ح:

①  $٠ = س٣ + ٥س٢ - ٦س١ = ٠$

الحل

$٠ = (س٣ + ٥س٢ - ٦س١)$

$٠ = (س١ - ١)(س١ + ٦)$

إما  $س١ = ٠$

أو  $س١ + ٦ = ٠$

أو  $س١ - ١ = ٠$

$\therefore م.ح = \{٠, -٦, ١\}$

②  $٣٥ = س٢ + ٢س١ = ٣٥$

الحل

$٠ = ٣٥ - س٢ + ٢س١$

$٠ = (س١ + ٧)(س١ - ٥)$

إما  $س١ + ٧ = ٠$

أو  $س١ - ٥ = ٠$

$\therefore م.ح = \{٧-, ٥\}$

③  $٠ = س٤ - ٥س٢ + ٤س١ = ٠$

الحل

$٠ = (س١ - ١)(س١ - ٤)(س١ + ٢)$

$٠ = (س١ + ٢)(س١ - ٢)(س١ + ١)(س١ - ١)$

إما  $س١ + ٢ = ٠$

أو  $س١ - ٢ = ٠$

أو  $س١ + ١ = ٠$

أو  $س١ - ١ = ٠$

$\therefore م.ح = \{٢-, ٢, ١-, ١\}$

④  $٠ = س٢ + ٤س١ = ٤س١$

الحل

$٠ = س٢ + ٤س١ - ٤س١$

$٠ = (س١ - ٢)(س١ - ٢)$

إما  $س١ - ٢ = ٠$

أو  $س١ - ٢ = ٠$

$\therefore م.ح = \{٢\}$

⑤  $١٦ = س٢(٣ + س١) = ١٦$

الحل

$١٦ = س٢ + ٣س١ + ٩س١$

$٠ = ١٦ - س٢ + ٣س١ + ٩س١$

$٠ = س٢ + ٣س١ - ٧$

$٠ = (س١ + ٧)(س١ - ١)$

إما  $س١ + ٧ = ٠$

أو  $س١ - ١ = ٠$

$\therefore م.ح = \{٧-, ١\}$

⑥  $٥ = (س١ + ١)(س١ - ٣) = ٥$

الحل

$٠ = ٥ - س١ - ٣س١ + ٣س١$

$٠ = س١ - ٨س١ + ٢س١$

$٠ = (س١ + ٢)(س١ - ٤)$

إما  $س١ + ٢ = ٠$

أو  $س١ - ٤ = ٠$

$\therefore م.ح = \{٢-, ٤\}$



## تدريبات

أوجد مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية في ج:

④  $٦ = س^٢ + س$

الحل

①  $٠ = ١٠ + س٧ + س^٢$

الحل

⑤  $٠ = ٢٥ + س١٠ + س^٢$

الحل

②  $٠ = ٢٥ - س^٢$

الحل

③  $س٩ = س^٣$

الحل

⑥  $٤٥ - س = ١٢ س^٢$

الحل



## المسائل اللفظية على حل معادلة الدرجة الثانية

## ملاحظات

## إذا كان عدد ما هو س فإن:

- عدنان أحدهما يزيد عن الآخر بمقدار ٣ ∴ العدنان س ، س + ٣
- عدنان الفرق بينهما ٣ ∴ العدنان س ، س + ٣
- إذا كان عمر شخص الآن = س سنة فإن:  
عمره منذ ٥ سنوات = س - ٥ وعمره بعد ٥ سنوات = س + ٥
- ثلاثة أعداد صحيحة متتالية هي : س ، س + ١ ، س + ٢
- ثلاثة أعداد زوجية (أو فردية) متتالية هي : س ، س + ٢ ، س + ٤
- في المستطيل: الطول + العرض =  $\frac{1}{4}$  المحيط
- مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة = ١٨٠

- مربعه =  $s^2$
- مكعبه =  $s^3$
- ضعفه =  $2s$
- نصفه =  $\frac{s}{2}$
- ثلاثة أمثاله =  $3s$
- معكوسه الجمعي =  $-s$
- معكوسه الضربي =  $\frac{1}{s}$
- ضعف مربعه =  $2s^2$

## أمثلة

② عدنان صحيحان يزيد أحدهما عن الآخر بمقدار ٣ ، وحاصل ضربهما ١٨ فما العدنان؟

الحل

- نفرض أن العدنان هما س ، س + ٣
- ∴  $s(s+3) = 18$
- ∴  $s^2 + 3s = 18$
- $s^2 + 3s - 18 = 0$
- $(s+6)(s-3) = 0$
- إما  $s+6=0$  ∴  $s=-6$  أو  $s-3=0$  ∴  $s=3$
- ∴ العدنان هما -٦ ، -٣ أو ٣ ، ٦

① عدد حقيقي إذا أضيف إليه مربعه كان الناتج ١٢ فما هو العدد؟

الحل

- نفرض أن العدد هو س
- ∴ مربعه =  $s^2$
- ∴  $s + s^2 = 12$
- $s^2 + s - 12 = 0$
- $(s+4)(s-3) = 0$
- إما  $s+4=0$  ∴  $s=-4$  أو  $s-3=0$  ∴  $s=3$
- ∴ العدد هو ٤ أو -٣



٥ عدد صحيح إذا أضيف إليه مربعه كان  
الناتج ٥٦ فأوجد العدد؟

الحل

٣ مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار  
١٥ سم ومساحته ١٠٠ سم<sup>٢</sup> أوجد بعديه؟

الحل

نفرض أن العرض = س

∴ الطول = س + ١٥

مساحة المستطيل = الطول × العرض

∴ س (س + ١٥) = ١٠٠

س<sup>٢</sup> + ١٥س - ١٠٠ = ٠

(س + ٢٠) (س - ٥) = ٠

إما س + ٢٠ = ٠ ∴ س = -٢٠ مرفوضة

- ٢٠ مرفوضة لأن الأطوال لا تكون بالسالب

أو س - ٥ = ٠ ∴ س = ٥

∴ الطول = ٥ سم ، العرض = ١٥ + ٥ = ٢٠ سم

٤ اوجد العدد الحقيقي الموجب الذي ضعفه  
يزيد عن ٦ أمثال معكوسه الضربي بمقدار ١ صحيح

الحل

نفرض أن العدد = س

∴ معكوسه الضربي =  $\frac{1}{س}$ ∴ ٦ أمثال معكوسه الضربي =  $\frac{٦}{س}$ ٢س -  $\frac{٦}{س}$  = ١ (بالضرب × س)∴ ٢س<sup>٢</sup> - ٦ = س٢س<sup>٢</sup> - س - ٦ = ٠

(٢س + ٣) (س - ٢) = ٠

إما ٢س + ٣ = ٠ ∴ س = - $\frac{٣}{٢}$  مرفوضة

أو س - ٢ = ٠ ∴ س = ٢

∴ العدد هو ٢

٦ مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار  
٤ سم ومساحته ٤٥ سم<sup>٢</sup> أوجد محيطه؟

الحل



## تمارين

## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ① مجموعة حل المعادلة  $x^2 + 4 = 0$  في ح هي ..... (  $\Phi$  ،  $\{4\}$  ،  $\{2, -2\}$  ،  $\{-4\}$  )
- ② مجموعة حل المعادلة  $x^2 - 25 = 0$  في ح هي ..... (  $\{25\}$  ،  $\{25, -25\}$  ،  $\{5, -5\}$  ،  $\{5\}$  )
- ③ مجموعة حل المعادلة  $x^2 = 7$  في ح هي ..... (  $\{7\}$  ،  $\{7, 0\}$  ،  $\{7, -7\}$  ،  $\{0\}$  )
- ④ مجموعة حل المعادلة  $x^2 - 5 = 0$  في ح هي ..... (  $\{0\}$  ،  $\{5, -5\}$  ،  $\{5, 0\}$  ،  $\{2, 0\}$  )
- ⑤ مجموعة حل المعادلة  $x^2 = 3$  في ح هي ..... (  $\{3\}$  ،  $\Phi$  ،  $\{3, -3\}$  ،  $\{3, 0\}$  )
- ⑥ مجموعة حل المعادلة  $x^2 = 4$  في ح هي ..... (  $\{2\}$  ،  $\{2, -2\}$  ،  $\{4\}$  ،  $\{-2\}$  )
- ⑦ إذا كان  $x^2 - 5 = 0$  فإن  $x = 5 + 5$  ..... (  $5$  ،  $15$  ،  $25$  ،  $125$  )

## أكمل ما يأتي:

- ① إذا كان عمر حبيبة الآن  $x$  سنة فإن عمرها منذ ثلاث سنوات هو ..... وعمرها بعد ٤ سنوات .....
- ② مجموعة حل المعادلة  $(x - 4) = 0$  صفر في ح هي .....
- ③ مجموعة حل المعادلة  $(x - 2)(x + 1) = 0$  في ح هي .....
- ④ مجموعة حل المعادلة  $x^2 + 16 = 0$  في ح هي .....
- ⑤ مجموعة حل المعادلة  $x^2 = 5$  في ح هي .....
- ⑥ مجموعة حل المعادلة  $x^2 = 7 - 10$  في ح هي .....

## أجب عن الأسئلة التالية:

- ① عدد حقيقي إذا أضيف إلى مربعه كان الناتج ٦ فما هو العدد؟
- ② عدد حقيقي موجب مربعه  $= 3$  أمثاله أوجد هذا العدد؟
- ③ عدد حقيقي موجب مربعه يزيد عن ضعفه بمقدار ١٥ فما هو العدد؟
- ④ مستطيل يزيد طوله عن عرضه بمقدار ٣ ومساحته ٢٨ سم<sup>٢</sup> أوجد بعدي المستطيل

## أوجد في ح مجموعة حل كل من المعادلات الآتية:

- ①  $x^2 - 6x = 0$
- ②  $x^2 - 2x = 24$
- ③  $x^2 - 4x + 4 = 0$
- ④  $x^2 - 6x = 0$
- ⑤  $x^2 - (3 + 4) = 0$
- ⑥  $x^2 + 3x - 28 = 0$
- ⑦  $x^2 - 6x = 0$
- ⑧  $x^2 - 2x = 24$
- ⑨  $x^2 - 4x + 4 = 0$
- ⑩  $x^2 - 6x = 0$
- ⑪  $x^2 - (3 + 4) = 0$
- ⑫  $x^2 + 3x - 28 = 0$



## قوانين القوى الصحيحة غير السالبة والسالبة في ح

الدرس  
الأول

1

١ عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$2^4 \times 2^3 = 2^{4+3} = 2^7$$

$$(-3)^4 \times (-3)^2 = (-3)^{4+2} = (-3)^6$$

$$2^3 \times 2^2 = 2^{3+2} = 2^5$$

$$3^5 \times 3^2 = 3^{5+2} = 3^7$$

٢ عند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$2^7 \div 2^4 = 2^{7-4} = 2^3$$

$$(-3)^6 \div (-3)^2 = (-3)^{6-2} = (-3)^4$$

$$2^7 \div 2^4 = 2^{7-4} = 2^3$$

$$3^5 \div 3^2 = 3^{5-2} = 3^3$$

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

٣ توزع الأس في حالة الضرب أو القسمة

$$\frac{2^3}{2^5} = \frac{2^3}{2^5} = 2^{3-5} = 2^{-2} \quad \text{مثل} \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$1000 = 10^3 = 10^{2+1} = 10^2 \times 10^1$$

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

٤ لو أسين على نفس الأساس نضرب الأسس

$$2^3 \times 2^2 = 2^{3+2} = 2^5$$

$$(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6$$

ن عدد زوجي:  $(-a)^n = a^n$ ن عدد فردي:  $(-a)^n = -a^n$ ٥ إذا كان الأساس عدد سالب  $(-a)^n$ 

$$\frac{2^7}{125} = \frac{2^7}{5^3} = 2^{7-3} = 2^4$$

بينما

$$9 = 3 = 3^{1-0} = 3^{-0}$$

أ صفر  $1 =$  بشرط  $a \neq 0$ 

٦ عندما يكون الأس صفر

(صفر) صفر = كمية غير معينة

لاحظ أن:

$$(-3)^0 = 1$$



## الأسس الكسرية

$$\sqrt[n]{|s|} = \sqrt[n]{s}$$

١ لو جذر تربيعي أسه زوجي: خذ اللي تحت الجذر ونص الأس

ولو جذر تكعيبي أسه زوجي: خذ اللي تحت الجذر وثالث الأس

$$25 = 25 = \sqrt[4]{5}$$

$$125 = 125 = \sqrt[6]{5}$$

$$27 = 27 = \sqrt[3]{3}$$

$$16 = 16 = \sqrt[12]{2}$$

$$\sqrt[1]{3} \times \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{3}$$

٢ لو جذر تربيعي أسه فردي: اجعل الأس زوجي + ١

$$\sqrt[1]{7} \times \sqrt[2]{7} = \sqrt[2]{7}$$

$$\sqrt{7} \times 7 = \sqrt{7} \times 7 =$$

$$\sqrt[1]{3} \times \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{3}$$

$$\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3} \times \sqrt[2]{3} =$$

## الأسس السالبة

لتغيير إشارة الأس نقلب الأساس

## قاعدة ٣

$$\left(\frac{1}{b}\right)^n = \left(\frac{b}{1}\right)^{-n}$$

$$\left(\frac{7}{3}\right)^2 = \left(\frac{3}{7}\right)^{-2}$$

## قاعدة ٢

$$\frac{1}{b^n} = b^{-n}$$

$$\frac{1}{2^5} = 2^{-5}$$

## قاعدة ١

$$b^n = \frac{1}{b^{-n}}$$

$$3^5 = \frac{1}{3^{-5}}$$

## ملاحظات هامة

$$2^5 = 125 \quad \diamond$$

$$1 = (\text{أي عدد})^0 \quad \diamond$$

$$3^2 = 9 \quad \diamond$$

$$3^2 \times 3^4 = 3^6 \quad \diamond$$

$$3^3 \times 3^2 = 3^5 \quad \diamond$$

$$2^2 = 4 \quad \diamond$$

$$2^3 = 8 \quad \diamond$$

$$2^4 = 16 \quad \diamond$$

$$2^5 = 32 \quad \diamond$$

$$2^6 = 64 \quad \diamond$$

$$2^7 = 128 \quad \diamond$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4} \quad \diamond$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{2^2}{5^2} = \frac{4}{25} \quad \diamond$$



## أمثلة

• اختصر لأبسط صورة:

$$٩ = ٣^٢ = \frac{٩^٣}{٧^٣} = \frac{٤٣ \times ٥٣}{٧^٣} \quad (1)$$

$$\dots\dots\dots = ٤^٥ + ٤^٥ + ٤^٥ + ٤^٥ \quad (2)$$

$$(١ + ١ + ١ + ١) ٤^٥ =$$

$$٤^٦ = ٤ \times ٤^٥ =$$

$$\frac{٨^١(\sqrt[٣]{٣}) \times ٩^١(\sqrt[٣]{٣})}{٩^١(\sqrt[٣]{٣})} \quad (3)$$

$$٩^١(\sqrt[٣]{٣}) = \frac{١^٥(\sqrt[٣]{٣})}{٩^١(\sqrt[٣]{٣})} = \text{المقدار}$$

$$\sqrt[٣]{٨١} = \sqrt[٣]{٣} \times ٤^٣ = \sqrt[٣]{٣} \times ٨^١(\sqrt[٣]{٣}) =$$

$$\frac{٢^{-٣} \times ٥^١(\sqrt[٣]{٢})}{٩^١(\sqrt[٣]{٢}) \times ٣} \quad (4)$$

$$\frac{٢^{-٣} \times ٤^١(\sqrt[٣]{٢})}{١^١(\sqrt[٣]{٢})} = \frac{١^{-٢-٣} \times ٩^{-١}(\sqrt[٣]{٢})}{٩^{-١}(\sqrt[٣]{٢})} = \text{المقدار}$$

$$\frac{١}{١٠٨} = \frac{١}{٢٧ \times ٤} = \frac{١}{٣٣ \times ٢٢} = \frac{١}{٣٣ \times ٤^١ \sqrt[٣]{٢}} =$$

$$\frac{٤^١(\sqrt[٣]{٢}) \times ٢^١(\sqrt[٣]{٢})}{٩^١(\sqrt[٣]{٢})} \quad (5)$$

$$\frac{١}{١٦} = ٤^{-٢} = \frac{٤^١(\sqrt[٣]{٢}) \times ٢^١(\sqrt[٣]{٢})}{٩^١(\sqrt[٣]{٢})} =$$

• أوجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة:

$$٣٢ = ٥^٢ = ١^٠(\sqrt[٢]{٢}) = ٩^١(\sqrt[٢]{٢}) \times ٢^٢(\sqrt[٢]{٢}) \quad (1)$$

$$\sqrt[٢]{٢} \times ٨^١(\sqrt[٢]{٢}) = ٩^١(\sqrt[٢]{٢}) \quad (2)$$

$$\sqrt[٢]{١٦} = \sqrt[٢]{٢} \times ٤^٢ =$$

$$٢^٢(\sqrt[٢]{٢}) \times ٢^٢ = ٢^٢(\sqrt[٢]{٢}) \quad (3)$$

$$\sqrt[٢]{٢} \times ٩^١(\sqrt[٢]{٢}) \times ٨ =$$

$$\sqrt[٢]{١٦} = \sqrt[٢]{٢} \times ٢ \times ٨ =$$

$$٢^٢(\sqrt[٢]{٢}) \times ٩^١(\sqrt[٢]{٢}) \times \sqrt[٢]{٢} \quad (4)$$

$$٨ = ٢^٢ = ٩^١(\sqrt[٢]{٢}) =$$

$$٢^٢(\sqrt[٣]{٢}) \times ٥^١(\sqrt[٣]{٢}) \quad (5)$$

$$٨١ = ٤^٣ = ٨^١(\sqrt[٣]{٢}) =$$

$$\frac{٥}{٥\sqrt[٣]{٢}} = \frac{١}{٥\sqrt[٣]{٢}} \times ٥ = ١^١(\sqrt[٣]{٥}) \quad (6)$$

$$\sqrt[٣]{٥} = \frac{٥\sqrt[٣]{٥}}{٥} \times ٥ = \frac{٥\sqrt[٣]{٥}}{٥\sqrt[٣]{٥}} \times \frac{٥}{٥\sqrt[٣]{٥}} =$$

$$٤^١(\sqrt[٣]{٣}) = ٤^١(\sqrt[٣]{٣}) \quad (7)$$

$$٩ = ٣^٢ = ٤^١(\sqrt[٣]{٣}) = ٤^١(\sqrt[٣]{٣}) \times \frac{٣}{٣\sqrt[٣]{٣}} =$$

جواب حل آخر



## أمثلة

• اختصر لأبسط صورة:

$$\textcircled{1} \frac{٤٢ \times ٦٢}{٢٣ \times ٤٢}$$

الحل

$$١ = \frac{\cancel{٤٢} \times \cancel{٦٢}}{\cancel{٢٣} \times \cancel{٤٢}} = \frac{٢٣ \times ٢٢ \times ٢٢}{٢٣ \times ٤٢} = \text{المقدار}$$

$$\textcircled{2} \frac{٩٢ \times ٥٢}{١٥ \times ٩٢}$$

الحل

$$١ = \frac{٩٢ \times ٥٢}{٩٢ \times ٥٢} = \frac{(٩٢) \times (٥٢)}{(٩٢ \times ٥٢)} = \text{المقدار}$$

$$\textcircled{3} \frac{٢٣ \times ٢٢}{١+٢٢}$$

الحل

$$\frac{٢٣ \times ٢٢}{١+٢٢} = \frac{٢٣ \times ٢٢}{١+٢٢} = \text{المقدار}$$

$$٢ \times ٣ = ٦ = ١ - ٢ - ٣ = ١$$

$$\frac{١}{٦} = \frac{١}{٣} \times \frac{١}{٢} = \frac{١-٢}{٣} \times \frac{١-٣}{٢} =$$

$$\textcircled{4} \frac{٩٢ \times ٢١}{٧ \times ٢٧}$$

الحل

$$\frac{٩٢ \times ٢١}{٧ \times ٢٧} = \frac{(٩٢) \times (٢١)}{(٧ \times ٢٧)} =$$

$$٧ \times ٢١ = ١٤٧ = ١٣ \times ١١ =$$

$$٢١ = ١٣ \times ١٧ =$$

$$\textcircled{6} \text{ اثبت أن: } \frac{١}{٢٧} = \frac{(٢٧) \times (١-٨)}{(٢٧) \times (١-٨)}$$

الحل

$$\frac{(٢٧) \times (١-٨)}{(٢٧) \times (١-٨)} = \frac{(٢٧) \times (١-٨)}{(٢٧) \times (١-٨)} = \text{الأيمن}$$

$$\frac{(٢٧) \times (١-٨)}{(٢٧) \times (١-٨)} =$$

$$٢٧ \times (١-٨) = ٢٧ \times (١-٨) =$$

$$\frac{١}{٢٧} = ١ \times \frac{١}{٢٧} = ١ \times \frac{١}{٢٧} = \text{صفر} = ٢٧ \times (١-٨) =$$

$$\textcircled{5} \text{ اختصر } \frac{٩٢ \times ٢١}{٧ \times ٢٧} \text{ ثم احسب الناتج عندما } ١ =$$

الحل

$$\frac{٩٢ \times ٢١}{٧ \times ٢٧} = \frac{(٩٢) \times (٢١)}{(٧ \times ٢٧)} =$$

$$٩٢ \times ٢١ = ١٩٦٢ = ١٣ \times ١١ =$$

$$٢٢ \times ٩ = ١٩٨ = ١٣ \times ١١ =$$

$$\text{عندما } ١ = : ٩ \times ٩ = ٨١ = ٩ \times ٩ = \text{صفر} = ٩ \times ٩ =$$



## تمارين

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ①  $2^{-2} = \dots\dots\dots$  (  $4$  ،  $\frac{1}{4}$  ،  $-\frac{1}{4}$  ،  $-4$  )
- ②  $4^2 + 4^2 = \dots\dots\dots$  (  $8$  ،  $52$  ،  $82$  ،  $162$  )
- ③  $3^4 + 3^4 + 3^4 + 3^4 = \dots\dots\dots$  (  $1216$  ،  $316$  ،  $124$  ،  $44$  )
- ④  $7^5 + 7^2 = \dots\dots\dots$  (  $7$  صفر ،  $77$  ،  $1410$  ،  $710$  )

أكمل ما يأتي:

- ①  $2 \text{ صفر} + 2^{-2} = \dots\dots\dots$
- ②  $\dots\dots\dots = 2^{-}(\frac{1}{4})$
- ③ إذا كانت  $s = \sqrt[2]{\frac{2}{p}}$  فإن  $s^{-1} = \dots\dots\dots$
- ④  $\dots\dots\dots = 1^0(\sqrt[2]{2}) + 5^2$

أوجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة:

- ①  $2^0(\sqrt[2]{2}) \times 5^0(\sqrt[2]{2})$
- ②  $\frac{5\sqrt[5]{5} \times 2^2(\sqrt[5]{5}) \times 5^0(\sqrt[5]{5})}{4^4(\sqrt[5]{5}) \times 2^2(\sqrt[5]{5})}$
- ③  $\frac{1^4(\sqrt[3]{3}) \times 7^4(\sqrt[3]{3})}{1^4(\sqrt[3]{3})}$
- ④  $\frac{4^{-4}(\sqrt[3]{3}) \times 5^{-5}(\sqrt[3]{3})}{1^{-10}(\sqrt[3]{3})}$
- ⑤  $\frac{2^{-2}(\sqrt[3]{3}) \times 5^0(\sqrt[2]{2})}{9^4(\sqrt[2]{2}) \times 3}$
- ⑥  $\frac{9^{-n} \times 1^{-n} \times 2^n}{2^n}$
- ⑦  $\frac{1 + s^9 \times s^2}{s^{18}}$
- ⑧  $\frac{9^n \times 1^{n+2} \times 1}{n^7 \times n^{27}}$
- ⑨  $\frac{s^4 - s^1 \times 9^2 + s}{s^2 \times 6}$
- ⑩ أثبت أن:  $3 = \frac{s^8 \times 1^{s+27}}{1 + s^9 \times s^{24}}$



## المعادلات الأسية

الدرس  
الثاني

2

١ إذا كان الأساس = الأساس فإن الأس = الأس  $(a)^n = (a)^m \Rightarrow n = m$

هنحاول نحل الأساس بعد يساوي زي الأساس قبل يساوي وبعدها نساوي الأس

إذا كان  $3^2 = 81$   
فإن :  $3^2 = 3^4$   
 $\therefore 2 = 4$   
 $\therefore 2 = 4$

إذا كان  $5^1 = 25$   
فإن :  $5^1 = 5^2$   
 $1 = 2$   
 $1 = 2$

إذا كان  $3^2 = 3^5$   
فإن :  $3^2 = 3^5$   
 $2 = 5$   
 $1 = 3$

٢ إذا كان الأس = الأساس فإن الأساس = الأساس  $(a)^n = (b)^n \Rightarrow a = b$

ولكن بشروط:

٢ إذا كانت الأساسات أعداد مختلفة  
والأس = الأس : فإن الأس = صفر  
 $5^3 = 7^3$   
 $\therefore 3 = 3$

٢ إذا كان الأس زوجي  
هنحط  $\pm$   
 $3^4 = 3^4$   
 $\therefore 3 \pm = 3$

١ إذا كان الأس فردي  
فإن : الأساس = الأساس  
 $5^3 = 3^3$   
 $\therefore 5 = 3$

٣ إذا كان أحد الطرفين ١ فإن الأس = صفر  $(a)^n = 1 \Rightarrow n = 0$

إذا كان :  $2^5 = 1$   
فإن :  $5 = 0$   
 $\therefore 5 = 0$

إذا كان  $2^3 = 1$   
فإن :  $3 = 0$   
 $\therefore 3 = 0$

إذا كان  $3^5 = 1$   
 $\therefore 3^5 = 3^0$   
 $\therefore 5 = 0$   
 $\therefore 5 = 0$



## أمثلة ١

• أوجد قيمة س في كل مما يأتي:

①  $٨١ = ٣^{٢-س}$

الحل

$٣^٤ = ٣^{٢-س}$

∴ الأساس = الأساس ∴ الأس = الأس

$٤ = ٢ - س$

$س = ٦$

⑤  $\frac{٤}{٩} = ٣^٢ \left(\frac{٣}{٢}\right)$

الحل

$\frac{٢٢}{٢٣} = ٣^٢ \left(\frac{٣}{٢}\right)$

$٢ \left(\frac{٢}{٣}\right) = ٣^٢ \left(\frac{٣}{٢}\right)$

عشان نخلى الأساسات متشابهة  
هنقلب الكسر اللى بعد = ونغير إشار الأس

$٢ - \left(\frac{٣}{٢}\right) = ٣^٢ \left(\frac{٣}{٢}\right)$

$١ - = س ∴ ٢ - = س$

②  $\frac{٨}{١٢٥} = ٥^{١-س} \left(\frac{٢}{٥}\right)$

الحل

$\frac{٢٢}{٣٥} = ٥^{١-س} \left(\frac{٢}{٥}\right)$

$٣ \left(\frac{٢}{٥}\right) = ٥^{١-س} \left(\frac{٢}{٥}\right)$

∴ الأساس = الأساس ∴ الأس = الأس

$٣ = ١ - س ∴ ٢ = س$

$س = ٢$

⑥  $\frac{١}{٩} = ٣^{٢-س}$

الحل

$\frac{١}{٢٣} = ٣^{٢-س}$

$٢ - ٣ = ٢ - س$

$س - ٢ = ٢ -$

$س = \text{صفر}$

$س = ٢ + ٢ =$

③  $٤^{١-س} = ٩^{١-س}$

الحل

∴ الأس = الأس والأساسات أعداد مختلفة

$∴ الأس = صفر$

$∴ ١ - س = صفر$

$س = ١ ∴ س = \frac{١}{٢}$

④  $١ = ٥^{٢-س}$

الحل

$٥ = ٥^{٢-س}$

$∴ ٢ - س = صفر$

$س = ٢ ∴ س = \frac{٢}{٧}$

⑦ إذا كان  $\frac{٨^س \times ٩^س}{١٨^س} = ٦٤$  فأوجد قيمة س

الحل

$٦٤ = \frac{٨^س \times ٩^س}{٩^س \times ٢^س}$

$٦٤ = ٢^{٣-س}$

$٦٤ = ٢^{٢-س}$

$٦٢ = ٢^{٢-س}$

$٦ = ٢^{٢-س}$

$س = ٣$



## أمثلة ٢

٦ أوجد في ن مجموعة حل المعادلة:  $٥ = ٥ - ٢س$   $١ = ٥$

الحل

$$\begin{aligned} ٥ = ٥ - ٢س & \Rightarrow ٥ = ٥ - ٢س \\ ٠ & = ٥ - ٢س \\ ٠ & = (٥ - ٢س) \\ ٥ & = ٢س \quad \text{أو} \quad ٥ = ٢س \\ \therefore \text{مجموعة حل المعادلة} & = \{ ٥, ٠ \} \end{aligned}$$

٧ إذا كان  $٢٧ = ٣س$  ،  $١ = ٤ + ص$  ، فأوجد قيمتي  $س$  ،  $ص$

الحل

$$\begin{aligned} ٢٧ &= ٣س \quad \therefore ٣س = ٢٧ \quad \therefore ٣ = ٣ \\ ١ &= ٤ + ص \quad \therefore ١ = ٤ + ص \quad \therefore ٣ = ٣ \\ ٣ &= ٣ \quad \therefore ٣ = ٣ \quad \therefore ٣ = ٣ \\ ٣ &= ٣ \quad \therefore ٣ = ٣ \quad \therefore ٣ = ٣ \end{aligned}$$

٨ إذا كان  $٨ = ٣ - ص$  فإن  $\frac{س}{ص} = \dots\dots\dots$

الحل

$$\frac{س}{ص} = ٨ \quad \therefore \frac{س}{ص} = ٨ \quad \therefore \frac{س}{ص} = ٨$$

٩ ربع العدد  $\frac{٢٠٤}{٤} = \frac{٢٠٤}{٤} = ٥١$

نصف العدد  $\frac{٨٢}{٢} = \frac{٨٢}{٢} = ٤١$

ضعف العدد  $١١٢ = ١٠٢ \times ٢ = ١١٢$

ربع العدد  $\frac{٢٠٢}{٢} = \frac{٢٠٢}{٢} = ١٠١$

١ إذا كانت  $١١ = ٦س$  فإن  $١ + ٦س = \dots\dots\dots$

الحل

$$\begin{aligned} ١ + ٦س &= ٦س \times ١ \\ ١ + ٦س &= ٦س \times ١ \\ ١ + ٦س &= ٦س \times ١ \end{aligned}$$

٢ إذا كانت  $٢ = ٣س$  فإن  $٢ + ٣س = \dots\dots\dots$

الحل

$$\begin{aligned} ٢ + ٣س &= ٣س \times ٢ \\ ٢ + ٣س &= ٣س \times ٢ \\ ٢ + ٣س &= ٣س \times ٢ \end{aligned}$$

٣ إذا كانت  $١٠ = ٥س$  فإن  $١ - ٥س = \dots\dots\dots$

الحل

$$\begin{aligned} ١ - ٥س &= ٥س \div ١٠ \\ ١ - ٥س &= ٥س \div ١٠ \\ ١ - ٥س &= ٥س \div ١٠ \end{aligned}$$

٤ إذا كانت  $٢ = ٣س$  ،  $٥ = ٢س$  فإن  $٥ = ٢س$   $\dots\dots\dots$

الحل

$$\begin{aligned} ٥ &= ٢س \quad \therefore ٥ = ٢س \\ ٥ &= ٢س \quad \therefore ٥ = ٢س \\ ٥ &= ٢س \quad \therefore ٥ = ٢س \end{aligned}$$

٥ إذا كانت  $٣ = ٢س$  فإن  $٤ = ٢س$   $\dots\dots\dots$

الحل

$$\begin{aligned} ٣ &= ٢س \quad \therefore ٣ = ٢س \\ ٣ &= ٢س \quad \therefore ٣ = ٢س \\ ٣ &= ٢س \quad \therefore ٣ = ٢س \end{aligned}$$



## تمارين

## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ① ربع العدد  $٧٤ = \dots\dots\dots$  ( ١٦ ، ٦٤ ، ٤٤ ، ٣٤ )
- ② إذا كان  $٥ - س٧ = ٥ - س٣$  فإن س =  $\dots\dots\dots$  ( صفر ، ٣ ، ٧ ، ٥ )
- ③ إذا كان  $١٠ + س٢ = ١$  فإن س =  $\dots\dots\dots$  ( ١٠- ، صفر ، ٥ ، ٥- )
- ④ إذا كان  $٣ = س( \frac{٢}{٣} ) = \frac{٩}{٤}$  فإن س =  $\dots\dots\dots$  ( ٣- ، ٣ ، ٢- ، ٢ )
- ⑤ إذا كان  $٣ = س( \frac{٣}{٤} ) = \frac{٤}{٣}$  فإن س =  $\dots\dots\dots$  ( ٥- ، ٥ ، ١- ، ١ )
- ⑥ إذا كان  $١ - س٢٣ = \frac{١}{٢٧}$  فإن س =  $\dots\dots\dots$  ( ١٠- ، صفر ، ٥ ، ٥- )

## أكمل ما يأتي:

- ① إذا كان  $٣ = ١٤$  فإن  $\dots\dots\dots$
- ② إذا كان  $٣ = س٣$  فإن  $٢ = ١ + س٣ = \dots\dots\dots$
- ③ إذا كان  $٥ = ص٥$  فإن  $٧ = ٥ - ص٢ = \dots\dots\dots$
- ④ نصف العدد  $٣٠٤$  هو  $\dots\dots\dots$
- ⑤ إذا كان  $١٠ = س٢$  ،  $٥ = ٢ - ص٢$  فإن  $٥ = س٢ - ص٢ = \dots\dots\dots$
- ⑥ إذا كان  $١ = ٢ - س٣$  فإن س =  $\dots\dots\dots$
- ⑦ إذا كان  $٥ = ٢ - س٤٧ = ٢ - س٤٧$  فإن س =  $\dots\dots\dots$
- ⑧ إذا كان  $٢ = س٢٢ = ٤$  فإن  $٢ = س٥ = \dots\dots\dots$
- ⑨ إذا كان  $١ = س٣ + س٣ + س٣$  فإن س =  $\dots\dots\dots$
- ⑩ ثلث العدد  $٢٣٣$  هو  $\dots\dots\dots$
- ⑪ إذا كان  $٢ = س٣$  ،  $٩ = س٩ = \dots\dots\dots$
- ⑫  $٣ + ٣ + ٣ = \dots\dots\dots$

## أجب عن الأسئلة التالية:

- ① إذا كان  $٢٧ = ١ - س٢٣$  فأوجد قيمة س
- ② إذا كان  $١ = ٣ - س٧$  فأوجد قيمة س
- ③ أوجد قيمة س إذا كان:  $٩ = ١ - س( \sqrt[٣]{\phantom{x}} )$
- ④ إذا كان  $٢ = س( \frac{٢}{٣} ) = \frac{١}{٤}$  فأوجد قيمة س
- ⑤ إذا كان  $١ = \frac{١ - س٩ \times س٢}{س٦}$  فأوجد قيمة س
- ⑥ إذا كان  $١٢٥ = \frac{س٩ \times س٢٥}{س٤٥}$  فأوجد قيمة س
- ⑦ إذا كان  $٥ = \frac{١ + س٤٥ \times س٢٧}{س٣١٥}$  فأوجد قيمة س



## 1 الإحصاء

## الإحتمال ل

## مفاهيم

- ❖ التجربة العشوائية: هي تجربة تستطيع معرفة نواتجها قبل إجرائها دون التأكد من الذي سيحدث فعلا
- ❖ فضاء العينة "ف": هو مجموعة كل النواتج الممكنة للتجربة العشوائية
- ❖ الحدث: هو مجموعة جزئية من فضاء العينة

## القانون

■ احتمال وقوع أي حدث =  $\frac{\text{عدد عناصر الحدث}}{\text{عدد عناصر فضاء العينة}}$

■ أي أن: إحتمال وقوع الحدث أ هو:  $P(A) = \frac{n(A)}{n(F)}$

## ملاحظات

- احتمال الحدث المؤكد = ١ بينما احتمال الحدث المستحيل = صفر
- قيمة احتمال أي حدث لا تقل عن صفر ولا تزيد عن واحد أي أن: صفر  $\geq$  احتمال وقوع أي حدث  $\geq$  ١
- مجموع احتمالات أي تجربة يساوي ١ ( ١٠٠ % )
- إذا كان احتمال نجاح طالب هو ٠,٧ فإن احتمال رسوبه = ٠,٣ (  $١ = ٠,٣ + ٠,٧$  )
- إذا كان احتمال وقوع حدث ٤٠ % فإن احتمال عدم وقوعه ٦٠ % (  $١٠٠\% = ٦٠\% + ٤٠\%$  )
- إذا كان احتمال نجاح طالب  $\frac{٣}{٧}$  فإن احتمال رسوبه  $\frac{٥}{٧}$  (  $١ = \frac{٥}{٧} + \frac{٣}{٧}$  )
- الأعداد الأولية: هي التي تقبل القسمة على نفسها وعلى الواحد الصحيح فقط.  
مثل { ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ..... }



## في تجربة حجر النرد

❖ فضاء العينة  $F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ❖ الأعداد الزوجية  $= \{2, 4, 6\}$ ❖ الأعداد الفردية  $= \{1, 3, 5\}$ ❖ الأعداد الأولية  $= \{2, 3, 5\}$ ❖ الأعداد الأكبر من ٢  $= \{3, 4, 5, 6\}$ 

❖ احتمال ظهور عدد أصغر من ٧ = ١ مؤكد

❖ احتمال ظهور عدد أكبر من ٦ = صفر (مستحيل)

## أمثلة

① عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة العدد الظاهر  
فأوجد احتمال أن يكون العدد الظاهر:

- (١) عدد زوجي  
(٢) عدد مربع كامل  
(٣) عدد أولي  
(٤) ظهور العدد ٤

## الحل

$$F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

(١) حدث ظهور عدد زوجي  $= \{2, 4, 6\}$   
عدد عناصر الحدث = ٣

$$\text{احتمال ظهور عدد زوجي} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

(٢) حدث ظهور عدد مربع كامل  $= \{1, 4\}$   
احتمال ظهور عدد فردي  $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

(٣) حدث ظهور عدد أولي  $= \{2, 3, 5\}$   
احتمال ظهور عدد أولي  $= \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(٤) حدث ظهور العدد ٤  $= \{4\}$

$$\text{احتمال ظهور العدد ٤} = \frac{1}{6}$$

② عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة العدد الظاهر  
فأوجد احتمال أن يكون العدد الظاهر:

- (١) عدد أصغر من ٥  
(٢) عدد أكبر من ٤  
(٣) عدد أكبر من ٦  
(٤) عدد أكبر من أو يساوي ١  
(٥) أولى فردي

## الحل

$$F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

(١) حدث ظهور عدد أصغر من ٥  $= \{1, 2, 3, 4\}$   
احتماله  $= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

(٢) حدث ظهور عدد أكبر من ٤  $= \{5, 6\}$   
احتماله  $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

(٣) حدث ظهور عدد أكبر من ٦  $= \Phi$   
احتمال ظهور عدد أكبر من ٦ = صفر (مستحيل)

(٤) حدث ظهور عدد أولى فردي  $= \{1, 3, 5\}$   
احتماله  $= \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(٥) حدث ظهور عدد  $1 \leq$   $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$   
احتماله  $= \frac{6}{6} = 1$  (مؤكد)



٣ صندوق يحتوى على ٤ كرات بيضاء و ٥ كرات حمراء

و ٦ كرات زرقاء فإذا سحبت كرة واحدة عشوائيا  
احسب احتمال أن تكون الكرة المسحوبة:

(١) حمراء (٢) زرقاء

(٣) سوداء (٤) ليست حمراء

(٥) بيضاء أو حمراء

**الحل**

ف = { ٥ كرات بيضاء ، ٥ حمراء ، ٦ زرقاء }

العدد الكلى = ٤ + ٥ + ٦ = ١٥ كرة

(١) احتمال أن تكون الكرة حمراء =  $\frac{٥}{١٥} = \frac{١}{٣}$

(٢) احتمال أن تكون الكرة زرقاء =  $\frac{٦}{١٥} = \frac{٢}{٥}$

(٣) احتمال أن تكون الكرة سوداء = صفر

(٤) احتمال أن تكون ليست حمراء =  $\frac{١٠}{١٥} = \frac{٢}{٣}$

(٥) احتمال أن تكون بيضاء أو حمراء =  $\frac{١٠}{١٥} = \frac{٢}{٣}$

٤ سحبت بطاقة عشوائيا من ٨ بطاقات متماثلة ومرقمة

من ١ إلى ٨ ، أوجد احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة:

(١) تحمل العدد ٥ (٢) تحمل العدد ١٠

(٣) تحمل عددا زوجيا (٤) تحمل عددا أوليا

(٥) تحمل عددا أكبر من صفر

**الحل**

العدد الكلى = ٨

(١) احتمال أن تحمل العدد ٥ =  $\frac{١}{٨}$

(٢) احتمال أن تحمل العدد ١٠ = صفر

(٣) الأعداد الزوجية = { ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ }

احتمال أن تحمل عدد زوجي =  $\frac{٤}{٨} = \frac{١}{٢}$

(٤) الأعداد الأولية = { ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ }

احتمال أن تحمل عدد أولي =  $\frac{٤}{٨} = \frac{١}{٢}$

(٥) احتمال أن تحمل عدد < صفر =  $\frac{٨}{٨} = ١$

٥ سحبت بطاقة عشوائيا من ١٠ بطاقات متماثلة ومرقمة

من ١ إلى ١٠ ،

أوجد احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تحمل:

(١) العدد ٧ (٢) عدد يقبل القسمة على ٤

(٣) عدد أكبر من ١٠ (٤) عدد أولى فردى

**الحل**

العدد الكلى = ١٠

(١) احتمال أن تحمل العدد ٧ =  $\frac{١}{١٠}$

(٢) الأعداد التي تقبل القسمة ÷ ٤ = { ٤ ، ٨ }

احتمال أن تحمل عدد يقبل القسمة ÷ ٤ =  $\frac{٢}{١٠} = \frac{١}{٥}$

(٣) احتمال أن تحمل عدد < ١٠ = صفر

(٤) الأعداد الأولية الفردية = { ٣ ، ٥ ، ٧ }

احتمال أن تحمل عدد أولى فردى =  $\frac{٣}{١٠}$

٦ في إحدى المباريات إذا كان احتمال فوز فريق =  $\frac{١}{٢}$

واحتمال هزيمته =  $\frac{١}{٣}$  أوجد احتمال تعادله

**الحل**

:: مجموع كل الاحتمالات = ١

:: احتمال الفوز + احتمال الهزيمة + احتمال التعادل = ١

:: احتمال التعادل =  $١ - (\frac{١}{٣} + \frac{١}{٢}) = \frac{١}{٦}$

٧ عند إلقاء قطعة نقود مرة واحدة لوحظ الوجه الظاهر

احسب احتمال ظهور:

(١) صورة (٢) كتابة

**الحل**

ف = { صورة ، كتابة }

احتمال ظهور صورة =  $\frac{١}{٢}$  ، احتمال ظهور كتابة =  $\frac{١}{٢}$

٨ مدرسة بها ٥٠٠ طالب وطالبة وعدد البنين ٣٠٠

اختير طالب عشوائيا فاحسب احتمال أن يتم اختيار بنت

**الحل**

العدد الكلى = ٥٠٠

عدد البنات = ٥٠٠ - ٣٠٠ = ٢٠٠

احتمال اختيار بنت =  $\frac{٢٠٠}{٥٠٠} = \frac{٢}{٥}$



① صندوق يحتوى على ٥ كرات حمراء و ٣ كرات صفراء

و ٢ كرة سوداء فإذا سحبت كرة واحدة عشوائيا

احسب احتمال أن تكون الكرة المسحوبة:

(١) صفراء (٢) سوداء

(٣) خضراء (٤) ليست سوداء

(٥) صفراء أو سوداء

الحل

② صندوق يحتوى على ١٥ بطاقة مرقمة من ١ إلى ١٥

سحبت كرة عشوائيا فأوجد احتمال أن تكون البطاقة

المسحوبة:

(١) تحمل العدد ٧ (٢) تحمل عدد أكبر من ١٠

(٣) تحمل عددا زوجيا (٤) تحمل عددا مربع كامل

(٥) تحمل عددا يقبل القسمة على ٣

الحل

④ مدرسة بها ١٢٠ تلميذ وتلميذة وعدد البنات فيها

٨٠ بنت ، فإذا اختير تلميذ عشوائيا

فما احتمال أن يكون:

(١) ولد (٢) بنت

الحل

③ ألقى حجر نرد مرة واحدة فقط ولو حظ العدد الظاهر

أوجد احتمال الحصول على:

(١) العدد ٢ (٢) عدد فردي أقل من ٤

(٣) عدد زوجي (٤) عدد أولى زوجي

(٥) عدد أصغر من أو يساوى ٦ (٦) العدد ٧

الحل



## تمارين

## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ① مجموع الاحتمالات الممكنة لتجربة عشوائية ..... ( = صفر ، = ١ ، < ١ ، > ١ )
- ② أي مما يأتي يمكن أن يكون احتمالاً لحدث ما؟ ..... ( -٠,٢ ، ٨٧٪ ، ١,٠٧ ، ١١٣٪ )
- ③ ألقى حجر نرد مرة واحدة فإن احتمال ظهر عدد أقل من ١ يساوي ..... (  $\frac{1}{6}$  ،  $\Phi$  ،  $\frac{1}{4}$  ، صفر )
- ④ إذا كان احتمال نجاح طالب هو ٠,٨ فإن احتمال رسوبه يساوي ..... (  $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{3}{8}$  ،  $\frac{1}{6}$  )
- ⑤ فصل به ٢١ ولد ، ١٥ بنت فإذا اختير تتلميذ عشوائياً فاحتمال أن يكون بنت = ... (  $\frac{5}{12}$  ،  $\frac{7}{12}$  ،  $\frac{4}{7}$  ،  $\frac{5}{6}$  )

## أكمل ما يأتي:

- ① احتمال الحدث المستحيل يساوي ..... بينما احتمال الحدث المؤكد يساوي .....
- ② إذا كان احتمال نجاح طالب هو ٠,٧ فإن احتمال رسوبه يساوي .....
- ③ عند إلقاء قطعة نقود مرة واحدة فإن احتمال ظهور صورة على الوجه العلوي يساوي .....
- ④ عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة فإن احتمال ظهور العدد ٣ على الوجه العلوي يساوي .....
- ⑤ احتمال أي حدث لا يقل عن ..... ولا يزيد عن .....
- ⑥ عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد زوجي يساوي .....

## أجب عن الأسئلة التالية:

① ألقى حجر نرد مرة واحدة ولوحت الوجه الظاهر  
فما احتمال الحصول على:

- (١) عدد زوجي (٢) عدد أولي (٣) عدد أقل من ٥  
(٤) عدد يقبل القسمة على ٤ (٥) عدد أكبر من ٦

② سحبت بطاقة عشوائياً من ٩ بطاقات مرقمة من ١  
إلى ٩ سحبت كرة عشوائياً، فما احتمال أن تحمل البطاقة:

- (١) عدد زوجي (٢) عدد أولي (٣) عدد أقل من ١٠  
(٤) عدد يقبل القسمة على ٣ (٥) عدد أكبر من ٣

③ كيس يحتوي على ٦ كرات حمراء ، ١٠ كرات خضراء

، ٤ كرات بيضاء سحبت كرة عشوائياً

أوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة:

- (١) خضراء (٢) حمراء (٣) ليست خضراء  
(٤) ليست حمراء (٥) حمراء أو خضراء (٦) سوداء

④ ألقى حجر نرد مرة واحدة فقط

(١) اكتب فضاء العينة

(٢) أوجد احتمال ظهور عدد أولي  $\geq ٥$

(٣) أوجد احتمال ظهور عدد يقبل القسمة على ٧

(٤) أوجد احتمال ظهور عدد أولي زوجي



١ إذا كان المقدار  $٤س^٢ + ٩ك + ٩$  ثلاثي مربع كامل فإن  $ك = \dots\dots\dots$

- ١ ☐ ٦      ☐  $١٢ \pm$       ☐ ١٢      ☐  $٦ \pm$

٢ إذا كان  $٦س = ٥$  فإن  $٦س + ١ = \dots\dots\dots$

- ١ ☐ ١١      ☐ ٣٠      ☐  $\frac{٦}{٥}$       ☐  $\frac{٥}{٦}$

٣ المعكوس الجمعي للعدد  $١ - \sqrt{٢}$  هو  $\dots\dots\dots$

- ١ ☐  $\sqrt{٢} + ١$       ☐  $١ - \sqrt{٢}$       ☐  $١ - \sqrt{٢}$       ☐ صفر

٤ إذا كان  $س + ص = ٤$  ،  $س - ص = ٣$  فإن  $ص^٢ - س^٢ = \dots\dots\dots$

- ١ ☐ ٧      ☐  $١٢ -$       ☐ ١٢      ☐  $٧ -$

٥ إذا كان  $٢س - ١$  أحد عاملي المقدار  $١٠س^٢ + س - ٣$  فإن العامل الآخر هو  $\dots\dots\dots$

- ١ ☐  $٣س + ٥$       ☐  $٣س + ٥$       ☐  $٣س - ٥$       ☐  $٣س - ٥$

٦ إذا كان  $(س + ص)^٢ = ٣٢$  ،  $سص = ١٢$  فإن  $س^٢ + ص^٢ = \dots\dots\dots$

- ١ ☐ ٢٠      ☐ ٨      ☐ ٢٦      ☐ ١٨

٧ إذا كان  $٢س = ٥$  فإن  $٨س = \dots\dots\dots$

- ١ ☐ ٤٠      ☐ ١٥      ☐ ٢٠      ☐ ١٢٥

٨ إذا كان  $٢ > س > ٥$  فإن  $٣س - ١ \geq \dots\dots\dots$

- ١ ☐  $]١٤، ٥[$       ☐  $]١٢، ٥[$       ☐  $]١٤، ٠[$       ☐  $]٧، ٥[$



٩ إذا كان  $s^2 - 2s + 5 = 25$  فإن  $s - 5 = \dots$

- ٢٥ ☐ ٥ ☒ ٥ ☐ ٥ ☐ ٥

١٠ إذا كان  $s^2 - 2s = 24$  ،  $s + 8 = 3s - 3$  فإن  $s = \dots$

- ٣ ☐ ٩ ☒ ١٢ ☐ ١٦ ☐ ١٦

١١ إذا كان المقدار  $s^2 - 2s - 6$  قابلاً للتحويل فإن  $s$  يمكن أن تساوي  $\dots$

- ٣٠ ☐ ٦ ☒ ١٢ ☐ ٨ ☐ ٨

١٢ حل كلا مما يأتي تحليلًا كاملاً

- ١  $s^4 - s$  ☐  $s^3 - 3s - 10$  ☐  
٢  $s^4 + 4s$  ☒  $s^3 + 7s - 6$  ☐  
٣  $s^4 - 17s + 21$  ☐  $s^4 + 27s^3 - 3$  ☒

١٣ صندوق يحتوي علي ٤ كرات حمراء ، ٦ كرات بيضاء ، ٧ كرات سوداء ، سُحبت كرة من الصندوق عشوائياً  
أوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة

- ١ بيضاء ☐ ٢ ليست حمراء ☒ ٣ حمراء أو سوداء ☐ ٤ خضراء ☐

١٤ صندوق يحتوي علي ٣٠ كرة متماثلة باللونين الأزرق والأحمر ، فإذا كان احتمال اختيار كرة حمراء  
يساوي  $\frac{3}{5}$  فأوجد عدد الكرات الزرقاء

١٥ أوجد العدد الحقيقي الموجب الذي يزيد مربعه عن ضعفه بمقدار ٣٥

١٦ إذا كان  $\frac{s^4 \times s^9}{s^{26}} = s^2 + 1$  . أوجد قيمة  $s$

١٧ أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في  $\mathbb{C}$  :  $s(s + 3) = 28$



### ١٨ أكمل ما يأتي بإجابات صحيحة

- ① إذا كان  ${}^3س + ١ = ٧ + {}^١س$  فإن  $س = \dots\dots\dots$
- ②  ${}^٥٢ + ({}^{١٠}٢٧) = \dots\dots\dots ٢$
- ③ مجموعة حل المعادلة  $س^٢ + ٩ = ٠$  صفر في  $ح$  هي  $\dots\dots\dots$
- ④ مجموعة حل المعادلة  $س^٢ + ٣س = ٠$  صفر في  $ح$  هي  $\dots\dots\dots$
- ⑤ إذا كان  $س^٣ + س^٣ + س^٣ = ١$  فإن  $س = \dots\dots\dots$
- ⑥ إذا كان عمر محمد الآن  $= س$  سنه فإن ضعف عمره بعد ٣ سنوات يساوي  $\dots\dots\dots$
- ⑦ إذا كان ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ،  $\dots\dots\dots$  ،  $\dots\dots\dots$
- ⑧ عند القاء حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد أولي يساوي  $\dots\dots\dots$
- ⑨ إذا كان  $س^٣ = ٢٧$  ،  $٤س + ص = ١$  فإن  $س ص = \dots\dots\dots$
- ⑩ إذا كان  $س^٣ ص^{-٣} = ٨$  فإن  $\frac{ص}{س} = \dots\dots\dots$
- ⑪ نصف العدد  ${}^{١٠}٢ = \dots\dots\dots ٢$
- ⑫ ضعف العدد  ${}^{١٠}٢ = \dots\dots\dots ٢$

١٩ مجموعة من البطاقات مرقمة من ١ الى ٢٤ فإذا سُحبت منها بطاقة واحدة عشوائياً ، أوجد احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة عليها :

- ① عدد مُضاعف للعدد ٦      ② عدد مربع كامل

٢٠ أوجد في  $ح$  مجموعة حل المعادلة  $(٣-س)(١+س) = ٥$

٢١ مستطيل طوله ثلاثة أمثال عرضه فإذا كانت مساحة سطحه  $١٢سم^٢$  فأوجد بعدي المستطيل

٢٢ إذا كان  $٦٤ = \frac{{}^٨س \times {}^٩س}{{}^{١٨س}}$  فأوجد قيمة  $(٤)^{-س}$



### ٢٣ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- ١ إذا كانت  $(س - ٣)^{\text{صفر}} = ١$  فإن  $س \in \dots\dots\dots$
- ١ ☐  $\mathbb{Z}$     ٢ ☐  $\mathbb{Z} - \{٣\}$     ٣ ☐  $\{٣\}$     ٤ ☐  $\{٣ -\}$
- ٢ أي من الآتي يمكن أن يكون احتمال أحد الأحداث ؟
- ١ ☐  $-٠,٥$     ٢ ☐  $١,٢$     ٣ ☐  $\%٣٧$     ٤ ☐  $\frac{٥}{٤}$
- ٣ عدنان فرديان متتاليان أحدهما  $س$  فإن العدد الآخر هو .....
- ١ ☐  $س + ١$     ٢ ☐  $س + ٢$     ٣ ☐  $٢س$     ٤ ☐  $س - ١$
- ٤ يلعب نادي ٣٠ مباراة في الدوري العام وكان احتمال تعادله في احدي المباريات هو ٠,٣ واحتمال فوزه ٠,٦ فإن عدد المباريات المتوقع أن يخسرها النادي هي ..... مباراة
- ١ ☐ ٣    ٢ ☐ ٩    ٣ ☐ ١٨    ٤ ☐ ٢٠
- ٤ مجموعة حل المعادلة  $\frac{٨}{س} = \frac{س}{٣}$  في  $\mathbb{Z}$  هي .....
- ١ ☐  $\{٤\}$     ٢ ☐  $\{٤ \pm\}$     ٣ ☐  $\{١٦\}$     ٤ ☐  $\{٨ \pm\}$



١ إذا كان المقدار  $٤س^٢ + ٩ك + ٩$  ثلاثي مربع كامل فإن  $ك =$  .....

٦  $\pm$  (د)

١٢ (ح)

١٢  $\pm$  (ب)

٦ (أ)

الحل

الحد الأوسط  $= \pm ٢ \times \sqrt{٩ك} \times \sqrt{٩} =$  الثاني

الحد الأوسط  $= \pm ٢ \times ٣ \times ٣ = ١٢ \pm ك$  ومنها  $ك = ١٢ \pm$

٢ إذا كان  $٦س = ٥$  فإن  $٦س + ١ =$  .....

$\frac{٥}{٦}$  (د)

$\frac{٦}{٥}$  (ح)

٣٠ (ب)

١١ (أ)

الحل

$٦س + ١ = ٦ \times ٥ + ١ = ٣٠$

٣ المعكوس الجمعي للعدد  $١ - \sqrt{٢}$  هو .....

صفر (د)

$١ - \sqrt{٢}$  (ح)

$١ - \sqrt{٢}$  (ب)

$١ + \sqrt{٢}$  (أ)

الحل

$١ - \sqrt{٢}$  (ب)

٤ إذا كان  $س + ص = ٤$  ،  $س - ص = ٣$  فإن  $ص^٢ - س^٢ =$  .....

$٧ -$  (د)

١٢ (ح)

$١٢ -$  (ب)

٧ (أ)

الحل

$ص^٢ - س^٢ = (ص - س)(ص + س) = ٣ \times ٤ = ١٢ -$



٥ إذا كان  $٢س - ١$  أحد عاملي المقدار  $١٠س^٢ + ٣س - ٣$  فإن العامل الآخر هو .....

- ١  $٣س + ٥$  ٢  $٥س + ٣$  ٣  $٥س - ٣$  ٤  $٣س - ٥$

الحل

$$١٠س^٢ + ٣س - ٣ = (١س - ٣)(٣س + ٥)$$

العامل الأول العامل الثاني

العامل الثاني هو  $(٣س + ٥)$

٦ إذا كان  $(س + ص)^٢ = ٣٢$  ،  $١٢ = صص$  فإن  $٢س + ص^٢ =$  .....

- ١  $٢٠$  ٢  $٨$  ٣  $٢٦$  ٤  $١٨$

الحل

$$(س + ص)^٢ = ٣٢$$

$$٣٢ = ٢سص + ص^٢ + ٢س$$

$$٣٢ = ٢س + ٢٤ + ص^٢ \text{ ومنها } ٣٢ - ٢٤ = ٨ = ص^٢$$

٧ إذا كان  $٢س^٣ = ٥$  فإن  $٨س^٣ =$  .....

- ١  $٤٠$  ٢  $١٥$  ٣  $٢٠$  ٤  $١٢٥$

الحل

$$٨س^٣ = (٢ \times ٢ \times ٢)س^٣ = ٢س^٣ \times ٢س^٣ \times ٢س^٣ = ٥ \times ٥ \times ٥ = ١٢٥$$

٨ إذا كان  $٢ > س > ٥$  فإن  $٣س - ١ \geq$  .....

- ١  $]١٤، ٥[$  ٢  $]١٢، ٥[$  ٣  $]١٤، ٠[$  ٤  $]٧، ٥[$

الحل

$$٢ > س > ٥ \text{ خذ بالك ان } ٥ > ٣س - ١ \text{ معناها } ٢ > ٣س - ١$$

$$٣س - ١ \geq ١٤، ٥$$



٩ إذا كان  $s^2 - 2s + v = 25$  فإن  $s - v = \dots$

٥ (د)

٥ (ح)

٥  $\pm$  (ب)

٢٥ (أ)

الحل

$$s^2 - 2s + v = 25$$

$$(s - v)(s + v) = 25$$

$$(s - v) = \frac{25}{s + v}$$
 بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$s - v = \pm 5$$

١٠ إذا كان  $s^2 - 2s + v = 24$  ،  $s + v = 8$  فإن  $s^3 - v^3 = \dots$

١٦ (د)

١٢ (ح)

٩ (ب)

٣ (أ)

الحل

$$s^2 - 2s + v = 24$$

$$(s - v)(s + v) = 24$$

$$8 \times (s - v) = 24$$

$$(s - v) = 3 \quad \text{بضرب الطرفين} \times 3$$

$$s^3 - v^3 = 9$$

١١ إذا كان المقدار  $s^2 - 2s - k$  قابلاً للتحويل فإن  $k$  يمكن أن تساوي .....

٨ (د)

١٢ (ح)

٦ (ب)

٣٠ (أ)

الحل

$$s^2 - 2s - k = 0 \quad \text{قابلاً للتحويل عندما} \quad k = 8$$

لأن عندما  $k = 8$  هنلاقي عددين حاصل ضربهما ٨ والفرق بينهما ٢ وهما ٢ ، ٤



## ١٢ حل كلا مما يأتي تحليلًا كاملاً

- ١)  $s^4 - s$       ب)  $s^2 - s^3 - 10$   
 ج)  $s^4 + s^4$       د)  $s^3 + s^2 + 7s - 6$   
 هـ)  $s - 17 + s^3 + 21$       ز)  $s^8 + 27s^3$

الحل

١)  $s^4 - s = s(s^3 - 1) = s(s - 1)(s^2 + s + 1)$

ب)  $s^2 - s^3 - 10 = (s - 5)(s + 2)$

ج)  $s^4 + s^4$  (تحليل بإكمال المربع)  $\text{هنضيف } 2 \times \sqrt{\text{الأول}} \times \sqrt{\text{الثاني}} = 2 \times s^2 \times s^2 = s^4 + s^4$

$(s^4 + s^4 + s^4) - (s^4 + s^4 + s^4)$

$(s^2 + s^2) - (s^2 + s^2)$  (تحليل فرق بين مربعين)

$(s^2 + s^2 + s^2) (s^2 - s^2 + s^2)$

د)  $s^3 + s^2 + 7s - 6 = (s - 3)(s^2 + 2s + 3)$

هـ)  $s - 17 + s^3 + 21$  (تحليل بالتقسيم)

$(s - 17) + (s^3 + 21)$

$1(s - 7) + 3(s - 7)$

$(s - 7)(3 + 1)$

ز)  $s^8 + 27s^3 = s^3(s^5 + 27) = s^3(s^3 + 3)(s^2 + 3s + 9)$



١٣ صندوق يحتوي علي ٤ كرات حمراء ، ٦ كرات بيضاء ، كرتين سوداوين ، سُحبت كرة من الصندوق عشوائياً أوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة

١ بيضاء ٢ ليست حمراء ٣ حمراء أو سوداء ٤ خضراء

الحل

العدد الكلي للكرات في الصندوق =  $4 + 6 + 2 = 12$  كرة

١ بيضاء =  $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$  ٢ ليست حمراء =  $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

٣ حمراء أو سوداء =  $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$  ٤ خضراء = صفر

١٤ صندوق يحتوي علي ٣٠ كرة متماثلة باللونين الأزرق والأحمر ، فإذا كان احتمال اختيار كرة حمراء يساوي  $\frac{3}{5}$  فأوجد عدد الكرات الزرقاء

الحل

عدد الكرات الحمراء = عدد الكرات الكلي  $\times$  احتمال اختيار كرة حمراء =  $\frac{3}{5} \times 30 = 18$  كرة  
عدد الكرات الزرقاء =  $30 - 18 = 12$  كرة

١٥ أوجد العدد الحقيقي الموجب الذي يزيد مربعه عن ضعفه بمقدار ٣٥

الحل

نفرض العدد = س

$$س^2 - 2س = 35$$

$$س^2 - 2س - 35 = 0$$

$$0 = (س - 7)(س + 5)$$

$$س = 7 \text{ ومنها } س = 7$$

$$س = -5 \text{ ومنها } س = -5$$

العدد هو ٧



١٦ إذا كان  $\frac{4 \times 9}{2^6} = 1 + 2^x$  . أوجد قيمة  $x$

**الحل**

$$1 + 2^x = \frac{4 \times 9}{2^6} \quad \text{ومنها } 1 + 2^x = \frac{2^2 \times 3^2}{2^6} \quad \text{ومنها } 1 + 2^x = \frac{3^2}{2^4} \quad \text{ومنها } 1 = 2^x - 3^2$$

$$2^x - 3^2 = 1 \quad \text{ومنها } 2^x = 1 + 3^2 = 10 \quad \text{ومنها } x = 3.32$$

١٧ أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في  $\mathbb{R}$  :  $s(s+3) = 28$

**الحل**

$$s(s+3) = 28$$

$$s^2 + 3s - 28 = 0 \quad (\text{تحليل مقدار ثلاثي بسيط})$$

$$s = (s-4)(s+7)$$

$$\text{أما } s+7 = 0 \text{ ومنها } s = -7$$

$$\text{أو } s-4 = 0 \text{ ومنها } s = 4$$

$$s = \{4, -7\}$$

١٨ أكمل ما يأتي بإجابات صحيحة

١ إذا كان  $3^{1+s} = 7^{1+s}$  فإن  $s = \dots$

**الحل**

$$3^{1+s} = 7^{1+s} \quad \text{ومنها } 1+s = 0 \quad \text{ومنها } s = -1$$

٢  $2^0 = 1 + 2^x$  .....  $x = \dots$

**الحل**

$$2^0 = 1 + 2^x \quad \text{خذ بالك قبل الحل ان}$$

$$2^0 = 1 + 2^x \quad \text{(معناها } 2^0 \text{ متكررة مرتين)}$$

$$2^0 = 2 \times 2^0 = 2^0 + 2^0$$



٣) مجموعة حل المعادلة  $s^2 + 9 = 0$  = صفر في  $\mathbb{C}$  هي .....

**الحل**

$$s^2 + 9 = 0 \text{ صفر}$$

$$s^2 = -9 \text{ بأخذ الجذر التربيع للطرفين}$$

$$s = \text{لا يوجد جذر} \quad \mathbb{C} = \emptyset$$

٤) مجموعة حل المعادلة  $s^3 + 3s = 0$  = صفر في  $\mathbb{C}$  هي .....

**الحل**

$$s^3 + 3s = 0 \text{ صفر}$$

$$s(s^2 + 3) = 0$$

$$\text{أما } s = 0$$

$$\text{أو } s^2 + 3 = 0 \text{ ومنها } s = -3 \text{ ومنها } s = 3$$

$$\mathbb{C} = \{0, -3, 3\}$$

٥) إذا كان  $s^3 + s^3 + s^3 = 1$  فإن  $s = \dots\dots\dots$

**الحل**

**خذ بالك ان**  $s^3 + s^3 + s^3$  تعني  $s^3$  متكررة ٣ مرات

$$\text{يعني } s^3 + s^3 + s^3 = 3 \times s^3 = 1 + s^3$$

$$\therefore 1 + s^3 = 1 \text{ ومنها } s^3 = 0 \text{ ومنها } s = 1 \text{ ومنها } s = -1$$

٦) إذا كان عمر محمد الآن =  $s$  سنه فإن ضعف عمره بعد ٣ سنوات يساوي .....

**الحل**

اول حاجه نجيب عمره بعد ٣ سنوات يساوي  $s + 3$

$$\text{بعد كده نجيب ضعف عمره بعد ٣ سنوات} = 2(s + 3) = 2s + 6$$



٧) إذا كان ١، ٤، ٩، ١٦، ..... ، ..... ،

**الحل**

الأعداد المعطاه هي مربعات الأعداد بداية من العدد ١

وبالتالي يكون التسلسل ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥، ٣٦

٨) عند القاء حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد أولي يساوي .....

**الحل**

**العدد الأولي : هو العدد الذي له عاملان مختلفان فقط**

والأعداد الأولية التي علي حجر النرد هي ٢، ٣، ٥

∴ احتمال ظهور عدد أولي =  $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

٩) إذا كان  $3^3 = 27$ ،  $4^3 + 3 = 1$  فإن  $3^3 =$  .....

**الحل**

$3^3 = 27 = 3^3$  ومنها  $3 = 3$

$4^3 + 3 = 1$  ومنها  $3 + 3 = 0$

∴  $3 + 3 = 0$  ومنها  $3 - 3 = 0$

∴  $3^3 = 3 - 3 = 0$

١٠) إذا كان  $3^3 = 8$  فإن  $\frac{3^3}{3^3} =$  .....

**الحل**

أولاً : خذ بالك من حاجة مهمة أوي ان  $3^3 = 3^3$

∴  $\frac{3^3}{3^3} = 8$  بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين

∴  $\frac{3}{3} = 2$

ومنها  $\frac{3}{3} = \frac{1}{2}$



١١) نصف العدد  $102 = 2 \dots\dots\dots$

**الحل**

$$\text{نصف العدد } 102 = 102 \times \frac{1}{2} = 51$$

١١) ضعف العدد  $102 = 2 \dots\dots\dots$

**الحل**

$$\text{نصف العدد } 102 = 102 \times 2 = 204$$

١٩) مجموعة من البطاقات مرقمة من ١ الى ٢٤ فإذا سُحبت منها بطاقة واحدة عشوائياً ، أوجد احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة عليها :

Ⓐ عدد مُضاعف للعدد ٦

Ⓑ عدد مربع كامل

**الحل**

Ⓐ عدد مُضاعف للعدد ٦ أي عدد يقبل القسمة علي ٦

وهي ٦ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٤

احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة مكتوب عليها مُضاعف للعدد ٦  $\frac{4}{24} = \frac{1}{6}$

Ⓑ عدد مربع كامل

**تعريف العدد المربع الكامل :** هو العدد الذي له جذر تربيعي

الاعداد المربعة الكاملة من ١ الى ٢٤ هي ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦

احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة مكتوب عليها عدد مربع كامل  $\frac{4}{24} = \frac{1}{6}$

٢٠) أوجد في ح مجموعة حل المعادلة  $0 = (3-s)(s+1)$

**الحل**

$$0 = (3-s)(s+1) \quad \text{ومنها } s^2 - 3s - 3 = 0$$

$$0 = (3-s)(s+1) \quad \text{ومنها } s^2 - 8s + 8 = 0$$

$$\text{أما } s - 4 = 0 \quad \text{ومنها } s = 4$$

$$\text{أو } s + 2 = 0 \quad \text{ومنها } s = -2$$

$$H = \{-2, 4\}$$



٢١ مستطيل طوله ثلاثة أمثال عرضه فإذا كانت مساحة سطحه ١٢ سم<sup>٢</sup> فأوجد بعدي المستطيل

**الحل**

والطول = ٣ س

نفرض عرض المستطيل = س

∴ المساحة = الطول × العرض

$$١٢ = س \times ٣$$

$$١٢ = ٣ س \quad ( \div ٣ )$$

س = ٤ بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$س = ٢$$

$$العرض = ٢ سم$$

$$والطول = ٣ \times ٢ = ٦ سم$$

٢٢ إذا كان  $٦٤ = \frac{٨ س \times ٩ س}{١٨ س}$  فأوجد قيمة (٤) - س

**الحل**

$$٦٤ = \frac{٨ س \times ٩ س}{١٨ س} \quad ٦٤ = \frac{٨ س \times ٣}{١٨ س}$$

$$٦٤ = \frac{٨ س \times ٣}{١٨ س} \quad ٦٤ = \frac{٨ س \times ٣}{١٨ س}$$

$$\frac{١}{٦٤} = ٣ - ٤ = س - (٤)$$

٢٣ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

١ إذا كانت ( س - ٣ ) صفر = ١ فإن س  $\supset$  .....

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

٢ أي من الآتي يمكن أن يكون احتمال أحد الأحداث ؟

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

٣ عدنان فرديان متتاليان أحدهما س فإن العدد الآخر هو .....

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

$$\textcircled{١} \quad \textcircled{٢} \quad \textcircled{٣} \quad \textcircled{٤} \quad \textcircled{٥} \quad \textcircled{٦} \quad \textcircled{٧} \quad \textcircled{٨} \quad \textcircled{٩} \quad \textcircled{١٠}$$

٤ يلعب نادي ٣٠ مباراة في الدوري العام وكان احتمال تعادله في احدي المباريات هو ٠,٣



واحتمال فوزه ٠,٦ فإن عدد المباريات المتوقع أن يخسرها النادي هي ..... مباراة

٢٠ (د)

١٨ (ج)

٩ (ب)

٣ (أ)

**الحل**

احنا عارفين ان مجموع الاحتمالات لأي تجربة عشوائية = ١

وبالتالي يكون احتمال الخسارة = ٠,١

عدد المباريات المتوقع أن يخسرها النادي = العدد الكلي للمباريات × احتمال الخسارة

$$= ٣٠ \times ٠,١ = ٣ \text{ مباريات}$$

٤ مجموعة حل المعادلة  $\frac{8}{s} - \frac{s}{3} = 0$  في ج هي .....

{٨±} (د)

{١٦} (ج)

{٤±} (ب)

{٤} (أ)

**الحل**

$s^2 = ١٦$  بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$s = \pm ٤$$

**انتهت المراجعة**

**مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح**



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) (٢) من ترى توجيه الرياضيات ٢ / عاين اولول

١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(أ) إذا كانت :  $(\frac{3}{5})^3 = \frac{27}{125}$  فإن : س = ..... ( - ٥ أ ٣ - ٣ أ ٥ أ ٣ )

(ب) المقدار الثلاثي :  $س^2 + ٤س + ٩$  مربع كامل عندما : ..... =

( ٦ أ ٦ ± ١٢ أ ٣٦ أ ١٨ ± )

(ج) إذا كان :  $س^2 - ص^2 = ١٦$  ،  $س + ص = ٨$  فإن : س - ص = ..... =

( ٢ أ ١ أ ١٢٨ أ ٦٤ )

(د) مجموعة حل المعادلة  $س^2 - س =$  صفر : في ع هي .....

( { ٠ } أ { ١ } أ { ١ ، ٠ } )

(هـ)  $(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3}) =$  .....

( ١ أ ٥ أ ٦ أ ٥ )

الإجابة

(أ) ٣ (ب)  $١٢ \pm$  (ج) ٢ (د) { صفر ، ١ } (هـ)  $١ = (٣ - ٢)^2$

٢) أكمل ما يأتي :

(أ) إذا كانت : س + ص = ٩ ، س - ص = ٥ ، فإن : س - ص = .....

(ب) مجموعة حل المعادلة : س + ٤ = ٠ هي .....

(ج) احتمال الحدث المؤكد = .....

(د) العدد :  $(\sqrt[3]{-٢٧})^{-٤} =$  .....

(هـ) إذا كان : ( س - ٤ ) أحد عاملي المقدار :  $س^2 - ٧س + ١٢$

، فإن : العامل الآخر = .....

الإجابة

(أ) ٤٥ (ب)  $\emptyset$  (ج) ١ (د)  $\frac{1}{9}$  (هـ) (س - ٣)











المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) (٥) مندرى توجيه الرياضيات ٢ / عاون اوول

الإجابة

$$(١) \therefore ٢ - س = ٢ - ٢ : س = صفر$$

$$(ب) ٣٦ = ٢٣ \times ٢٢ = \frac{٢ + س٢ \quad ٣ \times \quad ٢ + س٢}{س٢ \quad ٣ \times \quad س٢}$$

(١٠) (أولاً) : أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في ع : س - س - ١٢ = صفر

(ثانياً) : صندوق يحتوى على ١٥ كرة متماثلة مرقمة من ١ إلى ١٥ اختيرت كرة عشوائية

اكتب فضاء العينة ثم أوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة تحمل عدداً :

(١) زوجياً : (ب) يقبل القسمة على ٣

الإجابة

$$(أولاً) \therefore (س - ٤) (س + ٣) = صفر$$

$$\therefore م.ع = \{ ٣ - ٦٤ \}$$

(ثانياً) ف = { ١٥ ٦ ..... ٦٤ ٦ ٣ ٦ ٢ ٦ ١ }

$$(١) \frac{٧}{١٥} \quad (ب) \frac{١}{٣} = \frac{٥}{١٥}$$

٨ حل كلاً مما يأتي لأبسط صورة :

$$(١) ٦س٢ + ١١س - ١٠ \quad (ب) س٢ + س٢ + س + ١$$

$$(ج) ١٢ - ٨س \quad (د) ٤س٢ + ٤ص$$

الإجابة

$$(١) (٢ - ٣س) (٥ + ٢س)$$

$$(ب) (س٢ + س٢) + (س + ١)$$

$$= س٢ (س + ١) + (س + ١)$$

$$= (س + ١) (س٢ + س + ١)$$

$$(ج) ٢(١ - ٤س) = ٢(١ - ٢س) (٢ + ١س)$$

$$(د) (٤س٢ + ٤س٢ + ٤ص + ٤ص) - (٤س٢ + ٤ص)$$

$$= (٢س٢ + ٢ص) (٤س٢ + ٤ص) - (٤س٢ + ٤ص)$$

$$= (٢س٢ - ٢س٢ + ٢ص + ٢ص) =$$

$$\times (٢س٢ + ٢س٢ + ٢ص + ٢ص)$$

٩ (١) إذا كان : ٣ - س = ١/٩ أوجد : قيمة س .

$$(ب) اختصر لأبسط صورة : \frac{٤س + ١}{٩س + ١} \times \frac{١ + س}{١ + س}$$



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) (٦) من ترى توجيه الرياضيات ٢ / عاقل اولاد

١١ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(أ) إذا كان المقدار :  $4س^2 + لس + ٩$  مربعاً كاملاً فإن : قيمة ل = .....

$$(٦ أ - ٩ أ ٦ ± ١٢)$$

(ب) إذا كان :  $٥س = ٢$  فإن :  $٥س + ١ =$  .....

$$(٧ أ ٨ أ ١٠ أ ٢٥)$$

(ج) إذا كان :  $١ - ٢س = ١٥$ ، فإن :  $٣ = ١ - ٢س =$  .....

$$(٥ أ ٩ أ ١٢ أ ٤٥)$$

(د) ناتج المقدار :  $٢ + ٢ - ١ + \left(\frac{١}{٢}\right)^2 =$  ..... (صفر أ ١ أ ٢ أ ٤)

(هـ) فصل دراسي به ٢٥ بنت ، ٢٠ ولد فإذا اخترت تلميذ بطريقة عشوائية فاحتمال

أن يكون الطالب المختار بنت هو .....  
( $\frac{٣}{٩}$  أ  $\frac{٤}{٩}$  أ  $\frac{٥}{٩}$  أ ٢٠)

الإجابة

$$(أ) ١٢ ± (ب) ١٠ (ج) ٥$$

$$(د) ٢ = \frac{١}{٢} + \frac{١}{٢} + ١ (هـ) \frac{٥}{٩} = \frac{٢٥}{٤٥}$$

١٢ أكمل ما يأتي :

(أ) إذا كان المقدار :  $٩ - ٢ل + ١٢$  مربعاً كاملاً فإن : ل = .....

(ب) مجموعة حل المعادلة :  $٩ - ٢س =$  صفر : في ع هي .....

(ج) إذا كان :  $٢س = ٣$  فإن :  $٨س =$  .....

(د) إذا كان :  $\left(\frac{٢}{٣}\right)^س = ١$  فإن : س = .....

(هـ) إذا كان :  $(س + ص) = ٤$ ،  $(س - ص) = ٧$  فإن :  $س + ص =$  .....

الإجابة

$$(أ) ١٦ (ب) \{٣ - ٦\} (ج) ١٢$$

$$(د) صفر (هـ) ٢٨ = ٧ \times ٤$$



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني الأعداد (٧) من ترى توجيه الرياضيات ٢ / عاقل اوول

١٣ حل كلاً مما يأتي :

(أ)  $س^2 + ٢س - ١٥$  (ب)  $٢٥ - س^٢$

(ج)  $س^٢ + ٢٧$  (د)  $س^٢ + ٣س + ١$

(هـ)  $اس + اص + ب + س + ب + ص$

الإجابة

(أ)  $(س + ٥)(س - ٣)$

(ب)  $(س^٢ - ٥)(س^٢ + ٥)$

(ج)  $(س + ٣)(س^٢ - ٣س + ٩)$

(د)  $(س + ١)(س^٢ + ١)$

(هـ)  $ا(س + ص) + ب(س + ص)$

$(س + ص)(ب + ا) =$

١٤ (أ) أوجد مجموعة حل المعادلة :

$(س + ٢) = صفر$  في ع

(ب) اختصر إلى أبسط صورة :  $\frac{س^٥ \times ١ + س^٥}{س^٢}$

الإجابة

(أ)  $ع.م = \{ -٢ \}$  (ب)  $٥س^٢ + س - ١ = ٥$

١٥ (أولاً) : اختصر لأبسط صورة :  $\frac{٥ - (\sqrt{٣٧}) \times (\sqrt{٣٧})}{٢(\sqrt{٣٧})}$

(ثانياً) : يلعب أحد الأندية ٣٠ مباراة بالدوري العام ، فإذا كان

احتمال تعادله ٠,٣ احتمال فوزه هو ٠,٦ :

(أ) أوجد عدد المباريات التي يتعادل فيها .

(ب) أوجد عدد المباريات التي يمكن أن يخسرها .

الإجابة

(أولاً)  $١ = صفر (\sqrt{٣٧}) = \sqrt{٣٧} - \sqrt{٣٧}$

(ثانياً) (أ) عدد مباريات التعادل =  $٣٠ \times ٠,٣ = ٩$  مباريات

$٩ =$  مباريات

(ب) عدد المباريات التي يخسرها =  $٣٠ \times ٠,١ = ٣$  مباريات

$٣ =$  مباريات



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) (٨) منتهى توجيه الرياضيات ٢ / عاقل اولاد

١٦ اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين :

(أ)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ب)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ج)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (د)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$

(أ)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ب)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ج)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (د)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$

(أ)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ب)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ج)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (د)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$

(أ)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ب)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ج)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (د)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$

(أ)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ب)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ج)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (د)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$

(أ)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ب)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ج)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (د)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$

(أ)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ب)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ج)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (د)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$

الإجابة

(أ)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ب)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ج)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (د)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$

(أ)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ب)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (ج)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$  (د)  $1 \times 1 = \dots\dots\dots$

١٧ أكمل ما يأتي :

(أ) إذا كان :  $(3 - س) (3 + س) = س^2 + ١$  فإن :  $\dots\dots\dots$

(ب) مجموعة حل المعادلة :  $س^2 - ٥س = ٥$  صفر في ع هي  $\dots\dots\dots$

(ج) ألقى حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن : احتمال ظهور عدد زوجي

أولى على الوجه العلوي هو  $\dots\dots\dots$

(د) إذا كان :  $٢٧ = س^٣$  ،  $١ = س + ص$  فإن :  $\dots\dots\dots$

(هـ) إذا كان :  $س = \sqrt[٣]{٢٧}$  ،  $ص = \sqrt[٣]{٢٧}$  فإن :  $س^٢ - ص^٢ = \dots\dots\dots$

الإجابة

(أ)  $٩ - = ١$

(ب)  $س : (س - ٥) = صفر$  . م . ع =  $\{٥, ٠\}$

(ج)  $\frac{١}{٢}$

(د)  $س = ٣$  ،  $١ = س + ص$  فإن :  $ص = ٣ -$

(هـ)  $\left(\frac{ص}{س}\right)^٢ = \left(\frac{\sqrt[٣]{٢٧}}{\sqrt[٣]{٢٧}}\right)^٢ = \frac{٢}{٣}$



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) (٩) من ترى توجيه الرياضيات ٢ / عاين اوور

١٨

حلل كلاً مما يأتي تحليلًا كاملاً :

(أ)  $س^2 + ٨س + ١٥$  (ب)  $٩س^2 - ٢٥$   
(ج)  $١٧ - س + ٣س - ٢١$  (د)  $١ - س^3$

الإجابة

(أ)  $(س + ٥)(س + ٣)$   
(ب)  $(س^2 - ٥)(س^2 + ٥)$   
(ج)  $(٧ - س)(٣ + س)$   
(د)  $(١ - س)(١ + س + س^2)$

١٩

(أ) أوجد مجموعة الحل للمعادلة الآتية في ح :

$س^2 - ٩س + ٢٠ = \text{صفر}$

(ب) إذا كان :  $٣\sqrt{ب} = ١$  و  $٢\sqrt{ب} = ١$  ، فإن :  $\frac{١}{ب}$

الإجابة

(أ)  $(س - ٤)(س - ٥) = \text{صفر}$

$\therefore م.ع = \{٤, ٥\}$

(ب)  $\frac{٩}{٤} = \left(\frac{\sqrt[٣]{٧}}{\sqrt[٣]{٢}}\right)^٤ = \left(\frac{١}{ب}\right)^٤$

(٢٠) (أولاً) مجموعة من البطاقات مرقمة من ١ إلى ١٠ خلطت جيداً ،

فإذا سحبت منها بطاقة واحدة عشوائياً اكتب فضاء العينة  
ثم احسب احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تحمل عدداً

يقبل القسمة على : (أ) ٤ (ب) ٢٠

(ثانياً) : إذا كان :  $\left(\frac{٤}{٥}\right)^س = \frac{١٢٥}{٦٤}$  فأوجد قيمة س

الإجابة

(أولاً) ف  $\{١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩, ١٠\}$

(أ)  $\frac{١}{٥} = \frac{٢}{١٠}$  (ب) صفر

(ثانياً)  $\therefore \left(\frac{٤}{٥}\right)^س = \left(\frac{٤}{٥}\right)^٣ \therefore س = ٣$



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) (١٠) منتري توجيه الرياضيات ٢ / عاون اوول

٢١) أكمل ما يأتي :

(أ)  $6س^2 - 11س - 10 = (س^2 - .....)(..... + 2)$

(ب)  $27م^3 = (.....)^3$

(ج) احتمال الحدث المؤكد = .....

(د) إذا كان :  $س^2 - ص^2 = 16$  ،  $س + ص = 8$  ،

فإن :  $س - ص = .....$

(هـ)  $(\sqrt{2}) \times (\sqrt{3})$  في أبسط صورة = .....

الإجابة

(أ)  $(س^2 - 5)(س + 2)$  (ب)  $(3م)^3$

(ج) ١ (د) ٢ (هـ)  $6 = (\sqrt{6})^2$

٢٢) أكمل ما يأتي :

(أ) إذا كان : أحد عاملي المقدار  $(س^2 - 7س + 10)$

هو  $(س - 5)$  فإن : العامل الآخر هو .....

(ب) إذا كان :  $2س^3 = 3س^3$  فإن :  $8س^3 = .....$

(ج) مجموعة حل المعادلة :  $س^2 + 1 = 0$  صفر في ع هي .....

(د)  $(5)^{-2} = .....$

(هـ) إذا كان :  $س - ص = 2$  ،  $س + ص = 4$  فإن :  $س^2 - ص^2 = .....$

الإجابة

(أ)  $(س - 2)(س - 5)$  (ب) ٢٧ (ج)  $\emptyset$

(د)  $\frac{1}{125}$  (هـ)  $8 = 4 \times 2 = 2س^2 - 2ص^2$



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) ( ١ ١ ) منتمى توجيه الرياضيات ٢ / عاون اوول

٢٣ حل تحليلًا كاملاً :

(أ)  $3س^2 - 27$  (ب)  $س^2 - 5س + 6$

(ج)  $س^2 + 8$  (د)  $س^2 + 3س + 5ص + 15$

الإجابة

(أ)  $3(س - 3)(س + 3)$

(ب)  $(س - 2)(س - 3)$

(ج)  $(س + 2)(س^2 - 2س + 4)$

(د)  $(س + 3)(س + 5)$

الإجابة

(أ)  $\{3, 6, 5\} = م.ع$

(ب)  $3 = 3 - 1س \therefore 3 = 1س \therefore 4 = س$

٢٥

(أولاً) : أوجد : قيمة س حيث  $32 = 2س^3$

(ثانياً) : مجموعة بطاقات مرقمة من ١ إلى ٨ فإذا سحبت منها

بطاقة واحدة عشوائية ،

أوجد احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تحمل عدداً :

(أ) يقبل القسمة على ٤ (ب) أقل من ٦

الإجابة

(أولاً)  $س = 5$

(ثانياً) (أ)  $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$

(ب)  $\frac{5}{8}$

٢٤

(أ) أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية

فى ع :  $س^2 - 8س + 15 = \text{صفر}$

(ب) أوجد قيمة س إذا كان :  $3 = 3 - 1س \therefore 27 =$



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) (١٢) منتمى توجيه الرياضيات ٢ / عاون لودار

٣٦ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(أ)  $3^{-2} = \dots\dots\dots$   $(-9 - 9 \frac{1}{9} - 9 \frac{1}{9} - 1)$

(ب) إذا ألقى حجر نرد مرة واحدة فإن : احتمال ظهور العدد ٧ =  $\dots\dots\dots$

(ج) إذا كان :  $s^2 + s + 25$  مربعًا كاملاً فإن :  $s = \dots\dots\dots$  (صفر أو  $\frac{1}{7}$  أو  $\frac{1}{6}$  أو ١)

(د) إذا كان :  $s^2 + s + 25$  مربعًا كاملاً فإن :  $s = \dots\dots\dots$

(هـ) إذا كان :  $(\frac{5}{3})^s = \frac{27}{125}$  فإن :  $s = \dots\dots\dots$  (٥ أو  $10 \pm 10 \pm 5$  أو ٥)

(و) إذا كان :  $(\frac{5}{3})^s = \frac{27}{125}$  فإن :  $s = \dots\dots\dots$  (٥ أو  $3 - 3 - 3$  أو ٥)

(ز) مجموعة حل المعادلة :  $s^2 + 4 = 0$  صفر فى ع هى  $\dots\dots\dots$

(ح)  $\emptyset$  أو  $2 \pm 2$  أو  $2 - 4$

الإجابة

(أ)  $\frac{1}{9}$  (ب) صفر (ج)  $10 \pm$

(د)  $3 -$  (هـ)  $\emptyset$

٣٧

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(أ) إذا كان :  $s^2 + s - 15 = (s + 5)(s - 3)$  فإن :

$(2 - 2 - 8 - 8)$   $\dots\dots\dots =$

(ب)  $(3)^{-1} = \dots\dots\dots$   $(-3 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} - 3)$

(ج) المقدار :  $s^4 + 12s + 16$  مربع كامل عندما :  $s = \dots\dots\dots$

$(6 - 9 - 16 - 16)$

(د) مجموعة حل المعادلة :  $(s - 3)(s + 1) = 0$  صفر فى ع هى  $\dots\dots\dots$

$(\{1, 3\} \cup \{3, -\} \cup \{1, -\} \cup \{-, 3\})$

(هـ)  $(3 + \sqrt{2}) \times (3 + \sqrt{2}) = \dots\dots\dots$  (صفر أو ١٨ أو ١ أو ٥)

الإجابة

(أ) ٢ (ب)  $\frac{1}{3}$  (ج) ٩

(د)  $\{1, 3\}$  (هـ) ١



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) (٣ ١) منتري توجيه الرياضيات ٢ / عاقل اودار

٢٨ حل كلاً مما يأتي تحليلًا كاملاً :

(١)  $٢س^٢ + ٧س + ٥$  (ب)  $١ - س^٢$

(ج)  $اس + ب + س + ا + ص + ب + ص$

الإجابة

(١)  $(١ + س)(٥ + ٢س)$

(ب)  $(١ - س)(١ + س^٢)$

(ج)  $س(ب + ا + ص) + (ب + ا + ص)$

$= (ب + ا + ص)(س + ١)$

٢٩ (١) اختصر إلى أبسط صورة :

$$\frac{٢س \times ٩س + ١}{١٨س}$$

(ب) إذا كان :  $٢س - ٥ = ٨$  فما قيمة هـ

الإجابة

(١)  $٢(س - س) \times ٣س^٢ - ٢ + س^٢ = ٣س^٢ - ٢ + س^٢ = ٩$

(ب)  $٦ = ٥$

٣٠ (١) اختصر لأبسط صورة :

$$\frac{١(٣\sqrt{٢}) \times ٧(٣\sqrt{٢})}{١(٣\sqrt{٢})}$$

(ب) إذا كان :  $\sqrt{٢} = ا$  ،  $\sqrt{٢} = ب$  فأوجد قيمة :  $١ - ب$

الإجابة

(١)  $\sqrt{٢} \times ١ = ١(٣\sqrt{٢}) = ٣\sqrt{٢} = ٦ - ١٥$

(ب)  $٥ = ٤ - ٩ = ٤(٢\sqrt{٢}) - ٤(٣\sqrt{٢})$



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) (٤ ١) منتمى توجيه الرياضيات ٢ / عاقل اولار

٣١ اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:

(أ) إذا كان:  $٤س^٢ + كس + ٢٥$  مقدار ثلاثى مربع كامل فإن:

ك = .....  
(١٠ أ، ١٠ - أ، ٢٠ ± أ، ٣٠ أ)

(ب) احتمال نجاح طالب ٧٥٪ واحتمال رسوبه = .....

(٣٥٪ أ، ١٤٪ أ، ١٥٪ أ، ١٠٪ أ)

(ج) إذا كان:  $٧ = ١ - س$  فإن:  $٧ = ١ - س$  = .....

(د) إذا كان:  $٢ - ٥ = ٣ - ٥$  فإن:  $١ - ٥ = ٢ - ٥$  = .....

(هـ) مجموعة حل المعادلة:  $٤ + س = ٤$  = صفر فى ع هى .....

(٠ أ، {٢} أ، {٢ -} أ، {٤} أ)

الإجابة

(أ)  $٢٠ \pm$  (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{1}{7}$

(د) ١ (هـ)  $\emptyset$

٣٢ أكمل ما يأتى:

(أ)  $٣س^٢ + ٧س - ٦ = (٣س - .....)(..... + .....)$

(ب) إذا كان: أحد عاملى المقدار:  $٣س^٢ + س - ٦$  هو (٣ + س)

فإن: العامل الآخر هو .....

(ج)  $(\sqrt{2})^٢ \times (\sqrt{2})^٤ = .....$

(د)  $٢٧م^٣ = (.....)^٣$

(هـ) إذا كان: احتمال نجاح طالب فى إحدى المواد الدراسية ٨، ٠،

فإن: احتمال رسوبه فيها .....

الإجابة

(أ)  $(٣س - ٢)(٣س + ٢)$

(ب)  $(٢س - ٢)$  (ج)  $٨ = (\sqrt{2})^٦$

(د)  $(٣م)^٣$  (هـ) ٠، ٢



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني الأعداد (١٥) منتمى توجيه الرياضيات ٢ / عاون اوول

الإجابة

$$(١) \therefore (س - ٣) (س + ٢) = صفر$$

$$\therefore م.ع = \{٣ - ٢\}$$

$$(ب) \therefore (س - ٣) = (س - ٣) \therefore س = ٦$$

٣٣ حل كلاً مما يأتى تحليلًا كاملاً :

$$(١) س^٢ - ٤ (ب) س^٣ + ٨$$

$$(ج) ١ س + س + س + ١ ص$$

الإجابة

$$(١) (س - ٢) (س + ٢)$$

$$(ب) (س + ٢) (س^٢ - ٢س + ٤)$$

$$(ج) س (س + ١) + ص (س + ١)$$

$$= (س + ١) (س + ص)$$

٣٥

(أولاً) : أوجد مجموعة حل المعادلة  $س (س + ٣) = ٤$  فى ع

(ثانياً) : صندوق به ١٥ كرة متماثلة ومرفقة من ١ إلى ١٥ سحبت كرة عشوائية

أوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة مكتوب عليها عدد :

(١) أولى . (ب) يقبل القسمة على ٥

الإجابة

$$(أولاً) م.ع = \{١ - ٤\}$$

$$(ثانياً) (١) \frac{٦}{١٥} = \frac{٢}{٥} (ب) \frac{٣}{١٥} = \frac{١}{٥}$$

٣٤ (١) أوجد مجموعة حل المعادلة :

$$س^٢ - س - ٦ = صفر$$

(ب) أوجد قيمة س حيث  $(س - ٣) = ٩$



المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني / الجبر والاحصاء / الثاني (الأعداد) (١٦) منتمى توجيه الرياضيات ٢ / عاقل اوار

٣٦ اختر الإجابة الصحيحة :

(أ) إذا كان :  $٣س + ٣س + ٣س = ١$  فإن : س = .....

( صفر أ ١ أ ١ أ ٣ )

(ب) إذا كان : المقدار : ( س<sup>٢</sup> + ك س + ٣ ) قابلاً للتحليل فإن :

( ١ أ ٢ أ ٣ أ ٤ )

ك = .....

(ج)  $(٣\sqrt{٢} + \sqrt{٢})(٣\sqrt{٢} - \sqrt{٢}) = \dots$  ( ١ أ ٥ أ ٦ أ ٦ )

(د) إذا كان : المقدار ( س<sup>٢</sup> + ٤ س + ك ) مربعاً كاملاً فإن : ك = .....

( ٣ أ ٤ أ ٨ أ ١٦ )

(هـ) فصل دراسى فيه ١٥ ولدًا ، ٢٠ بنتًا فإذا تغيب أحد التلاميذ فإن :

احتمال أن يكون الغائب ولدًا =  $(\frac{٢}{٧} أ \frac{٣}{٧} أ \frac{٤}{٧} أ \frac{٥}{٧})$  .....

الإجابة

(أ)  $٣س + ٣س = ١$  فإن : س = ١ -

(ب) ٤

(ج) ١

(د) ٤

٣٧ أكمل :

(أ) إذا كان :  $٧ = ب + ا$  ،  $٣ = ب - ا$  فإن :

$٢ب - ٢ا = \dots$

(ب) إذا كان :  $٣ = ٢هـ$  ،  $٥ = ٢هـ$  فإن :  $٢هـ + هـ = \dots$

(ج) إذا كان :  $(\frac{٣}{٥})س = \frac{٥}{٣}$  فإن : س = .....

(د) احتمال الحدث المستحيل هو .....

(هـ) إذا كان :  $٢س = ٣$  فإن :  $٨س = \dots$

الإجابة

(أ) ١ -

(ب) ١٥

(ج) ٢١

(د) ٢٧

(هـ) صفر



٣٨ (أولاً) : حل كل من المقادير الآتية :

(۱) اس + ب + س + ا + ص + ب + ص      (ب) س + ۸

(ثانيًا): استخدم التحليل لتسهيل حساب قيمة:  $(77)^2 - (23)^2$

## الإجابة

(أولاً) (ا) س (ا + ب) + ص (ا + ب)

$$(ص + س)(ب + ا) =$$

(ب)  $(s + 2)(s^2 - 2s + 4)$

(ثانيًا)  $(23 - 77)(23 + 77)$

$$0.5 \times 100 = 50 \times 100 =$$

$$\frac{{}^2(\sqrt{3}) \times {}^0(\sqrt{3})}{{}^4(\sqrt{3})} : \text{اختصر} \quad (39)$$

(ب) أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية حيث  $s \in \mathbb{C}$

صفر :  $س ۲ - ۷ س + ۱۲ =$

# الإجابة

$$q = {}^{\xi}(\sqrt[3]{r}) < 1$$

$$\{٤٦٣\} = \text{ع. م (ب)}$$

٤٠ (أولاً) : اختصر لأبسط صورة :  $\frac{5 \times 3}{10}$

(ثانيًا): سلة بها كرات مرقمة من ١ إلى ١٥ سحب كرة عشوائيًا فما احتمال

أن تكون الكرة المسحوبة : (١) تحمل عددًا يقبل القسمة على ٣

(ب) تحمل عددًا أوليًا .

الإجابة

(أولاً) (١٥) س-س = ١٥ = ١ =

$$\frac{2}{5} = \frac{6}{15} \text{ (ج) } \quad \frac{1}{3} = \frac{5}{15} \text{ (ثانيًا)}$$



## مراجعة الجبر

س١ اختار الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطاة :-

- (١) إذا كانت  $s^2 + k s + 25$  مربعاً كاملاً فإن  $k =$  .....  
 (أ) ٥ (ب) ١٠ (ج)  $\pm 10$  (د)  $\pm 5$
- (٢) إذا كان  $s^2 - 3s + p = 0$  فإن  $p =$  .....  
 (أ) ٣ (ب) -٣ (ج) ٩ (د) -٩
- (٣) إذا كان  $s^2 = 5$  فإن  $s^4 =$  .....  
 (أ) ٥ (ب) ١٠ (ج) ٢٥ (د) ١٢٥
- (٤) مجموعة حل المعادلة  $s(s - 3) = 0$  في ح هي .....  
 (أ)  $\{0\}$  (ب)  $\{3\}$  (ج)  $\{0, 3\}$  (د)  $\{0, -3\}$
- (٥) إذا كان  $s^2 + 5s + 1 = 0$  فإن  $s =$  .....  
 (أ) ١ (ب) -٢ (ج) ٢ (د) ٥
- (٦) إذا كان  $\left(\frac{3}{5}\right)^m = \frac{25}{9}$  فإن  $s =$  .....  
 (أ) ٢ (ب) -٢ (ج) ١ (د) صفر
- (٧) إذا كان  $s + 2 = 3$  ،  $s^2 - 4s + 21 = 0$  فإن  $s - 2 =$  .....  
 (أ) ١٤ (ب) ٩ (ج) ٧ (د) ٦
- (٨) إذا كان  $s^2 + 11s + 1 = 0$  ،  $s = 5$  فإن  $s - 5 =$  .....  
 (أ) ٦ (ب) ١٦ (ج)  $\pm 1$  (د) ١
- (٩) مجموعة حل المعادلة  $s^2 + 9 = 0$  صفر في ح هي .....  
 (أ)  $\{9\}$  (ب)  $\{3, -3\}$  (ج)  $\{\text{صفر}\}$  (د)  $\emptyset$
- (١٠) ..... =  $4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2$  (أ) ٣٤ (ب) ٤٤ (ج) ١٦ (د) ١٦
- (١١) إذا كان  $(s-7)^2 = 1$  فإن  $s \exists$  .....  
 (أ)  $\{7\}$  (ب) ح (ج)  $\{7\}$  (د) ح
- (١٢) إذا كان المقدار  $s^2 - 1 = 0$  فإن  $s^2 =$  .....  
 (أ) ٣٢ (ب) ١٦ (ج) ٨ (د) ٤



## ليلة الامتحان في الرياضيات (جبر - هندسة) الصف الثاني (الأعدادى ترم ثان) (٢)

(١٣) إذا كان  $٧ = ٣٦$  فإن  $٧ + ٣٦ =$  ..... (أ) ٨ (ب) ١٣ (ج) ٣٦ (د) ٤٢

(١٤) إذا كان المقدار  $٣س + ٢$  م يمكن أن تساوي .....  
 (أ) ١٢ (ب) ٨- (ج) ٨ (د) ١-

(١٥) إذا كان  $٨ - ٣س = (٣س + ٢ + ٤) (٣س + ٢) = ٨$  فإن  $٣س =$  .....  
 (أ) ٤ (ب) ٤- (ج) ٢ (د) ٢-

(١٦) إذا كان  $٣ = \frac{١}{س} + ٣$  فإن  $\frac{١}{س} + ٣ =$  .....  
 (أ) ٩ (ب) ١١ (ج) ٧ (د) ١

(١٧) مجموعة حل المعادلة  $٢س = ٢$  في ح هي .....  
 (أ)  $\{ ٠ \}$  (ب)  $\{ ٢, ٠ \}$  (ج)  $\{ ٢, ٠ \}$  (د)  $\{ ٢ \}$

(١٨) إذا كان أحد عاملي المقدار  $٣س + ٦$  هو  $٣ + ٦$  فإن العامل الآخر هو .....  
 (أ)  $٢س$  (ب)  $٣س$  (ج)  $٢س + ٢$  (د)  $٦س + ٦$

(١٩) إذا كان  $٨ = \frac{٣٠}{س}$  فإن  $\frac{٣٠}{س} =$  ..... (أ) ٢ (ب) ٢- (ج)  $\frac{١}{٢}$  (د)  $\frac{١}{٢}$

(٢٠) مجموعة حل المعادلة  $١٦ - ٢س = ٠$  في ح هي .....  
 (أ)  $\{ ٤ \}$  (ب)  $\{ ٤- \}$  (ج)  $\{ ٤, ٤- \}$  (د)  $\emptyset$

\*\*\*\*\*

**٢. أكمل ما يأتي :-**

(١) مجموعة حل المعادلة  $٩ + ٣س = ٩$  صفر في ح هي .....

(٢) إذا كان  $٨ = ٣س$  ،  $٣ = ٣س + ٣$  فإن  $٣س =$  .....

(٣) إذا كان  $٢س + ٣ = ٢س + ٣$  ،  $٨ = ٢س + ٣$  فإن  $٢س + ٣ =$  .....

(٤) قيمة م التي تجعل المقدار  $٣س + ١٢$  م مربعاً كاملاً هي .....

(٥) إذا كانت  $٧ + ٣س = ٧ + ٣س$  فإن  $٣س =$  .....

(٦) إذا كان  $٤ = ٣س + ٢$  ،  $٢ = ٣س - ٢$  فإن  $٣س - ٢ =$  .....

(٧) إذا كان  $(٥ - ٣س) = ٥$  صفر فإن مجموعة حل المعادلة في ح هي .....

(٨) مجموعة حل المعادلة  $(٢س + ٥) = ٥$  صفر في ح هي .....

(٩) يمكن تحليل المقدار  $٦٤ + ٢س$  بإضافة الحد ..... ومعكوسة الجمعي .....



## ليلة الامتحان في الرياضيات (جبر - هندسة) الصف الثاني (الأعداد) ترم ثان (٣)

(١٠) إذا كان (س - ٥) هو أحد عوامل المقدار س<sup>٢</sup> - ١٠س + ٢٥ فإن العامل الآخر هو .....

(١١) ..... = ٣ ÷ ١٢ - ٦ × ٢

(١٢) إذا كان س + ص = ٧ ، ب - ب = ٤ فإن ب (س + ص) - ب (س + ص) = .....

(١٣) ربع العدد ٢<sup>٨</sup> = .....

(١٤) ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٢ ، ..... بنفس التسلسل

(١٥) س<sup>٥</sup> × س<sup>٢</sup> = .....

\*\*\*\*\*

### س٣ أسئلة مقالية

س١ حل كلا مما يأتي تحليلًا تامًا :-

<p>(٢) ب + س + ب + س + ٥ + ٥ ب الحل (ب + س + ب + س) + (٥ + ٥ ب) س (ب + ب) + (٥ + ٥ ب) (ب + ب) (س + ٥)</p>	<p>(١) ١٦ س<sup>٢</sup> - ٩ الحل (٣ - س) (٣ + س) (٤ - س)</p>
<p>(٤) ٤ + س<sup>٤</sup> الحل (٢ + س<sup>٢</sup>) (٢ - س<sup>٢</sup>) (س<sup>٢</sup> + ٢ + ٢ + س<sup>٢</sup>) (س<sup>٢</sup> - ٢ - ٢ + س<sup>٢</sup>)</p>	<p>(٣) ٣ س<sup>٢</sup> + ٧ س - ٦ الحل (٣ - س) (٢ - س) (٣ + س)</p>
<p>(٦) ١٢٥ + ٨ س<sup>٢</sup> الحل (٥ + س) (٥ - س) (٥ + س) (٥ - س)</p>	<p>(٥) ١ + ص + ص<sup>٢</sup> + ص<sup>٣</sup> الحل (١ + ص) (١ + ص + ص<sup>٢</sup>) ص<sup>٣</sup> (١ + ص) + (١ + ص) (١ + ص) (١ + ص<sup>٣</sup>)</p>
<p>(٨) ٣٥ + س + ص + ٧ + س + ٣٥ (٩) ٨ - س<sup>٢</sup> (١٠) ١٦ + ص<sup>٤</sup> + ٧ س<sup>٢</sup> + ص<sup>٢</sup> (١١) ١٣ + س<sup>٢</sup> - ٣٠ (١٢) ٤ + س<sup>٤</sup> (اجب بنفسك)</p>	<p>(٧) ٤٩ - س<sup>٢</sup> الحل (٧ - س) (٧ + س)</p>



## ليلة الامتحان في الرياضيات (جبر - هندسة) الصف الثاني (الأعداد) ترم ثان (٤)

س٢ أوجد مجموعة الحل لكلا من المعادلات الآتية في ح

<p>(١) <math>س^1 - ٦س + ٨ = \text{صفر}</math>  الحل (س - ٤) (س - ٢) = صفر  س - ٤ = صفر      س = ٤  س - ٢ = صفر      س = ٢  م. ح = { ٢ ، ٤ }</p>	<p>(٢) <math>س(س + ٦) = ١٦</math>  الحل <math>س^1 + ٦س - ١٦ = \text{صفر}</math>  <math>س(س + ٨) (س - ٢) = \text{صفر}</math>  س + ٨ = صفر      س = -٨  س - ٢ = صفر      س = ٢  م. ح = { -٨ ، ٢ }</p>
<p>(٣) <math>س^3 - س - ١٠ = \text{صفر}</math>  الحل (س + ٥) (س - ٢) = صفر  س + ٥ = صفر      س = -٥  س - ٢ = صفر      س = ٢  م. ح = { -٥ ، ٢ }</p>	<p>(٤) <math>س(س - ٢) - ٣(س - ٢) = \text{صفر}</math>  <math>س(س - ٢) + (س - ٢) = \text{صفر}</math>  <math>(س - ٢)(س + ٣) = ٠</math>  س - ٢ = ٠      س = ٢  س + ٣ = ٠      س = -٣  م. ح = { -٣ ، ٢ }</p> <p>(٥) <math>س^1 - ١٢س = ٣٢</math>  (٦) <math>س^1 - ٨س + ١٥ = \text{صفر}</math>  اجب بنفسك</p>

س٣ اختصر لابسطة صورة كلا مما يأتي :-

$$(١) \quad ٢ = \frac{١+س٢ \times س٣}{س٢ \times س٣} = \frac{١+س٢ \times س٣}{س٦}$$

$$(٢) \quad ٩ = ٣^٢ = \frac{١+س٣ \times ١+س٣ \times س٢ \times س٢}{س٢ \times س٣ \times س٢} = \frac{١+س٩ \times س٤}{س٢٦}$$

$$(٣) \quad ١ = \text{صفر} \quad ٣ = \frac{١+س٣ \times ١+س٣ \times ٢-س٣}{س٣ \times س٣ \times س٣} = \frac{١+س٩ \times ٢-س٣}{س٢٧}$$

\*\*\*\*\*

س٤ إذا كان  $٢٧ = ٣^{٢-س}$  أوجد قيمة س

الحل —  $٢٣ = ٣^{٢-س}$        $٢ = ٣ - س$        $٣ = س$



## ليلة الامتحان في الرياضيات (جبر - هندسة) الصف الثاني (الأعداد) ترم ثان (٥)

$$\text{س ٥ إذا كان } 64 = \frac{9 \times 8}{18} \text{ أوجد قيمة س}^{-}$$

الحل \_\_\_\_\_

$$64 = 64 = 2^2 = \frac{3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2}{3 \times 3 \times 2} = \frac{9 \times 8}{18}$$

$$\frac{1}{81} = \frac{1}{27} = 3^{-3} = \text{س}^{-} \quad \text{س} = 3 \quad \text{س} = 2$$

\*\*\*\*\*

اجب بنفسك

(١) إذا كان  $\frac{1}{4} = 3^{-n}$  أوجد قيمة ن

(٢) إذا كان  $27 = 3^3$  ،  $4 = 3 + \text{س}$  ، فأوجد قيمتي س ، ص

(٣) إذا كان س = ٩ ، ص =  $\sqrt{3}$  فأوجد في أبسط صورة قيمة  $\text{س}^2 \text{ص}^3$

(٤) إذا كان  $64 = \frac{9 \times 8}{18}$  أوجد قيمة  $\text{س}^{-}$

(٥) إذا كان س = ٢ ، ص =  $\sqrt{2}$  فأوجد في أبسط صورة قيمة المقدار  $\left(\frac{\text{ص}}{\text{س}}\right)^{-}$

(٦) احسب قيمة  $\frac{2(51) \times 7(51)}{2(51) \times 9(51)}$

(٧) احسب قيمة  $\frac{4(21) \times 2(31)}{5(21) \times (31)}$

(٨) أوجد قيمة س إذا كان  $9 = 3^{-\text{س}}$  (  $\sqrt{3}$  )





## الجزء الأول

(١) أكمل :

$$(١ - أ) (٢ - أ٢) = (٣ - أ٢) - ..... + أ٧ - ..... =$$

$$(٢) (س + ..... ) (٣ - س٢) = ..... + ..... - ١٥ =$$

$$(٣) (س + ..... ) (٢ - س٣) = ..... + ..... - ١٠ =$$

$$(٤) (س٢ + س٣ + ..... ) (ص٢ + ..... ) = ..... + ..... + س٢ =$$

$$(٥) (أ٢ + ..... ) (ب٣ + ..... ) = (أ٢ + ..... + ب٣) =$$

$$(٦) (أ٣ + ..... ) (أ٢ + ..... ) = ٢ + أ٧ + أ٣ =$$

$$(٧) (..... ) (س٢ - ٣) = ١٢ - س٥ + س٢ = (..... )$$

$$(٨) س٣ - ..... = (س - ..... ) (٤ + ..... + ..... ) =$$

$$(٩) (س - ص) = س٤ + ..... = (..... + ..... )$$

$$(١٠) (..... - أ٥) = ..... - أ٣٠ + ..... =$$

$$(١١) (س٧ - ص٥) (..... - ..... ) = ..... - ..... + س٢٥ =$$

$$(١٢) (..... + ..... ) (س - ص) = ..... - ..... - س١١ =$$

$$(١٣) (..... + ٣) (..... - ٣) = ..... - س٤٩ =$$

$$(١٤) (..... - س٣) = س٣ - ..... =$$

$$(١٥) (..... + ..... + ..... ) (ب - ..... ) = ..... - ..... =$$

$$(١٦) (..... - ..... ) = ..... + ..... - ..... =$$





(١٧) مجموع قيم أ التي تجعل المقدار :  $s^2 + s - 15$  قابلاً للتحليل هي .....

(١٨) المقدار  $s^4 - 12s + ك$  يكون مربعاً كاملاً عندما  $ك = .....$

(١٩) إذا كان  $s^2 + 21s + ك$  مربعاً كاملاً فإن ك تساوى .....

(٢٠) المقدار :  $s^9 - 30s + أ$  يكون مربعاً كاملاً عندما  $أ = .....$

(٢١) إذا كان  $s^2 - ص = 35$  ،  $س - ص = 5$  فإن  $س + ص = .....$

(٢٢) إذا كان المقدار :  $s^2 + s - 15$  قابلاً للتحليل فإن قيم أ السالبة = .....

(٢٣) إذا كان  $أ^2 + ب^2 + ٧$  ،  $أب = 3$  فإن  $(أ - ب)^2 = .....$

(٢٤) المقدار :  $25s^2 + 10s + م$  يكون مربعاً كاملاً عندما  $م = .....$

(٢٥) إذا كان  $s^2 - ك + 10 = (س - 3)(س + 3)$  فإن ك = .....

(٢٦) إذا كان المقدار :  $s^2 + م + 16$  مربعاً كاملاً فإن م = .....

(٢٧) إذا كان :  $s^2 + ك + 17 = (س - 5)(س + 5)$  فإن ك = .....

(٢٨) إذا كان  $س + \frac{1}{س} = 5$  فإن  $s^2 + \frac{1}{s^2} = .....$  حيث  $س \neq 0$

(٢٩) مربع محيطه  $2س$  سم فإن مساحته تساوى .....

(٣٠) إذا كان  $(س - 3)$  أحد عاملي المقدار  $s^2 + 2س - 15$  فإن العامل الآخر هو .....

(٣١) إذا كان  $(4 - )$  أحد جذري المعادلة  $s^2 + 3س - 4 = 0$  فإن الجذر الآخر هو .....

(٣٢) مجموعة حل المعادلة  $s^2 + 4 = 0$  هي .....

(٣٣) مجموعة حل المعادلة  $s^2 - 1 = 0$  هي .....

(٣٤) أبسط صورة للمقدار الجبري  $س(ع - ص) + ل(ص - ع)$  هي .....

(٣٥) إذا كان عُمر كامل الآن س سنة فإن عُمره بعد خمس سنوات من الآن هو .....





(٣٦) إذا كان  $(س + ص) - ب = ١٥$  وكان  $(س + ص) = ٥$  فإن  $أ - ب = \dots$

(٣٧)  $(س + ٥)$  أحد عاملى المقدار  $س^٢ + ١٢س + ٥٠$  فإن العامل الآخر هو .....

(٣٨) إذا كان  $(س + ص)^٢ = ٤٢$  ،  $س^٢ + ص^٢ = ١٢$  فإن  $س ص = \dots$

**(٢) اختر الاجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :-**

(١) إذا كان  $س = ٢$  ،  $ص = ٥$  فإن  $س^٢ + ٢س ص + ص^٢$  تساوى : .....

(أ) ٥ (ب) ٧ (ج) ٩ (د) ٤٩

(٢)  $س^٢ - ٤ = \dots$

(أ)  $٤ - س^٢$  (ب)  $(س - ٢)^٢$

(ج)  $(س - ٢)(س + ٢)$  (د)  $(س - ٤)^٢$

(٣)  $(١ - أ)(١ + أ + أ^٢) = \dots$

(أ)  $١ - أ^٣$  (ب)  $١ + أ^٣$

(ج)  $(١ - أ)^٣$  (د)  $١ - أ^٣$

(٤) إذا كان  $س^٢ + ص^٢ = ٧$  ،  $س ص = ٣$  فإن  $(س - ص)^٢ = \dots$

(أ)  $١ - ١$  (ب) ١ (ج)  $١ \pm ١$  (د) ١٠

(٥) إذا كان  $١٦س^٢ + ٩س + ٩$  مربعاً كاملاً فإن  $ك = \dots$

(أ)  $٦ \pm ١$  (ب)  $١٢ \pm ١$  (ج)  $٢٤ \pm ١$  (د)  $١٤٤ \pm ١$

(٦) إذا كان  $س^٢ - ٦س + ٩$  مربعاً كاملاً فإن  $ك = \dots$

(أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٩ (د) ٣٦

(٧) إذا كان  $ك س^٢ - ١٢س + ٤$  مربعاً كاملاً فإن  $ك = \dots$

(أ)  $٦ - ٤$  (ب)  $٤ - ٢$  (ج)  $٢ - ٩$  (د) ٩

(٨) إذا كانت :  $(أ + ب)^٢ = ٤٣$  ،  $أ^٢ + ب^٢ = ٣٥$  فإن  $أ ب$  تساوى :

(أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ١٦ (د) ٧٨





٩) إذا كان المقدار :  $س^2 + ك س - ٢٤$  قابلاً للتحليل فإن  $ك$  لا يمكن أن تساوى .....

(أ) ٢- (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٥

١٠) إذا كان المقدار :  $س^2 + ك س + ٢$  قابلاً للتحليل فإن  $ك$  تساوى .....

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١١) إذا كان :  $س^2 - ص^2 = ١٢$  ،  $س - ص = ٣$  فإن  $س + ص$  تساوى :

(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ١٢ (د) ١٥

١٢) إذا كان :  $س^2 + ك س - ٦ = (س + ٣)(س - ٢)$  فإن  $ك$  تساوى :

(أ) ١- (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

١٣) المقدار :  $س^2 + ٨ س + ج$  يكون مربعاً كاملاً عندما  $ج$  تساوى :

(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ١٦ (د) ٦٤

١٤) إذا كان :  $(س + ص)^2 = ٢٤$  ،  $س ص = ٨$  فإن :  $س^2 + ص^2 =$  .....

(أ) ٨ (ب) ١٦ (ج) ٢٤ (د) ٣٢

١٥) إذا كان :  $س^2 + ك س - ٢١ = (س - ٣)(س + ٧)$  فإن  $ك$  تساوى :

(أ) ٤- (ب) ٤ (ج) ٨ (د) ٢٠

١٦) إذا كان :  $(س + ص)^2 = ١٠$  ،  $س^2 + ص^2 = ٤$  فإن  $س ص$  تساوى : .....

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٦ (د) ١٤

١٧) المقدار :  $(س^2 - ص^2)(س^2 + ٢ س ص + ٤ ص^2)$  يساوى :

(أ)  $س^3 - ٢ ص^3$  (ب)  $س^3 - ٨ ص^3$

(ج)  $س^3 + ٢ ص^3$  (د)  $س^3 + ٨ ص^3$

١٨) إذا كان  $٦٤ أ^٢ - ٣٢ أ + ك$  مربعاً كاملاً فإن  $ك$  تساوى :

(أ) ١ (ب) ٤ (ج) ١١ (د) ١٦

١٩) إذا كان  $س - ص = ٥$  ،  $س^2 + س ص + ص^2 = ٧$  فإن :  $س^3 - ص^3$  تساوى :

(أ) ٢ (ب) ٧ (ج) ١٢ (د) ٣٥





٢٠ المقدار : س (ص + ٣) + ع (ص + ٣) يساوى :

- (أ) (س + ص + ع + ٦) (ب) (س + ع) (ص + ٣)  
(ج) (س + ع) (ص + ٣)<sup>٢</sup> (د) (س + ع) × ٢ (ص + ٣)

٢١ إذا كان : أ<sup>٢</sup> + ٢أ + ب<sup>٢</sup> = ٢٥ فإن : أ + ب تساوى :

- (أ) ٥ - (ب) ٥ (ج) ٥ ± (د) ٦٢٥

٢٢ إذا كانت س = ١٣ ، ص = ١١ فإن : س<sup>٢</sup> - ٢س + ص<sup>٢</sup> تساوى :

- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٢٤ (د) ٤٨

٢٣ إذا كان ٨س<sup>٣</sup> + أ<sup>٣</sup> = (٢س + أ) (٤س<sup>٢</sup> - ١٤س + أ<sup>٢</sup>) فإن أ = .....

- (أ) ٧ (ب) ١٤ (ج) ٤٩ (د) ٣٤٣

٢٤ ناتج المقدار : (٨س<sup>٣</sup> - ٢٧ص<sup>٣</sup>) ÷ (٢س<sup>٣</sup> - ٣ص) حيث ٢س ≠ ٣ص يساوى :

- (أ) ٤س<sup>٢</sup> + ٦س + ٩ص<sup>٢</sup> (ب) ٤س<sup>٢</sup> - ٦س + ٩ص<sup>٢</sup>  
(ج) ٤س<sup>٢</sup> - ١٢س + ٩ص<sup>٢</sup> (د) ٤س<sup>٢</sup> + ١٢س + ٩ص<sup>٢</sup>

٢٥ إذا كان س<sup>٣</sup> + ٢٧ = (س + ٣) (س<sup>٢</sup> + ك - ٩) فإن ك تساوى :

- (أ) ٦ - س (ب) ٣ - س (ج) ٣س (د) ٦س

٢٦ المقدار : س<sup>٢</sup> + أس + ٩ يكون مربعاً كاملاً إذا كانت أ تساوى :

- (أ) صفر (ب) ٣ ± (ج) ٦ ± (د) ١٢ ±

٢٧ إذا كان س<sup>٣</sup> - ص<sup>٣</sup> = ٢٦ ، س<sup>٢</sup> + س + ص<sup>٢</sup> = ١٣ فإن س - ص = ....

- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ١٣ (د) ٣٩





(٢٨) إذا كانت ٢ حلاً للمعادلة  $س^2 - ٥س + أ = ٠$  فإن أ تساوى :

- (أ) ٣ - (ب) ٦ - (ج) ٣ (د) ٦

(٢٩) إذا كانت أربعة أمثال عدد يساوى ٤٨ فإن ثلث هذا العدد يساوى :

- (أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ١٢ (د) ١٦

(٣٠) مجموعة حل المعادلة :  $(س - ١) = ٠$  هى :

- (أ)  $\{ ٠ \}$  (ب)  $\{ - ١ \}$  (ج)  $\{ - ١ ، ١ \}$  (د)  $\{ ١ \}$

(٣١) إذا كان مساحة المستطيل الذى بعده س سم ، س + ١ سم تساوى ٣٠ فإن س تساوى :

- (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

(٣٢) إذا كان متوسط عددين يساوى ٥ ، وكان أحدهما يساوى ٣ فإن الآخر يساوى :

- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٧ (د) ١٣

(٣٣) إذا كان عُمر زياد الآن س سنة فإن عمره منذ ثلاث سنوات هو :

- (أ) ٣س (ب) ٣ - س (ج) س - ٣ (د) س + ٣

(٣٤) مستطيل طوله س + ص ، عرضه س - ص فإن مساحته تساوى :

- (أ) ٢س (ب) ٤س (ج)  $س^2 - ص^2$  (د)  $(س - ص)^2$

(٣٥) عدد طبيعى إذا قسم على كل من ٢ ، ٣ ، ٤ كان الباقي واحدًا وإذا قسم على ٥ لا

يوجد باقى . فإن العدد هو .....

- (أ) ١٣ (ب) ١٥ (ج) ٢٥ (د) ٣٥





(٣) أسئلة مقالية :

(١) حل كلاً مما يأتى تحليلًا كاملاً :

- (١)  $٨ - ٧س - ٢س$
- (٢)  $٤٩ + ١٤ص - ٢ص$
- (٣)  $٥ - ٢ص + ٣ص$
- (٤)  $١٢ + ١٥س - ٣س$
- (٥)  $٢٥ + ٢٠س - ٤س$
- (٦)  $٨ + ٩س - ٦س$
- (٧)  $١٠س + ٢ص + ٢ص$
- (٨)  $٢٥ - ٢ص - ٢٤س$
- (٩)  $١٩أ + ٦ب + ١٥أ$
- (١٠)  $١٣س + ٦ص + ٢ص$
- (١١)  $١ - ٢٥أ$
- (١٢)  $٢٥س - ١٥ص + ٣٥س$
- (١٣)  $٨١ - ١٦س$
- (١٤)  $٦٤ص + ٣س$
- (١٥)  $٩ - ٣س$
- (١٦)  $\frac{٢ص}{٤٩} - \frac{٢س}{٤}$
- (١٧)  $١٢س + ٣ص + ٣ص$
- (١٨)  $٨س - ٢ص$
- (١٩)  $٢ص - \frac{١}{٨}س$
- (٢٠)  $٢٨س - ٨س$
- (٢١)  $٤٨ - ٣س$
- (٢٢)  $٠,٠٢٧أ - ٠,٠٠١ب$
- (٢٣)  $٢(أ + ب) + ٢ج$
- (٢٤)  $٤(أ - ب) - ٢(أ - ب)$
- (٢٥)  $٢(٢ - (١ - س))$
- (٢٦)  $٩ + ٩ص - ٢ص$
- (٢٧)  $٢أ - ٢ب + ٢ب$
- (٢٨)  $٨ + ٦س - ٣س$
- (٢٩)  $٤س - ٤ص - ١٦ص$
- (٣٠)  $٨ - ١٢س - ٢س$
- (٣١)  $٥ - (٢ - ٤س)$
- (٣٢)  $٦س - (٣ + س)$
- (٣٣)  $٥٠ - ٢(١ + س)$
- (٣٤)  $٥ص - ٤س(٧ص + ٣س)$





(٢) أجب عن الأسئلة الآتية :

- (١) استخدم تحليل الفرق بين مربعين لإيجاد ناتج المقدار  ${}^2(١٨,٥) - {}^2(٢٣,٥)$
- (٢) استخدم التحليل فى إيجاد ناتج المقدار :  ${}^2(٢٣,٨٢) \times ٢ - {}^2(٢٦,١٨) \times ٢$
- (٣) اختصر لأبسط صورة :  $(أ - ب٢)(أ + ب٢) + ب٥$
- (٤) اختصر  $(أ٢ - ب٢) + (أ + ب٢)(أ - ب٢)$  ثم أوجد الناتج عندما  $أ = ١$  ،  $ب = ٢$
- (٥) اختصر لأبسط صورة :  $(أ٢ - ب٣)(أ + ب٢) + أ٢ - ب٢$
- (٦) إذا كان  $(ص + ٢)$  هو أحد عاملي المقدار  $٤ص٢ + ص - ١٤$  فأوجد العامل الآخر.
- (٧) إذا كان  $أ٣ + ب٤$  هو أحد عاملي المقدار  $١٥أ٢ + ١٧ب - ٤ب٢$  أوجد العامل الآخر.
- (٨) إذا كان :  $س + ص = ٧$  ،  $أ - ب٢ = ٤$  فأوجد القيمة العددية للمقدار :
- $أ(س + ص) - ب٢(س + ص)$
- (٩) أوجد فى أبسط صورة :  $(س - ص)(س + ص)(س٢ - ٢ص٢ + ص٤)$
- (١٠) إذا كان  $س + \frac{١}{س} = ٥$  فأوجد قيمة  $س٢ + \frac{١}{س٢}$
- (١١) إذا كان  $س٢ + \frac{١}{س٢} = ٣٤$  فأوجد قيمة  $س + \frac{١}{س}$
- (١٢) أوجد فى ح مجموعة حل كل من المعادلات الآتية :
- (أ)  $س٢ = ٤$  (ب)  $٤س٢ - ٩ = ٠$
- (ج)  $١٦س٤ - ٨١ = ٠$  (د)  $س٢ - س - ١٢ = ٠$
- (هـ)  $٩ = (١ + س)٢$  (و)  $٠ = (س - ٢)(٢ - س)$
- (ز)  $٠ = (١ - س٤)(١ + س) - (٣ + س)(٥ - س) + ٤$
- (ح)  $\frac{٨}{س} = \frac{١ - س}{٧}$  (ط)  $٠ = ١ + (٢ - س)س$





- ١٣) مستطيل بعده (س + ١) سم ، (س + ٥) سم . أوجد محيطه ومساحته .
- ١٤) مربع طول ضلعه يساوى (٥ + ب) سم حيث أ ، ب عدنان صحيحان موجبان أوجد مساحته . ثم أوجد القيمة العددية للمساحة عندما  $أ = ٢$  سم ،  $ب = ٣$  سم
- ١٥) عدنان صحيحان زوجيان متتاليان مجموع مربعيهما ١٠٠ أوجد العددين .
- ١٦) مستطيل يزيد طوله عن عرضه بمقدار ٣ سم ، فإذا كانت مساحته تساوى  $٢٨ \text{ سم}^2$  فأوجد طوله وعرضه .





## الجزء الثاني

### تمارين عامة على القوى الصحيحة السالبة وغير السالبة

أولاً : أكمل ما يأتى

(١) العدد  $(\sqrt[3]{2})^{-2}$  فى أبسط صورة = .....

(٢) العدد  $\frac{1}{\sqrt[3]{5}}$  فى أبسط صورة = .....

(٣)  $\left(\frac{\dots}{\dots} - \frac{\dots}{\dots}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^{-4}$

(٤) إذا كان  $3^{-2} = 1$  فإن س = .....

(٥) إذا كان  $3^{-1} = 27$  فإن س = .....

(٦) أبسط صورة للمقدار :  $(\sqrt[3]{2})^0 \times (\sqrt[3]{2}) \times (\sqrt[3]{2}) \times (\sqrt[3]{2})^2 = \dots$

(٧) أكبر العددين :  $(-\sqrt[4]{11})^{24}$  أو  $(-\sqrt[5]{11})^{20}$  هو .....

(٨) أبسط صورة للمقدار :  $(\sqrt[3]{7})^2 - (\sqrt[3]{7})^3 = \dots$

(٩) قيمة المقدار :  $\sqrt[2]{\frac{216}{3^3 \times 2^2}} = \dots$

(١٠) إذا كان خمسة أمثال عدد هو  $5^3$  فإن  $\frac{4}{5}$  هذا العدد هو .....

(١١) أبسط صورة للمقدار :  $2^{\text{صفر}} - (2)^{-1} - \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^2 = \dots$

(١٢) إذا كانت س =  $(2 + \sqrt[3]{2})^9$  ، ص =  $(2 - \sqrt[3]{2})^9$  فإن س ص = .....

(١٣)  $1 + 3^{-2} = (\dots + \dots)^{-2}$  حيث س  $\neq 0$

(١٤) إذا كانت  $3^3 \times 2^{-2} = 1,5$  فإن س = .....





١٥) إذا كانت  $\frac{1}{16} = 4^{-س}$  فإن  $\sqrt[3]{س} = \dots\dots\dots$

١٦) أبسط صورة للمقدار :  $2^{-3} \times 2^{-2} \div 4^{-3} = \dots\dots\dots$

١٧) أبسط صورة للمقدار :  $(3^{-2})^2 \div 9^{-3} \times (-2)^{-1} = \dots\dots\dots$

١٨) أبسط صورة للمقدار :  $(2^3 \times 2^{-2})^7 \div (\sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{1})^{\text{صفر}} = \dots\dots\dots$

١٩) إذا كان :  $3س + 3س + 3س = 1$  فإن س =  $\dots\dots\dots$

٢٠) إذا كان  $\frac{1}{4} = \frac{3س \times 3س}{(12)س}$  فإن س =  $\dots\dots\dots$

**ثانيًا : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :**

١)  $3^{-2}$  يساوى :

أ)  $9 -$  ب)  $\frac{1}{9}$  ج)  $\frac{1}{9}$  د) ٩

٢)  $0,002 \times 0,05$  يساوى :

أ)  $10^{-5}$  ب)  $10^{-4}$  ج)  $10^{-4}$  د)  $10^{-5}$

٣) أى مما يأتى هو الأقرب إلى  $11^2 + 9^2$  ؟

أ)  $22 + 18$  ب)  $211 + 29$  ج)  $120 + 80$  د)  $120 + 20$

٤) قيمة المقدار :  $(2)^{-2} + (2)^{-1}$  تساوى :

أ)  $2 \times 2^{-4}$  ب)  $2 \times 2^{-4}$  ج)  $3 \times 2^{-2}$  د)  $3 \times 2^{-1}$

٥) سدس العدد :  $12^2 \times 12^3$  هو :

أ)  $2^6$  ب)  $6^4$  ج)  $6^{11}$  د)  $6^{23}$

٦) قيمة المقدار :  $2^0 + (\sqrt{2})^0$

أ)  $2^6$  ب)  $2^{10}$  ج)  $(\sqrt{2})^{10}$  د)  $(\sqrt{2})^{20}$

٧)  $4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3$  يساوى :

أ)  $4^3$  ب)  $4^4$  ج)  $4^{12}$  د)  $4^{81}$





(٨)  $\left(\frac{\sqrt[3]{5}}{3}\right)^{-2}$  يساوى :

(أ)  $\frac{9}{5}$  (ب)  $\frac{5}{9}$  (ج)  $\frac{5}{9}$  (د)  $\frac{9}{5}$

(٩) إذا كان  $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{3}} = ٦$  فإن  $٦^{-١}$  تساوى :

(أ)  $\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{9}}$  (ب)  $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{3}}$  (ج)  $\sqrt[3]{3}$  (د) ٢

(١٠) إذا كان  $٧ = ٦^٣$  فإن  $٦^{٣+١}$  تساوى :

(أ) ٨ (ب) ١٣ (ج) ٣٦ (د) ٤٢

(١١) إذا كان  $٥ = ٣^٣$  فإن  $(٢٧)^٣$  تساوى

(أ) ٩ (ب) ٢٥ (ج) ١٢٥ (د) ٧٢٩

(١٢) إذا كان  $٥ = ٤^٥$  فإن  $٥^{-١}$  تساوى :

(أ) ١,٢٥ (ب) ٠,٨ (ج) ٠,١٢٥ (د) ٠,٠٨

(١٣) إذا كان  $٩^{-٨} = ١$  فإن  $١$  تساوى :

(أ) صفر (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج) ٤ (د) ٦

(١٤) إذا كانت  $(٥ - ٥) = ١$  فإن  $١ \in \dots\dots\dots$

(أ)  $\{٥\} - \{٥\}$  (ب)  $\{٥\} - \{٥\}$  (ج)  $\{٥\}$  (د) ح

(١٥) إذا كان  $٥^{-٣} = ١$  فإن  $(٢^٢)^٢$  تساوى :

(أ) ٣٦ (ب) ٩ (ج) ٤ (د) ٣

(١٦)  $(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3})^٩ (\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3})^٩$  يساوى :

(أ) ١ (ب)  $\sqrt[3]{5}$  (ج)  $\sqrt[3]{6}$  (د) ٥

(١٧) إذا كان  $٥ = ٣^٣$  ،  $\frac{1}{٣^٣} = ٧$  فإن  $٣^٣ + ٧ = \dots\dots\dots$

(أ)  $\frac{5}{7}$  (ب)  $\frac{7}{5}$  (ج) ٢ (د) ١٢





١٨) إذا كان  $١ - ٣^٢ \times ١ - ٣^١ = \frac{٩}{٤}$  فإن  $س =$  .....

- (أ) ٣ - (ب) ١ - (ج) ١ (د)  $٣^٣ - ٣^٢$

١٩) القيمة العددية للمقدار:  $\frac{١ + ٢^٢ \times ١ + ٢^٢}{٢^١}$  تساوى:

- (أ)  $\frac{١}{١٠}$  (ب) ٧ (ج) ١٠ (د) ١٠٠

٢٠)  $(٥^{٢+س} - ٥^{١+س}) \div ٥^س =$  .....

- (أ) ٥ (ب) ١٠ (ج) ١٥ (د) ٢٠

٢١) المقدار  $\frac{٣^س \times ٣^س \times ٣^س}{٣^س + ٣^س + ٣^س} =$  .....

- (أ)  $٣^{٢-س}$  (ب)  $٣^{١-٢س}$  (ج)  $٣^س - ٣^٣$  (د)  $٣^٣$

### ثالثاً : أجب عن الأسئلة الآتية :

(١) أوجد فى أبسط صورة قيمة كل من :

- (١)  $١ - ٣$  (٢)  $(\frac{١}{٤})^{-١}$  (٣)  $(\frac{٣}{٢})^{-٣}$   
(٤)  $(\sqrt[٤]{٥})^{-٤}$  (٥)  $(\sqrt[٢]{٣} - )^{-٢}$  (٦)  $(\sqrt[٣]{٧})^{-٣}$   
(٧)  $(\frac{١}{\sqrt[٢]{٢}})^{-٦}$  (٨)  $(٠,٠١)^{-٢}$  (٩)  $(\frac{\sqrt[٢]{٢} - }{٢})^{-٤}$

(٢) أوجد فى أبسط صورة قيمة كل مما يأتى :

- (١)  $(\sqrt[٢]{٣})^{-٢}$  (٢)  $(\sqrt[٣]{٤} - )^{-٣}$  (٣)  $(\frac{١}{\sqrt[٢]{٢}})^{-٣}$  (٤)  $(\frac{\sqrt[٣]{٢}}{٣})^{-٥}$   
(٥)  $(\sqrt[٤]{٢} - ) \times (\sqrt[٤]{٣} - )^{-٤}$  (٦)  $(\frac{١}{\sqrt[٣]{٢}})^{-٥} \div (\frac{١}{\sqrt[٣]{٢}})^{-٧}$





(٣) اختصر لأبسط صورة :

$$^{\circ}(\sqrt{5}) \div ^{\circ}(\sqrt{5}) (٢)$$

$$^{\circ}(\sqrt{2}) \times ^{\circ}(\sqrt{2}) (١)$$

$$\frac{^{\wedge}(\sqrt{3}) \times ^{\vee}(\sqrt{3})}{^{\vee}(\sqrt{3})} (٤)$$

$$^{\circ}(\sqrt{3}) \times ^{\circ}(\sqrt{2}) (٣)$$

(٤) اختصر كلاً مما يأتى إلى أبسط صورة :

$$\frac{^{\vee}(١٠) \times ^{\circ}(١٠)}{^{\circ},٠٠١ \times ^{\circ}(٠,١)} (٢)$$

$$\frac{^{\circ}(\sqrt{3}) \times ^{\circ}(\sqrt{3})}{^{\circ}(\sqrt{3})} (١)$$

$$\frac{^{\circ}(٣) \times ^{\circ}(\sqrt{2})}{^{\circ}(\sqrt{2}) \times ٣} (٣)$$

(٥) إذا كانت س = ٣ ، ص =  $\sqrt{2}$  فأوجد فى أبسط صورة قيمة كل من :

(أ) س<sup>-٢</sup> ص<sup>-٤</sup> (ب) (س<sup>-٢</sup> × ص<sup>-٤</sup>)<sup>-٢</sup> (ج)  $\left(\frac{س}{ص}\right)^{-٣}$

(٦) إذا كان س =  $\frac{\sqrt{3}}{٢}$  ، ص =  $\frac{١}{\sqrt{3}}$  ، ع =  $\frac{\sqrt{2}}{٢}$  فأوجد قيمة : س<sup>-٢</sup> + (س ع)<sup>-٢</sup> × ص<sup>-٢</sup>

(٧) إذا كانت س = ٢ ، ص =  $\sqrt{3}$  فأوجد فى أبسط صورة قيمة كل من :

أولاً : (س + ص)<sup>٤</sup> (س - ص)<sup>٤</sup> ثانياً :  $\left(\frac{س+ص}{س-ص}\right)^{-٢}$

(٨) إذا كان : أ =  $\frac{١}{\sqrt{٢}}$  ، ب = ١ - فأوجد قيمة : ٧ أ<sup>٦</sup> + (ب - ١)<sup>-٣</sup>

(٩) إذا كان : أ =  $\sqrt{3}$  ، ب =  $\sqrt{2}$  فأوجد قيمة :

أولاً : أ<sup>٤</sup> - ب<sup>٤</sup> ثانياً :  $\frac{أ^{\circ}}{ب^{\circ}}$

(١٠) إذا كان : س = ٢  $\sqrt{2}$  ، ص = ٣ فأوجد قيمة المقدار : (س<sup>-٢</sup> - ص<sup>-٢</sup>)<sup>-٣</sup>





(١١) إذا كان :  $\left(\frac{3}{2}\right)^s = \frac{4}{9}$  فأوجد قيمة  $\left(\frac{2}{3}\right)^{s+1}$

(١٢) إذا كان :  $\frac{3}{5\sqrt{2}} = s$  ،  $\frac{1}{\sqrt{2}} = v$  فأثبت أن :  $5s^2 + v^4 = 1$

(١٣) إذا كانت  $s = 2\sqrt{3}$  ،  $\frac{4}{\sqrt{2}} = v$  فأثبت أن :  $\sqrt{s^2 + v^4} + 5 = 9$

(١٤) أوجد قيمة  $s$  فى كل مما يأتى :

(٣)  $81 = 3^{s-2}$

(٢)  $1 = 2^{s-3}$

(١)  $32 = 2^s$

(٦)  $\frac{8}{125} = \left(\frac{2}{5}\right)^{s-1}$


(٥)  $\frac{1}{9} = 3^{s-2}$

(٤)  $9 = (\sqrt{3})^{s-1}$

(١٥) أثبت أن :  $\frac{1}{27} = \frac{27^{s-1} \times 8^s}{(2\sqrt{3})^{s+2} \times (\sqrt{3})^{s+2}}$

(١٦) إذا كان  $\frac{s^8 \times s^9}{s^{18}} = 64$  فأوجد قيمة  $(-4)^s$

(١٧) اختصر :  $\frac{s^4 \times s^{1+} \times s^{-2}}{s^2}$  ثم احسب قيم الناتج عن  $s = 1$



(١٨) إذا كانت المساحة الكلية لمكعب تساوى  $3,375 \times 10^2$  وحدة مساحة

فأوجد : أولاً : طول حرف المكعب ثانياً : حجم المكعب

(١٩) إذا كان حجم الكرة  $H = \frac{4}{3}\pi r^3$  فأوجد طول نصف قطر كرة حجمها

$3,880.8 \times 10^4$  ( $\pi = \frac{22}{7}$ )





## تمارين عامة على الاحتمال

أولاً : أكمل ما يأتى

- (١) إذا كان احتمال نجاح طالب فى إحدى المواد الدراسية ٠,٨ فإن احتمال رسوبه فيها .....
- (٢) عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة فإن احتمال ظهور العدد ٧ يساوى .....
- (٣) فصل دراسى به ٢١ ولدًا ، ١٥ بنتًا ، اختير أحدهم عشوائيًا فإن احتمال أن يكون التلميذ المختار ولدًا يساوى .....
- (٤) عند إلقاء قطعة عملة معدنية إذا كان احتمال ظهور صورة = احتمال ظهور كتابة فإن احتمال ظهور صورة يساوى .....
- (٥) كيس يحتوى على بطاقات مرقمة من ١ إلى ١٠ فإذا سحب من الكيس بطاقة واحدة عشوائيًا ، فإن احتمال أن تحمل البطاقة عددًا أوليًا يساوى .....
- (٦) عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة ، فإن احتمال ظهور عدد لا يساوى ٢ هو .....
- (٧) إذا كان احتمال أن يذهب تلميذ إلى المدرسة سيرًا على الأقدام ضعف احتمال أن يذهب باستخدام إحدى وسائل المواصلات فإن احتمال أن يستخدم التلميذ وسائل المواصلات = .....
- (٨) فصل به ٤٠ تلميذًا منهم ٢٠ يلعبون كرة قدم ، ١٠ يلعبون كرة سلة ، ٦ يلعبون كرة طائرة فإذا اختير تلميذ واحد عشوائيًا ، فإن احتمال أن يكون ممن لا يلعبون أى من الرياضات السابقة = .....
- (٩) مصنع ينتج ٢٠٠ لمبة يوميًا فإذا كان احتمال أن تكون اللمبة معيبة ٠,٠٣ فإن عدد اللمبات السليمة يساوى .....
- (١٠) إذا كان أحد الأندية يلعب ٣٠ مباراة وكان احتمال فوزه ٠,٥ واحتمال تعادله ٠,٣ فإن عدد المباريات المتوقع أن يخسرها النادى يساوى .....





- (١١) حقيبة بها ١٠ تفاحات منها ٥ حمراء ، ٣ خضراء ، ٢ صفراء . اختيرت تفاحة واحدة عشوائياً ، فإن احتمال أن تكون التفاحة المختارة غير حمراء = .....
- (١٢) إذا كان احتمال الحصول على نواتج معينة لتجربة عشوائية هو ٠,٤ , وكان عدد مرات إجراء هذه التجربة ١٠٠ فإن عدد مرات الحصول على هذه النواتج يساوى .....
- (١٣) طلب من أحد التلاميذ رسم مثلث فإذا كان احتمال تحديد نوع المثلث بالنسبة لزواياه متساوية فاحتمال أن يرسم التلميذ مثلثاً منفرج الزاوية = .....

### ثانياً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- (١) أى من الآتى يمكن أن يكون احتمال أحد الأحداث :
- (أ) - ٠,٧٣ (ب) ١,٢٣ (ج) ٧٩ % (د)  $\frac{4}{3}$
- (٢) ألقى حجر نرد مرة واحدة فإن احتمال ظهور العدد ٥ يساوى :
- (أ) -  $\frac{5}{6}$  (ب) صفر (ج)  $\frac{1}{6}$  (د)  $\frac{5}{6}$
- (٣) ألقيت قطعة نقود ٥٠٠ مرة فإن أقرب عدد متوقع لظهور الصورة يساوى :
- (أ) ٢٤٠ (ب) ٢٥٢ (ج) ٢٤٩ (د) ٢٦٠
- (٤) ألقى حجر نرد مرة واحدة فإن احتمال ظهور العدد ٧ يساوى :
- (أ) صفر (ب)  $\frac{1}{7}$  (ج)  $\frac{1}{6}$  (د) ١
- (٥) ألقى حجر نرد مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد أولى فردى يساوى :
- (أ) صفر (ب)  $\frac{1}{6}$  (ج)  $\frac{1}{3}$  (د)  $\frac{1}{6}$
- (٦) إذا كان احتمال نجاح طالب فى إحدى المواد ٨٠ % فإن احتمال رسوبه فيها يساوى :
- (أ) ٠,٠٨ (ب) ٠,٠٢ (ج) ٠,٢ (د) ٠,٨
- (٧) يتسابق لاعبان فإذا كان احتمال فوز الأول ٠,٧٥ فإن احتمال فوز الثانى يساوى :
- (أ) صفر (ب) ٠,٢٥ (ج) ٠,٧٥ (د) ١





٨) حقيبة بها ١٠٠ بطاقة مرقمة من ١ إلى ١٠٠ فإذا اختيرت واحدة عشوائيًا فاحتمال أن

يكون عليها عدد زوجي = .....

أ) ٠,٥ (ب) ١ (ج) صفر (د) ٠,٧٥

٩) فصل دراسي فيه ١٥ ولدًا ، ٢٠ بنتًا ، فإذا تغيب أحد التلاميذ فإن احتمال أن يكون

الغائب ولدًا يساوى :

أ)  $\frac{2}{7}$  (ب)  $\frac{3}{7}$  (ج)  $\frac{4}{7}$  (د)  $\frac{5}{7}$

١٠) حقيبة بها ١٠ كرات ملونة ، منها ٤ باللون الأبيض ، ٥ باللون الأحمر والباقي باللون

الأسود فإذا اختيرت واحدة عشوائيًا فاحتمال أن تكون سوداء = .....

أ) ٠,١ (ب) ٠,٢ (ج) ٠,٤ (د) ٠,٥

١١) إذا كان احتمال أن يحل تلميذ مسألة ٠,٧ ، فإن عدد المسائل المتوقع أن يحلها من بين

٢٠ مسألة يساوى :

أ) ٧ (ب) ١٠ (ج) ١٤ (د) ٢٠

١٢) إذا كان عدد تلاميذ أحد الفصول ٣٦ ، وكان احتمال اختيار تلميذ عُمره يقل عن ١٣

سنة هو  $\frac{1}{6}$  فإن عدد تلاميذ هذا الفصل الذين تزيد أعمارهم عن ١٣ سنة يساوى :

أ) ٢٠ (ب) ٢٤ (ج) ٣٠ (د) ٣٢

١٣) فصل به ٥٠ تلميذاً اختير تلميذ عشوائى فإذا كان احتمال أن يكون التلميذ المختار بنتاً

يساوى ٠,٤ فإن عدد الأولاد يساوى :

أ) ٥٠ (ب) ٤٠ (ج) ٣٠ (د) ٢٠

١٤) صندوق يحتوى على عدد ٢ كرة بيضاء ، ٣ كرات حمراء ، ٥ كرات سوداء سحب

كرة عشوائيًا من الصندوق ، فإن احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ليست حمراء

تساوى :

أ) ٠,٢ (ب) ٠,٣ (ج) ٠,٥ (د) ٠,٧





١٥) الشكل المرسوم يمثل لعبة الدوارة : احتمال توقف المؤشر عند عدد

أكبر من ٢ يساوى :

- أ) ٢٥ %      ب) ٥٠ %      ج) ٧٥ %      د) ١٠٠ %

١٦) مدرسة مشتركة بها ٩٠٠ تلميذ ، اختيرت ٧٠ بنتاً من بين عينة عشوائية قدرها ١٥٠

تلميذاً ، فما عدد البنات المتوقع فى المدرسة ؟

- أ) ٤٠٠      ب) ٤٢٠      ج) ٤٨٠      د) ٥٠٠

١٧) إذا كان احتمال أن يصيب أحد لاعبي الرماية الهدف يساوى ٠,٨ فإن عدد الإخفاقات

المتوقعة إذا كرر التجربة ١٠ مرات = .....


- أ) ٨      ب) ٢      ج) ١      د) صفر

١٨) صندوق به كرات ملونة بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق ، فإذا كان بالصندوق

١٥ كرة زرقاء ، وكان احتمال سحبها عشوائياً من الصندوق هو  $\frac{1}{3}$  فإن عدد الكرات

الصندوق يساوى :

- أ) ٥      ب) ١٥      ج) ٣٠      د) ٤٥





١٩) إذا صوب شخص على اللوحة المرسومة بالشكل المقابل ،

فإن احتمال إصابة المنطقة المظلمة يساوى :

- أ)  $\frac{1}{4}$       ب)  $\frac{1}{3}$       ج)  $\frac{1}{2}$       د)  $\frac{3}{4}$

٢٠) قسمت لعبة الدوارة إلى قسمين غير متساويين س ، ص ، أدير المؤشر ٢٠٠ دورة

فتوقف ٤٧ مرة فى المنطقة س . فى أى من الأشكال الآتية يشير المؤشر إلى المنطقة س؟







ثالثاً : أسئلة إنتاج الإجابة :

(١) الجدول التالى يبين تجربة اختيار رقم من الأرقام ٢ ، ٦ ، ٩ فكانت النتائج كالتالى :

الرقم	٢	٦	٩
الاحتمال	٠,٣	٠,٥	س

أولاً : أوجد قيمة س

ثانياً : تحسب احتمال اختيار :

(أ) عدد زوجى (ب) عدد فردى (ج) عدد أولى

(٢) صندوق يحتوى على ٣ كرات حمراء ، ٤ كرات صفراء ، ٥ كرات خضراء أوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة :

(أ) صفراء (ب) خضراء (ج) ليست حمراء

(٣) ألقى حجر نرد مرة واحدة أوجد احتمال :

(أ) ظهور عدد أولى (ب) ظهور عدد فردى

(ج) ظهور العدد صفر (ج) ظهور عدد محصور بين صفر ، ٧

(٤) سلة بها كرات مرقمة من ١ إلى ١٥ ، سحب كرة عشوائياً ، فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة : (أ) تحمل عدداً زوجياً .

(ب) تحمل عدداً يقبل القسمة على ٣ (ج) تحمل عدداً أولياً .

(٥) مجموعة من البطاقات مرقمة بالأعداد من ١ إلى ٢٤ فإذا سحب منها بطاقة واحدة عشوائياً أوجد احتمال :

(أ) أن تكون البطاقة المسحوبة عليها مضاعف للعدد ٦

(ب) أن تكون البطاقة المسحوبة عليها عدد أولى .

(ج) أن تكون البطاقة المسحوبة عليها عدد مربع كامل .






(٦) تعطى مستويات تقدير أداء التعلم لفصل به ٥٠ تلميذاً بالجدول الآتى :

التقدير	ممتاز	جيد جدًا	جيد	مقبول	دون المستوى
العدد	٦	٩	١١	١٦	٨

فإذا اختير أحد التلاميذ عشوائيًا ، فاحسب احتمال أن يكون تقديره :

(أ) ممتازاً (ب) دون المستوى (ج) أقل من جيد

(٧) الشكل المقابل : يمثل لعبة الدوارة قسمت الدائرة إلى ٨ قطاعات متساوية .



أوجد احتمال أن يتوقف المؤشر فى المنطقة التى تحمل :

(أ) عددًا زوجيًا . (ب) عددًا أوليًا .

(ج) عددًا ليس مربعًا كاملاً .

(٨) فى أحد مصانع المصابيح الكهربائية تبين أنه يوجد ٣٦ مصباحًا معيبًا من بين ٦٠٠

مصباح ، فإذا سحب مصباح فما احتمال أن يكون المصباح المسحوب :

(أ) معيبًا (ب) غير معيب

(٩) تعطى نتائج أحد الأبحاث لإحصائى اجتماعى بإحدى المدارس عن كيفية وصول التلاميذ

إليها كما بالجدول الآتى :

طريقة الوصول	سيرًا على الأقدام	سيارة خاصة	أتوبيس	دراجة
عدد التلاميذ	٦٦	١٢	٣	١٩

فإذا اختير تلميذ عشوائيًا ، فما احتمال أن يكون التلميذ ممن :

(أ) يصلون بسيارة خاصة (ب) يصلون سيرًا على الأقدام

(ج) لا يركبون الدراجات





(١٠) فى إنتاج مصنع للملابس بمدينة العاشر من رمضان ينتج ٦٠٠٠ قطعة ملابس يوميًا ، فإذا اخذت منها عينة عشوائية حجمها ١٠٠٠ قطعة وتم اختبارها فوجد بها ٢٠ قطعة معيبة فما هو عدد القطع المعيبة المتوقع فى ذلك اليوم ؟

(١١) قامت إحدى شركات إنتاج الآلات الحاسبة بسحب عينة من ٢٠٠ آلة وفحصتها فوجدت التالف منها ٦ %

أ) ما عدد الآلات التالفة فى هذه العينة ؟

ب) إذا كان الإنتاج الكلى للمصنع خلال هذا الشهر ١٥٠٠ آلة حاسبة ، فما العدد الصالح منها ؟

(١٢) فى مشروع تعبئة الموالح للتصدير وجد أن ٣٠ % من الثمار لا تصلح للتصدير لصغر حجمها فكم طنا يمكن تصديره فى عشرة أيام إذا كان مقدار ما ينتج يوميًا للمصنع ٢٠ طنا من الموالح ؟









(٢) اختر الإجابة الصحيحة :

- (١) ٤٩ (٢) (س - ٢) (س + ٢)  
(٣) ١ - ٣ (٤) ١  
(٥) ٢٤ ± (٦) ٩  
(٧) ٩ (٨) ٤  
(٩) ٣ (١٠) ٣  
(١١) ٤ (١٢) ١  
(١٣) ١٦ (١٤) ٨  
(١٥) ٤ (١٦) ٣  
(١٧) ٣س - ٨ص (١٨) ٤  
(١٩) ٣٥ (٢٠) (س + ع) (ص + ٣)  
(٢١) ٥ ± (٢٢) ٤  
(٢٣) ٧ (٢٤) (٤س + ٦س + ٩ص)  
(٢٥) ٣س (٢٦) ٦ ±  
(٢٧) ٢ (٢٨) ٦  
(٢٩) ٤ (٣٠) ١  
(٣١) ٥ (٣٢) ٧  
(٣٣) ٣س - ٣ (٣٤) ٣س - ٢ص  
(٣٥) ٢٥

(٣) الأسئلة المقالية

- (١) (١ - ٨) (س + ١) (٢) (ص - ٧)  
(٣) (٢ص + ٥) (ص - ١)





- (٤) ٣ (س<sup>٢</sup> - ٥س + ٤)
- (٥) ٣ = (س - ٤) (س - ١)
- (٥) (س<sup>٢</sup> - ٥)
- (٦) (س<sup>٣</sup> - ٨) (س<sup>٣</sup> - ١)
- (٧) = (س - ٢) (س<sup>٢</sup> + ٢س + ٤) (س - ١) (س<sup>٢</sup> + س + ١)
- (٧) س (٢٥س<sup>٢</sup> - ١٠س ص + ص<sup>٢</sup>)
- = س (٥س - ص)
- (٨) (س ص - ٢٥) (س ص + ١)
- (٩) ١٥ أ<sup>٢</sup> - ١٩ أب + ٦ب<sup>٢</sup>
- (١٠) (٣ - أ) (٢ - ب) (٥ - أ - ٣ب)
- (١١) (١٠ - س<sup>٢</sup> - ٣ص) (٣ - س<sup>٢</sup>)
- (١٢) (١٠ - أ<sup>٢</sup>) (١ - أ<sup>٢</sup>)
- (١٣) (١٢ - ٥س ص) (٥س - ٣ص + ٧)
- (١٤) (٩ - ٤س<sup>٢</sup>) (٩ + ٤س<sup>٢</sup>)
- = (٣ - س<sup>٢</sup>) (٣ + س<sup>٢</sup>) (٩ + ٤س<sup>٢</sup>)
- (١٥) (س + ٤ص) (س<sup>٢</sup> - ٤س ص + ١٦ص<sup>٢</sup>)
- (١٥) (٢٧ - س<sup>٣</sup>)  $\frac{1}{3}$
- =  $\frac{1}{3}$  (س - ٣) (س<sup>٢</sup> + ٣س + ٩)
- (١٦) (١٦ -  $\frac{س}{٧}$ ) ( $\frac{س}{٧}$  +  $\frac{ص}{٧}$ )
- (١٧) (٣س<sup>٣</sup> - ٤ص<sup>٢</sup>) (س<sup>٢</sup> + ٤ص<sup>٢</sup>)
- (١٨) (٢ - س<sup>٢</sup>) (٤س<sup>٢</sup> - ص<sup>٢</sup>)
- = ٢ (٢س - ص) (٢س + ص)





$$(١٩) \frac{1}{8} \text{ س ص } (١٦ \text{ ص}^2 - \text{س}^2)$$

$$= \frac{1}{8} \text{ س ص } (٤ \text{ ص} - \text{س}) (٤ \text{ ص} + \text{س})$$

$$(٢٠) ٢ \text{ س ص } (\text{س}^2 - ٤ \text{ ص}^2)$$

$$= ٢ \text{ س ص } (\text{س} - ٢ \text{ ص}) (\text{س} + ٢ \text{ ص})$$

$$(٢١) \frac{3}{4} (\text{س}^3 - ٦٤)$$

$$= \frac{3}{4} (\text{س} - ٤) (\text{س}^2 + ٤ \text{ س} + ١٦)$$

$$(٢٢) (٠,٣ \text{ أ} - ٠,١ \text{ ب}) (٠,٩ \text{ أ}^2 + ٠,٣ \text{ أ ب} + ٠,١ \text{ ب}^2)$$

$$(٢٣) (\text{أ} + \text{ب} + \text{ج}) (\text{أ}^2 + ٢ \text{ أ ب} + \text{ب}^2 - \text{أ ج} - \text{ب ج} + \text{ج}^2)$$

$$(٢٤) (\text{أ} - \text{ب}^2) [٤ - \text{أ}(\text{ب}^2 - ٤)]$$

$$= (\text{أ} - \text{ب}^2) (\text{أ} + \text{ب}^2 - ٢) (٢ - \text{أ} - \text{ب}^2)$$

$$(٢٥) ٢ (\text{س} - ١) (\text{س}^3 - ١)$$

$$= ٢ (\text{س} - ١) (\text{س}^2 + \text{س} + ١) (\text{س} - ١)$$

$$= ٢ (\text{س} - ٢) (\text{س} + \text{س}^2 - ١) (\text{س} + ١)$$

$$= ٢ (\text{س} - ٢) (\text{س} - \text{س}^2 + ١)$$

$$(٢٦) (\text{ص}^3 - \text{ص}^2) + (-٩ \text{ ص} + ٩)$$

$$\text{ص}^2 (\text{ص} - ١) - ٩ (\text{ص} - ١)$$

$$(\text{ص} - ١) (\text{ص}^2 - ٩)$$

$$(\text{ص} - ١) (\text{ص} - ٣) (\text{ص} + ٣)$$

$$(٢٧) (\text{أ}^3 - \text{أ ب}^2) + (-\text{أ ب}^2 + \text{ب}^3)$$

$$\text{أ} (\text{أ}^2 - \text{ب}^2) - \text{ب} (\text{أ}^2 - \text{ب}^2)$$

$$(\text{أ}^2 - \text{ب}^2) (\text{أ} - \text{ب})$$

$$(\text{أ} - \text{ب}) (\text{أ} + \text{ب}) (\text{أ} - \text{ب})$$





# الجبر

## الصف الثاني الإعدادي

$$(28) (س^3 + 8) + (-س^3 - 6س)$$

$$= (س + 2) (س^2 - 4س + 4) - (س^3 + 6س)$$

$$= (س + 2) (س^2 - 4س + 4) - (س^3 + 6س)$$

$$= (س + 2) (س^2 - 4س + 4) - (س^3 + 6س)$$

$$= (س + 2) (س^2 - 4س + 4) - (س^3 + 6س)$$

$$(29) 4س^2 - 4سص + ص - 16$$

$$= (س^2 - 4س) (ص - 4)$$

$$= (س^2 - 4س) (ص - 4)$$

$$(30) (3س^3 - 2س^2) + (2س - 8)$$

$$= 3س^3 - 2س^2 + 2س - 8$$

$$= (3س^3 - 2س^2 + 2س - 8)$$

$$(31) (5س - 2) (2س - 4) - 5$$

$$= 10س^2 - 20س + 8 - 5$$

$$= 10س^2 - 20س + 3$$

$$= (10س^2 - 20س + 3)$$

$$(32) 3س^2 + س - 6 - 6س$$

$$= 3س^2 - 5س - 6$$

$$= (3س^2 - 5س - 6)$$

$$(33) 2 (2س^2 + 1) - 5$$

$$= 4س^2 + 2 - 5$$

$$= 4س^2 - 3$$

$$(34) 5ص^2 - 28سص - 12س^2$$

$$= (5ص^2 - 28سص - 12س^2)$$





$$(1) \quad (18,5 + 23,5) (18,5 - 23,5) \quad (2)$$

$$210 = 42 \times 5 =$$

$$(2) \quad (23,82 - 26,18) (23,82 + 26,18) 2$$

$$236 = 2,36 \times 50 \times 2 =$$

$$(3) \quad 2^2 - 2^4 = 2^5 + 2^6 + 2^7$$

$$(4) \quad 2^4 - 2^2 = 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8$$

$$2^5 - 2^3 = 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8$$

$$(5) \quad 2^2 - 2^4 = 2^3 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9$$

$$2^3 - 2^8 = 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^9 + 2^{10}$$

$$(6) \quad (4 - 7)$$

$$(7) \quad (5 - 6)$$

$$(8) \quad (3 + 5) (3 - 5)$$

$$28 = 4 \times 7 =$$

$$(9) \quad (3 - 5) (3 + 5) (3 - 5) (3 + 5)$$

$$(3 - 5) (3 + 5) (3 - 5) (3 + 5) (3 - 5) (3 + 5)$$

$$(3 - 5)^2 (3 + 5)^2$$

$$(10) \quad 2^5 = 2 \left( \frac{1}{2} + 2 \right)$$

$$2^5 = 2 + \frac{1}{2} + 2^2$$

$$2^3 = \frac{1}{2} + 2^2$$





$$(11) \quad 2 + \frac{1}{s} + 2s = 2 \left( \frac{1}{s} + s \right)$$

$$2 + 34 = 2 \left( \frac{1}{s} + s \right)$$

$$36 = 2 \left( \frac{1}{s} + s \right)$$

$$18 \pm = \frac{1}{s} + s$$

$$(12) \quad (أ) \quad 0 = s^2 - 4s$$

$$0 = (s - 4)s$$

$$s = 0, s = 4$$

$$م. ح = \{0, 4\}$$

$$(ب) \quad 0 = (s^2 - 3)(s^2 + 3)$$

$$s^2 = 3, s^2 = -3$$

$$s = \frac{3}{2}, s = -\frac{3}{2}$$

$$م. ح = \left\{ \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\}$$

$$(ج) \quad 0 = (s^2 - 9)(s^2 + 9)$$

$$s^2 = 9, s^2 = -9$$

$$s = \pm 3, \emptyset$$

$$م. ح = \left\{ \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\}$$

$$(د) \quad 0 = (s - 4)(s + 3)$$

$$s = 4, s = -3$$

$$م. ح = \{4, -3\}$$





# الجبر

## الصف الثاني الإعدادي

$$\text{هـ) } 9 = (س + 1)^2$$

$$س + 1 = \pm 3$$

$$س + 1 = 3 \quad س + 1 = -3$$

$$س = 2 \quad س = -4$$

$$\text{م. ح} = \{-4, 2\}$$

$$\text{و) } 0 = (س - 2) + 3(س - 2)$$

$$0 = (س - 2)(س + 3)$$

$$س = 2, \quad س = -3$$

$$\text{م. ح} = \{-3, 2\}$$

$$\text{ز) } 4س^2 + 11س - 3 = 10س + 5س^2 - 4 = 0$$

$$3س^2 + 21س - 24 = 0$$

$$3(س^2 + 7س - 8) = 0$$

$$3(س + 8)(س - 1) = 0$$

$$س = -8, \quad س = 1$$

$$\text{م. ح} = \{-8, 1\}$$

$$\text{ح) } 56 = (س - 1)س$$

$$س^2 - س - 56 = 0$$

$$س(س - 8) + 7(س - 8) = 0$$

$$س = 8, \quad س = -7$$

$$\text{م. ح} = \{-7, 8\}$$

$$\text{ط) } 0 = 1 + 2س - 2س^2$$

$$0 = (س - 1)(س + 1) \quad \leftarrow س = 1$$

$$\text{م. ح} = \{1\}$$



# الجبر

## الصف الثاني الإعدادي

١٣) محيط المستطيل = (س + ١ + س + ٥) × ٢ =

= (٢س + ٦) × ٢ = ٤س + ١٢ سم<sup>٢</sup>

مساحته = (س + ١) (س + ٥)

= ٦س + ٥

١٤) مساحة المربع = (٥ + أ + ب)<sup>٢</sup>

= (٥ + ٢ + ٣)<sup>٢</sup> = ١٦٩ سم<sup>٢</sup>

١٥) بفرض العدان س ، س + ٢

س<sup>٢</sup> + (س + ٢) = ١٠٠

س<sup>٢</sup> + س<sup>٢</sup> + ٤س + ٤ = ١٠٠

$\frac{٢س^٢}{٢} = \frac{٤س}{٢} + \frac{٤}{٢}$

س<sup>٢</sup> + ٢س + ٢ = ٥٠

س<sup>٢</sup> + ٢س - ٤٨ = ٠

(س + ٨) (س - ٦) = ٠

س = ٨ - ، س = ٦

∴ العدان - ٨ ، - ٦

أو ٦ ، ٨

١٦) بفرض العرض = س

∴ الطول = س + ٣

س (س + ٣) = ٢٨

س<sup>٢</sup> + ٣س - ٢٨ = ٠

(س + ٧) (س - ٤) = ٠

س = ٧ - ، س = ٤

مرفوض

∴ عرضه = ٤ سم ، طوله = ٧ سم





## إجابات الجزء الثاني

تمارين عامة على القوى الصحيحة السالبة وغير السالبة

أولاً : أكمل :

$2^4$ (٤)	$\frac{9}{4}$ (٣)	$5^2$ (٢)	$\sqrt[2]{\frac{1}{4}}$ (١)
٨ (٨) صفر	$(\sqrt[2]{11})^{24}$ (٧)	٨ (٦)	٤ (٥)
١ - (١٢)	١ (١١)	٢٠ (١٠)	١ (٩)
٢ (١٦)	٨ (١٥)	١ (١٤)	$1 + 1^2$ (١٣)
١ (٢٠)	١ - (١٩)	$2^2$ (١٨)	$\frac{1}{2}$ (١٧)

ثانياً : اختر

$202 \times 3$ (٤)	$80 + 120$ (٣)	$4^{-10}$ (٢)	$\frac{1}{9}$ (١)
$\frac{9}{5}$ (٨)	$4^4$ (٧)	$6^2$ (٦)	$11^6$ (٥)
٠,٨ (١٢)	١٢٥ (١١)	٤٢ (١٠)	$\sqrt[3]{\frac{27}{3}}$ (٩)
١ (١٦)	٣٦ (١٥)	١٤ (١٤) ح - {٥}	٤ (١٣)
٢٠ (٢٠)	١٠ (١٩)	١ - (١٨)	$\frac{5}{7}$ (١٧)
			$21$ (٢١) $3^2 - 1$

ثالثاً :

٢٥ (٤)	$\frac{8}{27}$ (٣)	٤ (٢)	$\frac{1}{3}$ (١) (١)
١٠٠٠٠ (٨)	$\frac{1}{8}$ (٧)	$\frac{1}{7}$ (٦)	$\frac{1}{3}$ (٥)
			٤ (٩)



# الجبر

## الصف الثاني الإعدادي

$$(٢) \quad (١) \frac{1}{3} \quad (٢) \frac{1}{4} \quad (٣) \sqrt[2]{2}$$

$$(٤) \sqrt[3]{9} \quad (٥) \frac{4}{9} \quad (٦) 3$$

$$(٣) \quad (١) \sqrt[6]{2} = \sqrt[3]{2} = \sqrt[2]{2} \quad (٢) (-\sqrt[4]{5}) = -\sqrt[2]{5} = -\sqrt[2]{5}$$

$$(٣) \quad \sqrt[3]{36} = \sqrt[2]{6} = \sqrt[4]{6} = \sqrt[4]{(\sqrt[3]{3} \times \sqrt[2]{2})}$$

$$(٤) \quad \sqrt[3]{81} = \sqrt[3]{3} \times \sqrt[4]{3} = \sqrt[9]{3} = \sqrt[6]{3} \times \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3}$$

$$(٤) \quad \sqrt[3]{3} = \sqrt[10]{3} \times \sqrt[4]{3} \times \sqrt[5]{3} = \sqrt[3]{3}$$

$$(٢) \quad \frac{\sqrt[7]{(10)} \times \sqrt[2]{(10)}}{\sqrt[3]{10} \times \sqrt[2]{(10)}} = \frac{10^{\frac{7}{2}} \times 10^{\frac{1}{2}}}{10^{\frac{3}{2}} \times 10^{\frac{1}{2}}} = 10^{\frac{7+1-3-1}{2}} = 10^1 = 10$$

$$(٣) \quad \sqrt[3]{2} \times \sqrt[9]{5} = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{10}$$

$$\sqrt[3]{2} \times \sqrt[4]{2} = \sqrt[12]{2^5}$$

$$\frac{1}{108} = \frac{1}{27} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3^3} \times \frac{1}{2^2} =$$

$$(٥) \quad (أ) \text{ من } \sqrt[2]{3} \times \sqrt[4]{2} = \sqrt[8]{3^2 \times 2^2} = \sqrt[8]{36}$$

$$\frac{1}{36} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{2^2} \times \frac{1}{3^2} =$$

$$(ب) \quad \sqrt[2]{(\sqrt[4]{2} \times \sqrt[2]{3})} = \sqrt[2]{(\sqrt[2]{2} \times \sqrt[2]{3})} = \sqrt[2]{6}$$

$$\frac{81}{16} = \frac{1}{4} \times 81 = \sqrt[4]{81} \times \sqrt[4]{81} =$$

$$(ج) \quad \frac{\sqrt[2]{2}}{\sqrt[2]{3}} = \sqrt[2]{\left(\frac{2}{3}\right)} = \sqrt[2]{\left(\frac{ص}{س}\right)} = \sqrt[2]{\left(\frac{ص}{س}\right)}$$

$$(٦) \quad \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right) \times \left(\frac{\sqrt[2]{2}}{2} \times \frac{\sqrt[3]{2}}{2}\right) + \left(\frac{\sqrt[3]{2}}{2}\right)$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{6}{16} + \frac{3}{4} =$$

$$\frac{6}{8} = \frac{1}{8} + \frac{3}{4} =$$





(٧) أولاً :  $(س + ص) = (س - ص) = (س - ص)$

$$١ = (٣\sqrt{٢} - ٢) =$$

ثانياً :  $\left(\frac{٣\sqrt{٢} - ٢}{٣\sqrt{٢} + ٢}\right) = \left(\frac{س - ص}{س + ص}\right) = \left(\frac{س + ص}{س - ص}\right)$

$$\frac{٣\sqrt{٢} + ٢}{٣\sqrt{٢} - ٢} \times \frac{٣\sqrt{٢} - ٢}{٣\sqrt{٢} + ٢} = \frac{٣ + ٣\sqrt{٢} - ٤}{٣ + ٣\sqrt{٢} + ٤} =$$

$$٣\sqrt{٥٦} - ٩٧ = \frac{٤٨ + ٣\sqrt{٥٦} - ٤٩}{١} = \frac{٢(٣\sqrt{٤} - ٧)}{٤٨ - ٤٩} =$$

(٨)  $٣ - ((١ -) - ١) + \left(\frac{١}{٣}\right) \times ٧$

$$١ = \frac{١}{٨} + \frac{١}{٨} \times ٧ =$$

(٩) أولاً :  $٥ = ٤ - ٩ = ٢٢ - ٢٣ = ٤\sqrt{٢} - ٤\sqrt{٣}$

ثانياً :  $\frac{٩}{٤} = \left(\frac{٣}{٢}\right) = \frac{٤\sqrt{٣}}{٤\sqrt{٢}}$

(١٠)  $١ - = ٣(٩ - ٨) = ٣(٢٣ - ٢(\sqrt{٢} ٣))$

(١١)  $\left(\frac{٢}{٣}\right) = \left(\frac{٣}{٢}\right)$

$$\left(\frac{٣}{٢}\right) = \left(\frac{٢}{٣}\right)$$

$$٤ - = س \leftarrow ٢ - = \frac{س}{٢}$$

$$\left(\frac{٢٧}{٨}\right) = \left(\frac{٢}{٣}\right) = \left(\frac{٢}{٣}\right)$$



$$(١٢) \quad ٥س^٢ + ٤ص =$$

$$٥ \left( \frac{١}{٢\sqrt{٢}} \right) + \left( \frac{٣\sqrt{٢}}{٥\sqrt{٢}} \right) =$$

$$\left( \frac{١}{٤} \right) + \left( \frac{٣}{٢٠} \right) =$$

$$١ = \frac{١}{٤} + \frac{٣}{٤} =$$

$$(١٣) \quad \sqrt{٥ + ٤ص + ٢س^٢} =$$

$$\sqrt{٥ + \left( \frac{٤}{٢\sqrt{٢}} \right) + \left( \frac{٣\sqrt{٢}}{٥\sqrt{٢}} \right)} =$$

$$٩ = \sqrt{٨١} = \sqrt{٥ + ٦٤ + ١٢} =$$

$$(١٤) \quad (١) \quad ٣٢ = ٤س^٢ \leftarrow ٥س^٢ = ٤٠$$

$$٥ = س$$

$$(٢) \quad ١ = ٣ - س^٢ \leftarrow س - ٣ = صفر$$

$$٣ = س$$

$$(٣) \quad ٨١ = ٢ - س^٣ \leftarrow ٤س^٣ = ٨٣$$

$$٦ = س - ٢ \leftarrow س = ٤$$

$$(٤) \quad \sqrt[٤]{٣} = ١ - س \left( \sqrt[٣]{٣} \right)$$

$$٥ = س - ٤ \leftarrow س = ٩$$

$$(٥) \quad ٢ - س^٣ = ٢ - ٣ = ٠$$

$$س - ٢ = ٢ - ٣ \leftarrow س = صفر$$

$$(٦) \quad \left( \frac{٢}{٥} \right) = ١ - س^٢ \left( \frac{٢}{٥} \right)$$

$$٢ = س - ٣ \leftarrow ٢ = س - ٤$$

$$٢ = س$$





# الجبر

## الصف الثاني الإعدادي

$$\frac{{}^{\text{س}}\left(\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix}\right) \times {}^{\text{س}}\left(\begin{smallmatrix} 3 \\ 3 \end{smallmatrix}\right)}{{}^{\text{س}^2}_2 \times {}^{\text{س}^2}_3 \times {}^{\text{س}^2}_3 \times {}^{\text{س}^2}_2} \quad (١٥)$$

$$= \frac{{}^{\text{س}^3}_2 \times {}^{\text{س}^3}_3 - {}^{\text{س}^3}_3 \times {}^{\text{س}^3}_2}{{}^{\text{س}^2}_2 \times {}^{\text{س}^2}_3 \times {}^{\text{س}^2}_3 \times {}^{\text{س}^2}_2} =$$

$$\# \quad \frac{1}{27} = 1 \times \frac{1}{27} = {}^{\text{صفر}}_2 \times {}^{3-3}_3 =$$

$$٦٤ = {}^{\text{س}}\left(\frac{٩ \times ٨}{١٨}\right) \quad (١٦)$$

$$٦٤ = {}^{\text{س}}_٤$$

$$\therefore \frac{1}{64} = {}^{\text{س}-٤}_٤$$

$$\frac{{}^{\text{س}-2}\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 3 \end{smallmatrix}\right) \times {}^{\text{س}+1}\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)}{{}^{\text{س}^2}_3 \times {}^{\text{س}^2}_2} \quad (١٧)$$

$$= {}^{\text{س}^2}_2 + {}^{\text{س}^2}_2 - {}^{\text{س}^2}_3 - {}^{\text{س}^2}_2 \times {}^{\text{س}^2}_3 - {}^{\text{س}^2}_2 - {}^{\text{س}^2}_2 =$$

$$= {}^{\text{س}^2}_2 \times {}^{\text{س}^2}_3 - {}^{\text{س}^2}_3 \times {}^{\text{س}^2}_2 = {}^{\text{س}^2}_3 - {}^{\text{س}^2}_3 =$$

$$\text{عند س} = ١$$

$$\text{المقدار} = {}^{\text{س}^2}_3 \times {}^{\text{س}^2}_2 = ١ \times ٤ = ٤$$

$${}^2_{10} \times ٣,٣٧٥ = {}^2_{٦١} \quad (١٨)$$

$$\frac{٢٢٥}{٤} = \frac{{}^2_{10} \times ٣,٣٧٥}{٦} = {}^2_{٦}$$

$$\text{ل} = \frac{10}{٦} = ٧,٥ \text{ وحدة طول}$$

$$\text{حجم المكعب} = \text{ل}^3 = (٧,٥)^3 = \frac{٣٣٧٥}{٨} \text{ وحدة مكعبة}$$



$$(١٩) \quad \frac{4}{3} \pi \text{ نق} = 3,880.8 \times 10^4$$

$$\frac{3,880.8 \times 10^4}{\frac{22}{7} \times \frac{4}{3}} = \text{نق}^3$$

$$\text{نق}^3 = 9261$$

$$\text{نق} = 21 \text{ وحدة طول}$$

## الاحتمال

### أولاً : أكمل

$\frac{1}{2}$ (٤)	$\frac{2}{7}$ (٣)	(٢) صفر	(١) ٠,٢
$\frac{1}{11}$ (٨)	$\frac{1}{3}$ (٧)	$\frac{5}{6}$ (٦)	$\frac{2}{5}$ (٥)
٤٠ (١٢)	$\frac{1}{2}$ (١١)	٦ (١٠)	١٩٤ (٩)
			$\frac{1}{3}$ (١٣)

### ثانياً :

(٤) صفر	(٣) ٢٤٩	(٢) $\frac{1}{6}$	(١) ٧٩ %
(٨) ٠,٥	(٧) ٠,٢٥	(٦) ٠,٢	(٥) $\frac{1}{3}$
(١٢) ٣٠	(١١) ١٤	(١٠) ٠,١	(٩) $\frac{3}{7}$
(١٦) ٤٢٠	(١٥) ٥٠ %	(١٤) ٠,٧	(١٣) ٣٠
(٢٠) ج	(١٩) $\frac{1}{4}$	(١٨) ٤٥	(١٧) ٢





### ثالثاً :

(١) أولاً : س =  $(٠,٥ + ٠,٣) - ١ = ٠,٢$

ثانياً : (أ)  $٠,٨$  (ب)  $٠,٢$  (ج)  $٠,٣$

(٢) (أ)  $\frac{١}{٣} = \frac{٤}{١٢}$  (ب)  $\frac{٥}{١٢}$  (ج)  $\frac{٣}{٤} = \frac{٩}{١٢}$

(٣) (أ)  $\frac{١}{٢}$  (ب)  $\frac{١}{٢}$  (ج) صفر (د) ١

(٤) (أ)  $\frac{٧}{١٥}$  (ب)  $\frac{١}{٣} = \frac{٥}{١٥}$  (ج)  $\frac{٢}{٥} = \frac{٦}{١٥}$

(٥) (أ)  $\frac{١}{٦} = \frac{٤}{٢٤}$  (ب)  $\frac{٣}{٨} = \frac{٩}{٢٤}$  (ج)  $\frac{١}{٦} = \frac{٤}{٢٤}$

(٦) (أ)  $\frac{٣}{٢٥} = \frac{٦}{٥٠}$  (ب)  $\frac{٤}{٢٥} = \frac{٨}{٥٠}$  (ج)  $\frac{١٢}{٢٥} = \frac{٢٤}{٥٠}$

(٧) (أ)  $\frac{١}{٢}$  (ب)  $\frac{١}{٢}$  (ج)  $\frac{٣}{٤} = \frac{٦}{٨}$

(٨) (أ)  $\frac{٣}{٥٠} = \frac{٣٦}{٦٠٠}$  (ب)  $\frac{٤٧}{٥٠}$

(٩) (أ)  $\frac{٣}{٢٥} = \frac{١٢}{١٠٠}$  (ب)  $\frac{٣٣}{٥٠} = \frac{٦٦}{١٠٠}$  (ج)  $\frac{٨١}{١٠٠}$

(١٠)  $١٢٠ \text{ قطعة} = ٦٠٠٠ \times \frac{٢٠}{١٠٠٠}$

(١١) (أ)  $١٢ \text{ قطعة} = ٢٠٠ \times \frac{٦}{١٠٠}$

(ب)  $١٤١٠ \text{ قطعة} = ١٥٠٠ \times \frac{٦}{١٠٠} - ١٥٠٠$

(١٢) نسبة الصالح للتصدير =  $١٠٠\% - ٣٠\% = ٧٠\%$

ما ينتج فى عشرة أيام =  $٢٠ \times ١٠ = ٢٠٠$  طن

الصالح للتصدير =  $٢٠٠ \times \frac{٧٠}{١٠٠} = ١٤٠$  طن